

外傷用止血帶

- (一)傷口經「止血包紮」仍無法減緩出血或為可見大出血預期無法有效止血時，應儘早將外傷用止血帶(以下簡稱止血帶)。
- (二)止血帶以直接加壓在皮膚上且不可被衣物覆蓋為原則，**若傷口為可見之患處**，**可**將止血帶綁於肢體近心端距離患處 5-8 公分處(約 4 指幅)，若遇肘關節或膝關節則上移至關節上方。
- (三)若無法判斷傷口確定位置(如視線不良、衣物無法移除、傷口界線模糊)、病人生命危急、遇大量傷病患場合、**環境不安全**，皆可暫時不移除衣物，快速將止血帶直接固定於患肢最近心端 (high and tight，如腋窩下、股動脈點)。
- (四)將束帶透過扣環拉緊，旋桿朝肢體外側。
- (五)束帶圍繞肢體貼合，但不超過固定槽位置。

(六)將旋桿旋緊至出血減緩且遠端脈搏摸不到。

(七)旋桿固定於固定槽內，若傷口處仍無法減緩出血且遠端脈搏已摸不到，繼續將旋桿旋緊，或考慮於更近心端使用第2條止血帶。

(八)將束帶覆蓋固定槽繼續圍繞肢體貼合，將註記時間之固定帶貼緊固定槽，於固定帶上並記錄時間。

(九)到院後與醫護人員交接傷患出血狀況及操作止血帶時間。

註1：手腕足踝以上外傷性截肢者應直接使用止血帶。

註2：如固定於衣物上時，應注意不可加壓於異物上(如鈕扣、肩章)。