

到院前 GCS 分數判斷

(一)眼睛反應

4 分：自動張開眼睛：接觸病人時，病人眼睛睜開或經呼喚後睜開。

3 分：聽命令張開眼：大聲呼喚病人後眼睛才睜開。

2 分：痛刺激張開眼：疼痛刺激後，眼睛才睜開。

〔註：疼痛刺激 1-10 秒(力道由淺至深)，刺激處為按壓指甲床〕

1 分：全無反應：疼痛刺激後，眼睛仍無法睜開。

NT：其他原因（如眼腫）導致無法睜眼或無法測試。

(二)言語反應

5 分：說話有條理：病人能回答你的問題或對話，有定向感。

4 分：語無倫次：病人可與人進行問答，但對於人事時地物無定向感。

3 分：隻字片語：病人僅能說出單字或是單詞（沒有資訊交換）

2 分：只發出呻吟聲：評估過程病人只會呻吟(或無意義的單詞)。

〔註：疼痛刺激 1-10 秒(力道由淺至深)，刺激處為肩頸部斜方肌或上眼眶骨(眉毛靠近眉心處)〕

1 分：全無反應：在無干擾因素下，病人沒有言語反應。

NT：其他原因（如失語症、氣切或插管）導致測試。

(三)活動反應

6 分：聽命令做動作：病人可依你的指示活動(如手、腳、張開嘴巴)。

5 分：可定位刺激：肩頸部斜方肌痛刺激時，疼痛刺激後，病人試圖將你的手移開或撥除(可定位痛位置)；上眼眶骨刺激時，病人手試圖舉至鎖骨以上(可定位痛位置)。

〔註：疼痛刺激 1-10 秒(力道由淺至深)，刺激處為肩頸部斜方肌或上眼眶骨(眉毛靠近眉心處)〕

4 分：上臂正常屈曲：臉頸刺激後，病人手肘快速彎曲，上臂遠離身體中線。

3 分：上臂不正常屈曲：臉頸刺激後，病人手肘彎曲，手腕屈曲，手指握拳，上臂縮往身體中線。（去皮質）

2 分：上臂伸展：刺激後，病人手肘部伸展。（去大腦）

1 分：全無反應：疼痛刺激後，病人沒有反應。

NT：其他原因導致無法測試。

分數	眼睛張開(E)	發聲反應(V)	運動反應(M)
6			聽命令做動作
5		說話有條理	痛刺激，可定位痛位置
4	自動張開眼睛	說話語無倫次	痛刺激，肢體回縮
3	聽命令張開眼	只能說隻字片語	痛刺激，肢體會彎曲
2	痛刺激張開眼	只發出呻吟聲	痛刺激，肢體會伸直
1	全無反應	全無反應	全無反應