


P 成人外傷到院前止痛

一、適用於沒有禁忌症之成人（18 歲以上），因急性外傷導致疼痛 VAS ≥ 3 分者(註 1)。



註1：

(1) Visual Analogue Scale (VAS) 的評估方法如下：

- ① 讓傷患目視量尺，量尺左端標示0處為完全不痛，右側標示10為無法忍受之劇痛。
- ② 請傷患在量尺中選擇最能夠形容自己目前疼痛的落點。
- ③ 電子量尺可以點擊後再呈現落點數值；若是紙本量尺則可事先標示整數刻度。

(2) 預期傷患打上止血帶或燒燙傷等 VAS ≥ 3 分時可考慮執行。

二、止痛藥給予方式

(一) Pentrox：

操作步驟：

1. 傷患能自行手持並吸入，於上車前開始給藥(或現場脫困預計達 15 分鐘以上時)，病患上車後應稍微打開窗戶通風。
2. 吸入器尾端朝上，將 3 毫升之 Methoflurane 一次全部倒入。
3. 交由傷患含住吸入器呼吸(註 2)。
4. 吸入器交予傷患後不持續協助給予。

5. 若止痛效果不足，可以讓傷患自行將稀釋氣閥按住以增加吸入之藥劑量。
 6. 使用本藥物之傷患，身邊隨時需至少 1 名 EMT 觀察。
 7. 送醫途中除了生命徵象評估外，需再次評估 VAS 並予記錄。
 8. 到院後主動與護理人員交班傷患有使用此藥物，並回收 Pentrox。
 9. 每位 EMT-P 於 24 小時上班時間內，最多給予 2 位病患使用此藥物，惟大傷情況不在此限。
- 註 2：吸入約 1~3 分鐘產生止痛作用，單支劑量約可維持 25 分鐘，停止吸入 3~5 分鐘失去止痛效果。

禁忌症：

1. 頭：頭部外傷。
2. 昏：任何原因導致意識不清（GCS<15）。
3. 女：確認懷孕、哺乳中。
4. 肝腎：已知有肝病（含肝炎帶原）或腎臟病，或醫師曾告知有肝或腎功能不良。
5. 休克：收縮壓低於 90 mmHg。
6. 過敏：本人或家屬表示傷患曾經對「全身麻醉劑」過敏之病史。

(二) Tramadol：

操作步驟：

1. 注射劑量：**50-100mg** 肌肉注射。
2. 注射後約 15 分鐘產生藥效，應向傷患或其家屬適當解釋注射後可能出現頭暈、噁心及嘔吐等副作用症狀。
3. 注射後 15 分鐘後無法緩解疼痛，到院前可再重複 1 次劑量。
4. 到院後主動與護理人員交班傷患有使用此藥物。
5. 因施**打止血帶及燒燙傷造成傷患疼痛難耐時可考慮使用。**

禁忌症包括：

1. 曾對 Tramadol 或鴉片類藥物過敏。
2. 懷孕。
3. 昏迷的病人。