

## G5-1 成人危急個案

### 程 序

---

成人傷病患依下列四項指標定義為「危急個案（ALS）」（註1）：

一、生命徵象指標（註2）：

- （一）意識不清（昏迷指數 $<13$ 分）。
- （二）呼吸次數  $<10$  或  $\geq 30$  次或未給氧時血氧值  $<90\%$ 。
- （三）脈搏每分鐘 $\geq 150$  或 $<50$  次。
- （四）收縮壓 $\geq 220$  或 $<90$  mmHg。
- （五）微血管充填時間 $\geq 2$  秒。
- （六）體溫 $\geq 40$  或 $<32^{\circ}\text{C}$ 。
- （七）血糖值： $<60\text{mg/dl}$ （或顯示 low）或  $\geq 500\text{mg/dl}$ （或顯示 high）。
- （八）發紺。

二、傷病部位指標：

- （一）燒燙傷：2 度燒傷體表面積 18%（含）以上或 3 度燒傷體表面積 10%（含）以上，或顏面燒燙傷、會陰燒燙傷、吸入性燒灼傷。
- （二）大量皮下氣腫。
- （三）手腕或腳踝以上截肢、大而深的傷口。
- （四）頭、頸、軀幹(開放性傷口，含腹鼠蹊部)、上臂或大腿之穿刺傷或重物輾壓傷。
- （五）嚴重骨折： $\geq 2$  處長骨骨折（此處所稱長骨指上臂、前臂、大腿、小腿）、連枷胸、骨盆骨折、開放性或凹陷性顱骨骨折。
- （六）腦組織或內臟外露。
- （七）頭部或脊椎傷害併肢體癱瘓。
- （八）長骨開放性骨折。

三、傷病機轉指標：

- （一）高處墜落（ $\geq 6$  公尺、 $\geq 2$  層樓高或兒童身高 2 倍以上之墜落）。
- （二）脫困時間 $\geq 20$  分鐘。
- （三）高能量撞擊之證據。例如：汽車車速 $\geq 50$  公里/小時、內部乘員空間凹陷 $\geq 30$  公分、同車有人死亡、被彈出車外、行人或機車騎士被高速（ $\geq 50$  公里/小時）汽機

車撞擊、彈飛、或輾壓（遠端肢體除外）。

（四）爆炸傷。

四、特殊病患及狀況：

（一）疑似急性腦中風(符合 M6 程序)。

（二）缺血性胸痛發作(符合 M7 程序)。

（三）突然或近期昏迷。

（四）抽搐不止。

（五）中毒可能危及生命。

（六）急產。

（七）情況異常或不穩定之嬰兒或兒童。

（八）毒蛇咬傷。

（九）創傷病患持續出血且有出血性疾病或服用抗凝血劑。

## 要 旨

---

- 一、因為危急個案有較高的可能性發生到院前心跳停止，故EMT於現場或車上處置此類病患的同時，須更加注意瀕死徵象的發生，以儘早開始必要的急救。
- 二、危急個案應每5分鐘進行一次生命徵象評估、使用正壓通氣（BVM）的病患應每2分鐘進行生命徵象評估。並於期間注意瀕死徵象的發生。
- 三、特殊狀況（如重大外傷或急性腦中風等）應依規定進行通報並後送合作醫院，以利病患預後。

## 註 解

---

註1>

若傷病患同時符合多項危急個案定義，應同時通報救指中心及告知醫院。

註2>

表列「生命徵象指標」主要適用成人。兒童及嬰兒「生命徵象正常值」請參考【S8小兒通用】。