


M6 疑似腦中風

程 序



要 旨

一、下列事項時建議使用本程序：

- (一) 病人意識清醒、且病史詢問發現病人有半邊肢體或半邊臉部無力、口齒不清、步態不穩、頭痛或頭暈…等疑似「腦中風」之症狀時。
- (二) 意識不清，可經由疼痛刺激仍發現病人有半邊肢體無力時。

二、中風依病理機轉可分為缺血性腦中風與出血性腦中風，其臨床特徵為突發性之中樞神經功能障礙。缺血性腦中風如果能在治療「黃金時間」內送至「腦中風中心」進行「血栓溶解劑」或「動脈內取栓術」的治療，病人的預後可以獲得明顯改善。故此類病人必須確定發作時間、回報救災救護指揮中心、並後送至腦中風中心進行治療，以利病人預後。

三、中風病人若意識改變仍可能併存「低血糖」、「呼吸道無法暢通」或「呼吸異常」問題，應一併通報救指中心及處理。

註 解

註1>

- 一、病史應確實詢問中樞神經功能障礙發生時間。
- 二、**中風發作時刻**：如病人意識清楚，則以病人描述症狀發作時間為準；如病人意識不清或無法清楚表達，則以同住家屬或其他關係人目擊病人最後1次正常活動的時間，做為起點。
- 三、目前缺血性腦中風，「血栓溶解劑治療的黃金時間」一般定義為「中風發作時刻後4.5小時」，而「動脈內取栓術治療的黃金時間」一般定義為「中風發作時刻後24小時」。因為「動脈內取栓術」僅適用於「大血管阻塞腦中風」病人，所以遇到疑似「腦中風」病人時，首先應利用辛辛那提到院前中風指標來判斷是否高度懷疑為腦中風病人，如為辛辛那提到院前中風指標陽性，再加做大血管阻塞G-FAST中風指標來判斷是否為疑似「大血管阻塞腦中風」病人。
- 四、若疑似「腦中風」，應詢問症狀發生時間(或最後正常時間)。若<24小時且 G-FAST 中風指標陽性、血糖值 $\geq 60\text{mg/dL}$ 且本次症狀發作同時沒有出現癲癇抽搐的情形，考慮送至有能力施行「動脈內取栓術」治療之急救責任醫院。
- 五、若<4.5小時且G-FAST中風指標為陰性，但辛辛那提到院前中風指標陽性、血糖值

≥60mg/dL且本次症狀發作同時沒有出現癲癇抽搐的情形，考慮送至有能力施行「血栓溶解劑」治療之急救責任醫院。

註2>

- 一、意識不清（GCS<15）且口咽分泌物影響呼吸時應進行抽吸；病人**意識改變**（GCS<8）**應使用鼻咽呼吸道**；病人昏迷(GCS=3)發出鼾聲時**應使用口咽呼吸道**。
- 二、應維持 $SpO_2 \geq 94\%$ 。

註3>

症狀發生時間(或最後正常時間)<24小時，應先後執行辛辛那提到院前中風指標與疑似大血管阻塞G-FAST中風指標。

- 一、辛辛那提到院前中風指標（The Cincinnati Pre-hospital Stroke Scale）：

（一）嘴角上揚（叫病人露牙或笑）

☐正常：2 頰均衡移動

☐不正常：一邊臉部動的不如對側

（二）手臂支撐（叫病人閉眼伸出雙臂 10 秒鐘）

☐正常：雙臂均衡移動或完全不動

☐不正常：一邊手臂垂落不對稱

（三）語言異常（叫病人說一句話，例如「股市上萬點、台灣走出去」）

☐正常：咬字正確

☐不正常：口吃、用字不對或無法說話

（四）上列理學檢查項目如有任何1項不正常（陽性）且是新的發作時，病人為腦中風的可能性達72%，若3項均不正常則腦中風可能性高達85%。

- 二、疑似大血管阻塞G-FAST中風指標：

疑似大血管阻塞 G-FAST 中風指標陽性的定義為:下列 4 項檢查有 3 項(含)以上不正常。

（一）眼球運動受限或偏向（叫病人頭不動，雙眼目視水平移動的瞳孔筆並跟隨其移動）

☐正常：雙眼水平移動均無受限

☐不正常：雙眼水平移動受限或偏向

（二）辛辛那提到院前中風指標之3項檢查。

註4>

疑似「腦中風」者，後送姿勢建議為「頭高30度」、半坐臥。