

Formularze monitorowania sytuacji

Wersja do wydruku i ręcznego wypełnienia

Formularz prosty

Dane podstawowe

Data

Godzina

Miejsce

Inicjały / imię osoby

Rodzic / opiekun / osoba prowadząca

Inne osoby obecne

Środowisko

☐ Dom

☐ Szkoła

☐ Ośrodek

☐ Inne:

Szybki opis sytuacji

Jak wyglądał stan osoby przed sytuacją?

Sen, głód, ból, hałas, zmiany planu, wcześniejsze napięcie.

Co działo się bezpośrednio przed sytuacją?

Opisz ostatnie minuty: wymaganie, zmianę, odmowę, oczekiwanie, kontakt.

Pierwsze sygnały narastającego napięcia

Co pojawiło się zanim sytuacja się nasiliła: ciało, głos, ruch, wycofanie.

Reakcja dorosłych / otoczenia

Co zrobiły osoby dorosłe lub otoczenie? Co zmieniono, dodano albo wycofano?

Co zrobiła osoba? Opis zachowania — fakty obserwowalne

Zapisz słowa, ruchy i działania. Unikaj interpretacji intencji.

Co pomogło zmniejszyć napięcie lub wrócić do regulacji?

Wpisz konkretne warunki lub działania, nie tylko „uspokoila/uspokoil się”.

Czy osoba miała wpływ, wybór, możliwość negocjacji lub przerwy?

Co osoba mogła kontrolować, a co było narzucone lub nieuniknione?

Czy sytuacja była przewidywalna? Co było znane / nieznane?

Czy było wiadomo, co się wydarzy, jak długo potrwa i jaki będzie koniec?

Powrót do gotowości

Gotowość oznacza możliwość kontaktu, rozmowy lub powrotu do aktywności – nie tylko brak eskalacji.

☐ 5 minut

☐ 10–30 minut

☐ 1–2 godziny

☐ kilka godzin lub następnego dnia

Formularz rozszerzony

Dane podstawowe

Data

Godzina

Miejsce

Inicjały / imię osoby

Rodzic / opiekun / osoba prowadząca

Inne osoby obecne

Środowisko

☐ Dom

☐ Szkoła

☐ Ośrodek

☐ Inne:

0. Poziom bazowy i kontekst dnia

Poziom napięcia przed zdarzeniem

Jak wyglądał stan osoby jeszcze przed bezpośrednim wyzwalaczem?

☐ 0 niski / stabilny

☐ 1 podwyższony

☐ 2 wysoki

☐ 3 bardzo wysoki

Czy osoba była zmęczona?

☐ Tak

☐ Nie

☐ Nie wiem

Czy osoba spała wystarczająco?

☐ Tak

☐ Nie

☐ Nie wiem

Jeśli sen miał znaczenie — doprecyzuj

Np. krótki sen, pobudki, koszmary, bardzo wczesna pobudka.

Etap pobytu / kontekst dnia, jeśli dotyczy

☐ dzień przyjazdu / zmiany

☐ dzień wyjazdu / powrotu

☐ środek tygodnia

☐ koniec tygodnia

☐ nie dotyczy

Czynniki obciążające

☐ słaby sen / pobudka w nocy

☐ zmiana planu

☐ wyjście / powrót / podróż

☐ wizyta gości / większa liczba osób

☐ konflikt

☐ presja czasu

☐ hałas / tłok

☐ ból / dyskomfort

☐ głód / pragnienie

☐ inne:

Stan ciała

☐ głód

☐ pragnienie

☐ potrzeba toalety

☐ ból / dyskomfort

☐ zmęczenie fizyczne

☐ temperatura ciała — zimno/gorąco

☐ napięcie mięśniowe

☐ inne:

Intensywność sensoryczna

- ☐ hałas / dźwięki
- ☐ tłok / liczba osób
- ☐ tekstury / dotyk
- ☐ inne:

- ☐ światło
- ☐ zapachy
- ☐ temperatura pomieszczenia

1. Bezpośrednio przed zdarzeniem

Co wydarzyło się bezpośrednio przed zdarzeniem?

- ☐ zmiana aktywności
- ☐ oczekiwanie
- ☐ prośba / polecenie
- ☐ kontakt społeczny
- ☐ konflikt
- ☐ inne:
- ☐ koniec aktywności
- ☐ odmowa / brak dostępu
- ☐ korekta zachowania
- ☐ hałas / tłok
- ☐ przejście między miejscami

Doprecyzowanie tego, co było bezpośrednio przed

Opisz fakty obserwowalne, bez oceniania i przypisywania winy.

2. Czego oczekiwano w tym momencie?

Na co osoba miała wpływ?

Wybór kolejności, czasu, miejsca, sposobu wykonania, możliwość przerwy.

Co było nieznane, narzucone albo poza wpływem?

Nagła zmiana, brak informacji, presja czasu, brak możliwości odmowy lub negocjacji.

Czy było wiadomo, co się wydarzy?

- ☐ Tak
- ☐ Nie
- ☐ Nie wiem

Czy było wiadomo, jak długo to potrwa?

- ☐ Tak
- ☐ Nie
- ☐ Nie wiem

Czy była możliwość negocjacji lub wyboru?

- ☐ Tak
- ☐ Nie
- ☐ Nie wiem

Oczekiwania / wymagania

- ☐ brak wymagań
- ☐ rozpoczęcie zadania
- ☐ oczekiwanie
- ☐ koniec aktywności
- ☐ przejście do innego miejsca
- ☐ kontakt społeczny

☐ podporządkowanie się zasadzie

☐ wykonanie czynności samoobsługowej

☐ inne:

3. Pierwsze oznaki narastającego napięcia

Czy pojawiły się sygnały?

☐ Tak

☐ Nie

☐ Nie wiem

Ile czasu przed eskalacją?

Szacunkowo: minuty, kilkanaście minut, wcześniej w ciągu dnia.

Typ 1: aktywacja

☐ przyspieszone oddychanie

☐ pot

☐ rozszerzone źrenice

☐ inne:

☐ napięcie mięśniowe

☐ drżenie

☐ ucieczka / walka

Typ 2: shutdown / zamrożenie

☐ patrzenie w jeden punkt / podłogę

☐ spowolnienie ruchów

☐ wycofanie

☐ brak reakcji na głos

☐ opadnięcie ciała

☐ inne:

Typ 3: sensoryczny

☐ zatykanie uszu

☐ stereotypie

☐ ucieczka z pomieszczenia

☐ zasłanianie oczu

☐ unikanie dotyku

☐ inne:

Co zwykle pojawia się najpierw?

Pierwszy najmniejszy sygnał, który może pomóc zareagować wcześniej.

Czy zapowiada trudniejsze zachowanie?

☐ Tak

☐ Nie

☐ Nie wiem

3B. Strategie kompensacyjne i maskowanie

Czy osoba próbowała kontynuować aktywność mimo narastającego napięcia?

Chodzi o „trzymanie się” mimo przeciążenia, nie o świadome udawanie.

☐ Tak

☐ Nie

☐ Nie wiem

Jeśli tak – co pozwoliło osobie „trzymać się razem” przed eskalacją?

☐ maskowanie / ukrywanie dyskomfortu

☐ wsparcie osoby towarzyszącej

☐ lęk przed konsekwencjami / oceną

☐ inne:

☐ wycofanie w fantazję / humor / kontrolowanie rozmowy

☐ jasny koniec aktywności

☐ silna motywacja wewnętrzna

Ile czasu osoba „trzymała się” przed eskalacją?

☐ kilka minut

☐ ponad 30 minut

☐ 10–30 minut

☐ cały dzień – eskalacja później / w domu

4. Działania podjęte przed eskalacją

Faza napięcia w momencie podjęcia działań

☐ zielona – możliwa rozmowa

☐ żółta – narastające napięcie

☐ czerwona — pełna eskalacja

☐ trudno określić

Działania podjęte przed eskalacją

☐ obniżenie bodźców sensorycznych

☐ zwiększenie autonomii / wybór

☐ zapewnienie przewidywalności

☐ wsparcie interoceptywne

☐ czas bez wymagań / pauza

☐ regulacja sensoryczna

☐ inne:

Czy działanie było bezwarunkowe, bez nacisku i negocjacji?

☐ Tak

☐ Nie

☐ Częściowo

☐ Nie wiem

Czy użyto regulatora / strategii regulacyjnej?

☐ Tak

☐ Nie

☐ Częściowo

Czy działanie zmniejszyło napięcie?

☐ Tak

☐ Nie

☐ Częściowo

Co następnym razem warto zrobić wcześniej?

Sygnal do wcześniejszej pauzy, obniżenia wymagań, wyboru, regulacji lub zmiany otoczenia.

5. Opis zachowania

Opis zachowania — fakty obserwowalne

Co było widać lub słyszeć: słowa, ruch, gesty, działania, bez etykiet typu „manipulacja”.

Intensywność

☐ 0 brak agresji

☐ 1 lekkie

☐ 2 umiarkowane

☐ 3 wysokie ryzyko

Skutki / szkody, jeśli wystąpiły

☐ brak szkód

☐ krzyk / płacz

☐ rzucanie przedmiotami

☐ niszczenie rzeczy

☐ agresja wobec innych

☐ autoagresja

☐ ucieczka / oddalenie się

☐ inne:

6. Regulacja i wpływ

Czas trwania eskalacji

Od wyraźnego nasilenia do momentu, gdy eskalacja zaczęła opadać.

.....

Czas do pełnego uspokojenia emocjonalnego

- | | |
|--|--------------------------------------|
| ☐ do 5 minut | ☐ 5–15 minut |
| ☐ 15–30 minut | ☐ 30–60 minut |
| ☐ ponad godzinę | |

Czas powrotu do gotowości poznawczej / kontaktu

- | | |
|---|---|
| ☐ od razu po uspokojeniu | ☐ 10–30 minut po |
| ☐ 1–2 godziny po | ☐ kilka godzin lub następnego dnia |

Co najbardziej pomogło zakończyć eskalację?

- | | |
|--|---|
| ☐ czas / przeczekanie bez interwencji | ☐ cisza / wyciszenie bodźców |
| ☐ obecność bliskiej osoby | ☐ kontakt 1:1 |
| ☐ przerwa od wymagań | ☐ dostęp do regulacji sensorycznej |
| ☐ wycofanie wymagania | ☐ inne: |

Co pogorszyło sytuację albo wydłużyło powrót do regulacji?

Np. rozmowa za wcześnie, kolejne wymagania, dotyk, hałas, publiczna uwaga.

Co pomogło wrócić do gotowości po sytuacji?

- | | |
|--|--|
| ☐ cisza i brak bodźców | ☐ sen / drzemka |
| ☐ jedzenie / picie | ☐ aktywność sensoryczna |
| ☐ obecność bliskiej osoby bez wymagań | ☐ samotność |
| ☐ ulubiona aktywność bez presji | ☐ czas |
| ☐ inne: | |

7. Po zdarzeniu**Co wydarzyło się po zdarzeniu?**

- | | |
|---|---|
| ☐ przejście do spokojniejszego miejsca | ☐ odpoczynek |
| ☐ rozmowa później | ☐ powrót do aktywności |
| ☐ sen | ☐ kontakt z bliską osobą |
| ☐ brak dalszych wymagań | ☐ inne: |

Czy w tym tygodniu była interwencja fizyczna?

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ Nie wiem |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|

Jeśli tak — ile razy?

Wpisz liczbę lub przybliżenie.

.....

Czy próg reakcji był niższy niż zwykle?

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ Nie wiem |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|

Notatka dotycząca interwencji fizycznej / bezpieczeństwa

Krótko: kontekst, bezpieczeństwo, co można zmienić następnym razem.

.....

Mapa środowiska

Dane podstawowe

Data

Godzina

Miejsce

Inicjały / imię osoby

Rodzic / opiekun / osoba prowadząca

Inne osoby obecne

Środowisko

☐ Dom

☐ Ośrodek

☐ Szkoła

☐ Inne:

1. Miejsca i preferowane przestrzenie

Gdzie osobie jest najłatwiej?

☐ pokój osoby

☐ kuchnia / jadalnia

☐ przedpokój / przejścia

☐ samochód

☐ salon / wspólna przestrzeń

☐ łazienka

☐ na zewnątrz

☐ inne:

Dlaczego te miejsca pomagają?

Co tam działa: cisza, światło, kontrola bodźców, przewidywalność, osoba towarzysząca.

Jakich miejsc osoba unika albo gdzie jest trudniej?

☐ pokój osoby

☐ kuchnia / jadalnia

☐ przedpokój / przejścia

☐ samochód

☐ salon / wspólna przestrzeń

☐ łazienka

☐ na zewnątrz

☐ inne:

Dlaczego te miejsca są trudne?

Co obciąża: hałas, zapachy, tłok, przejścia, oczekiwanie, brak wpływu.

2. Aktywności, role i relacje

Co osoba lubi robić / co ją wzmacnia?

Aktywności, tematy, relacje, miejsca lub rytuały, które odbudowują zasoby.

Jaka rola w aktywności jest najłatwiejsza?

- | | |
|--|---|
| ☐ prowadzący / kontrolujący | ☐ uczestnik współpracujący |
| ☐ obserwator / obecność bez aktywnego udziału | ☐ samodzielnie bez interakcji z innymi |

3. Warunki optymalnego funkcjonowania

Osobie jest najłatwiej, gdy...

- | | |
|---|---|
| ☐ jest cisza / mało bodźców słuchowych | ☐ światło jest przyciemnione / naturalne |
| ☐ otoczenie jest spokojne | ☐ może kontrolować bodźce |
| ☐ ma samotność / czas bez wymagań | ☐ jest bliska osoba bez wymagań |
| ☐ kontakt jest 1:1 | ☐ kontakt może być równoległy, bez bezpośredniej komunikacji |
| ☐ ma wpływ na przebieg aktywności | ☐ wie, co się wydarzy i jak długo potrwa |
| ☐ może negocjować lub wybierać | ☐ są rutyny / powtarzalność |
| ☐ jest najedzona / napita | ☐ jest wypoczęta |
| ☐ temperatura jest komfortowa | ☐ nie ma bólu / dyskomfortu |
| ☐ inne: | |

4. Wsparcie i regulatory

Z kim osoba najłatwiej współpracuje / przy kim czuje się bezpiecznie?

Zwróć uwagę na styl kontaktu tej osoby: ton, dystans, brak presji, przewidywalność.

Co zmniejsza napięcie?

- | | |
|--|--|
| ☐ cisza / wyciszenie bodźców | ☐ ruch — huśtawka / trampolina / spacer |
| ☐ ciężar / ucisk | ☐ chłód lub ciepło |
| ☐ stereotypie / bujanie / skakanie | ☐ jedzenie / picie |
| ☐ sen / drzemka | ☐ toaleta |
| ☐ obecność bliskiej osoby bez wymagań | ☐ samotność / wycofanie |
| ☐ kontakt fizyczny | ☐ dystans / przestrzeń osobista |
| ☐ wycofanie wymagania | ☐ dostęp do ulubionej aktywności |
| ☐ wybór / możliwość decyzji | ☐ informacja, ile to potrwa |
| ☐ inne: | |

Co daje energię / pomaga odbudować zasoby?

Nie tylko co uspokaja, ale co realnie regeneruje po obciążeniu.

5. Od czego zależy funkcjonowanie?

Zachowanie / gotowość zależy szczególnie od...

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ☐ hałas | ☐ liczba osób |
| ☐ zmiana planu | ☐ pora dnia |
| ☐ sen | ☐ jedzenie / picie |

- ☐ ból / dyskomfort
- ☐ kontakt społeczny
- ☐ oczekiwanie
- ☐ inne:

- ☐ temperatura
- ☐ presja czasu
- ☐ przejścia między aktywnościami

Jak zmienia się zachowanie w zależności od tych warunków?

Opisz różnice: kiedy jest łatwiej, kiedy szybciej narasta napięcie, co obniża próg reakcji.

6. Bezpieczne przestrzenie i osoby

Gdzie / przy kim osoba może wracać do regulacji bez dodatkowych wymagań?

Bez rozmowy naprawczej, pytań i nowych poleceń, dopóki układ nerwowy nie wróci do gotowości.

7. Konteksty eskalacji i profilaktyka

Kiedy najczęściej rośnie ryzyko eskalacji?

- | | |
|---|--|
| ☐ oczekiwanie / czekanie | ☐ koniec aktywności |
| ☐ zmiana planu | ☐ hałas / tłok |
| ☐ kontakt społeczny | ☐ korekta zachowania |
| ☐ brak wpływu | ☐ przejście do innego miejsca |
| ☐ zmęczenie / głód / ból | ☐ inne: |

Co może zmniejszyć ryzyko eskalacji?

- | | |
|--|---|
| ☐ uprzedzenie / przygotowanie | ☐ timer / plan wizualny |
| ☐ wybór kiedy / jak / w jakiej kolejności | ☐ negocjacja / omówienie |
| ☐ jasny koniec | ☐ brak pośpiechu |
| ☐ obecność bliskiej osoby | ☐ dostęp do regulacji sensorycznej |
| ☐ inne: | |

Czy są sytuacje bez agresji mimo trudności?

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ Tak | ☐ Nie | ☐ Nie wiem |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|

Jeśli tak — gdzie / kiedy i co wtedy pomaga?

To mogą być warunki ochronne: osoba, miejsce, przewidywalność, wybór, brak presji.