

Formularze monitorowania sytuacji

Puste formularze do pobrania, wydruku i ręcznego wypełniania

Wersja do druku / wypełniania ręcznego

Formularz prosty

Dane podstawowe

Data

Godzina

Miejsce

Inicjały / imię osoby

Rodzic / opiekun / osoba prowadząca

Inne osoby obecne

Środowisko

☐ Dom

☐ Ośrodek

☐ Szkoła

☐ Inne:

Szybki opis sytuacji

Jak wyglądał stan osoby przed sytuacją?

Co działo się bezpośrednio przed sytuacją?

Pierwsze sygnały narastającego napięcia

Reakcja dorosłych / otoczenia

Co zrobiła osoba? Opis zachowania — fakty obserwowalne

Co pomogło zmniejszyć napięcie lub wrócić do regulacji?

Czy osoba miała wpływ, wybór, możliwość negocjacji lub przerwy?

Czy sytuacja była przewidywalna? Co było znane / nieznane?

Powrót do gotowości

☐ 5 minut

☐ 10–30 minut

☐ 1–2 godziny

☐ kilka godzin lub następnego dnia

Karta monitorowania sytuacji – formularz rozszerzony

Dane podstawowe

Data

Godzina

Miejsce

Inicjały / imię osoby

Rodzik / opiekun / osoba prowadząca

Inne osoby obecne

Środowisko

☐ Dom

☐ Ośrodek

☐ Szkoła

☐ Inne:

0. Poziom bazowy i kontekst dnia

Poziom napięcia przed zdarzeniem

☐ 0 niski / stabilny

☐ 2 wysoki

☐ 1 podwyższony

☐ 3 bardzo wysoki

Czy osoba była zmęczona?

☐ Tak

☐ Nie

☐ Nie wiem

Czy osoba spała wystarczająco?

☐ Tak

☐ Nie

☐ Nie wiem

Jeśli sen miał znaczenie — doprecyzuj

Etap pobytu / kontekst dnia, jeśli dotyczy

☐ dzień przyjazdu / zmiany

☐ środek tygodnia

☐ nie dotyczy

☐ dzień wyjazdu / powrotu

☐ koniec tygodnia

Czynniki obciążające

☐ słaby sen / pobudka w nocy

☐ wyjście / powrót / podróż

☐ konflikt

☐ hałas / tłok

☐ głód / pragnienie

☐ zmiana planu

☐ wizyta gości / większa liczba osób

☐ presja czasu

☐ ból / dyskomfort

☐ inne:

Stan ciała

☐ głód

☐ potrzeba toalety

☐ zmęczenie fizyczne

☐ napięcie mięśniowe

☐ pragnienie

☐ ból / dyskomfort

☐ temperatura ciała — zimno/gorąco

☐ inne:

Intensywność sensoryczna

☐ hałas / dźwięki

☐ tłok / liczba osób

☐ tekstury / dotyk

☐ światło

☐ zapachy

☐ temperatura pomieszczenia

☐ inne:

1. Bezpośrednio przed zdarzeniem

Co wydarzyło się bezpośrednio przed zdarzeniem?

☐ zmiana aktywności

☐ czekanie

☐ prośba / polecenie

☐ kontakt społeczny

☐ konflikt

☐ inne:

☐ koniec aktywności

☐ odmowa / brak dostępu

☐ korekta zachowania

☐ hałas / tłok

☐ przejście między miejscami

Doprecyzowanie tego, co było bezpośrednio przed

2. Czego oczekiwano w tym momencie?

Na co osoba miała wpływ?

Co było nieznane, narzucone albo poza wpływem?

Czy było wiadomo, co się wydarzy?

☐ Tak

☐ Nie

☐ Nie wiem

Czy było wiadomo, jak długo to potrwa?

☐ Tak

☐ Nie

☐ Nie wiem

Czy była możliwość negocjacji lub wyboru?

☐ Tak

☐ Nie

☐ Nie wiem

Oczekiwania / wymagania

☐ brak wymagań

☐ rozpoczęcie zadania

☐ czekanie

☐ podporządkowanie się zasadzie

☐ inne:

☐ koniec aktywności

☐ przejście do innego miejsca

☐ kontakt społeczny

☐ wykonanie czynności samoobsługowej

3. Pierwsze oznaki narastającego napięcia

Czy pojawiły się sygnały?

☐ Tak

☐ Nie

☐ Nie wiem

Ile czasu przed eskalacją?

Typ 1: aktywacja

☐ przyspieszone oddychanie

☐ pot

☐ rozszerzone źrenice

☐ inne:

☐ napięcie mięśniowe

☐ drżenie

☐ ucieczka / walka

Typ 2: shutdown / zamrożenie

☐ patrzenie w jeden punkt / podłogę

☐ spowolnienie ruchów

☐ wycofanie

☐ brak reakcji na głos

☐ opadnięcie ciała

☐ inne:

Typ 3: sensoryczny

☐ zatykanie uszu

☐ stereotypie

☐ ucieczka z pomieszczenia

☐ zasłanianie oczu

☐ unikanie dotyku

☐ inne:

Co zwykle pojawia się najpierw?

Czy zapowiada trudniejsze zachowanie?

☐ Tak

☐ Nie

☐ Nie wiem

3B. Strategie kompensacyjne i maskowanie

Czy osoba próbowała kontynuować aktywność mimo narastającego napięcia?

☐ Tak

☐ Nie

☐ Nie wiem

Jeśli tak — co pozwoliło osobie „trzymać się razem” przed eskalacją?

☐ maskowanie / ukrywanie dyskomfortu

☐ wsparcie osoby towarzyszącej

☐ lęk przed konsekwencjami / oceną

☐ inne:

☐ wycofanie w fantazję / humor / kontrolowanie rozmowy

☐ jasny koniec aktywności

☐ silna motywacja wewnętrzna

Ile czasu osoba „trzymała się” przed eskalacją?

☐ kilka minut

☐ ponad 30 minut

☐ 10–30 minut

☐ cały dzień — eskalacja później / w domu

4. Działania podjęte przed eskalacją

Faza napięcia w momencie podjęcia działań

☐ zielona — możliwa rozmowa

☐ czerwona — pełna eskalacja

☐ żółta — narastające napięcie

☐ trudno określić

Działania podjęte przed eskalacją

☐ obniżenie bodźców sensorycznych

☐ zapewnienie przewidywalności

☐ zwiększenie autonomii / wybór

☐ wsparcie interoceptywne

☐ czas bez wymagań / pauza

☐ regulacja sensoryczna

☐ inne:

Czy działanie było bezwarunkowe, bez nacisku i negocjacji?

☐ Tak

☐ Nie

☐ Częściowo

☐ Nie wiem

Czy użyto regulatora / strategii regulacyjnej?

☐ Tak

☐ Nie

☐ Częściowo

Czy działanie zmniejszyło napięcie?

☐ Tak

☐ Nie

☐ Częściowo

Co następnym razem warto zrobić wcześniej?

5. Opis zachowania

Opis zachowania – fakty obserwowalne

Intensywność

☐ 0 brak agresji

☐ 2 umiarkowane

Skutki / szkody, jeśli wystąpiły

☐ brak szkód

☐ rzucanie przedmiotami

☐ agresja wobec innych

☐ ucieczka / oddalenie się

☐ 1 lekkie

☐ 3 wysokie ryzyko

☐ krzyk / płacz

☐ niszczenie rzeczy

☐ autoagresja

☐ inne:

6. Regulacja i wpływ

Czas trwania eskalacji

Czas do pełnego uspokojenia emocjonalnego

☐ do 5 minut

☐ 15–30 minut

☐ ponad godzinę

☐ 5–15 minut

☐ 30–60 minut

Czas powrotu do gotowości poznawczej / kontaktu

☐ od razu po uspokojeniu

☐ 1–2 godziny po

Co najbardziej pomogło zakończyć eskalację?

☐ czas / przeczekanie bez interwencji

☐ obecność bliskiej osoby

☐ przerwa od wymagań

☐ wycofanie wymagania

☐ 10–30 minut po

☐ kilka godzin lub następnego dnia

☐ cisza / wyciszenie bodźców

☐ kontakt 1:1

☐ dostęp do regulacji sensorycznej

☐ inne:

Co pogorszyło sytuację albo wydłużyło powrót do regulacji?

Co pomogło wrócić do gotowości po sytuacji?

☐ cisza i brak bodźców

☐ jedzenie / picie

☐ obecność bliskiej osoby bez wymagań

☐ ulubiona aktywność bez presji

☐ inne:

☐ sen / drzemka

☐ aktywność sensoryczna

☐ samotność

☐ czas

7. Po zdarzeniu

Co wydarzyło się po zdarzeniu?

☐ przejście do spokojniejszego miejsca

☐ rozmowa później

☐ sen

☐ brak dalszych wymagań

☐ odpoczynek

☐ powrót do aktywności

☐ kontakt z bliską osobą

☐ inne:

Czy w tym tygodniu była interwencja fizyczna?

☐ Tak

☐ Nie

☐ Nie wiem

Jeśli tak – ile razy?

Czy próg reakcji był niższy niż zwykle?

☐ Tak

☐ Nie

☐ Nie wiem

Notatka dotycząca interwencji fizycznej / bezpieczeństwa

Mapa środowiska

Dane podstawowe

Data

Godzina

Miejsce

Inicjały / imię osoby

Rodzic / opiekun / osoba prowadząca

Inne osoby obecne

Środowisko

☐ Dom

☐ Ośrodek

☐ Szkoła

☐ Inne:

1. Miejsca i preferowane przestrzenie

Gdzie osobie jest najłatwiej?

☐ pokój osoby

☐ kuchnia / jadalnia

☐ przedpokój / przejścia

☐ samochód

☐ salon / wspólna przestrzeń

☐ łazienka

☐ na zewnątrz

☐ inne:

Dlaczego te miejsca pomagają?

Jakich miejsc osoba unika albo gdzie jest trudniej?

☐ pokój osoby

☐ kuchnia / jadalnia

☐ przedpokój / przejścia

☐ samochód

☐ salon / wspólna przestrzeń

☐ łazienka

☐ na zewnątrz

☐ inne:

Dlaczego te miejsca są trudne?

2. Aktywności, role i relacje

Co osoba lubi robić / co ją wzmacnia?

Jaka rola w aktywności jest najłatwiejsza?

☐ prowadzący / kontrolujący

☐ obserwator / obecność bez aktywnego udziału

☐ uczestnik współpracujący

☐ samodzielnie bez interakcji z innymi

3. Warunki optymalnego funkcjonowania

Osobie jest najłatwiej, gdy...

- | | |
|---|---|
| ☐ jest cisza / mało bodźców słuchowych | ☐ światło jest przyciemnione / naturalne |
| ☐ otoczenie jest spokojne | ☐ może kontrolować bodźce |
| ☐ ma samotność / czas bez wymagań | ☐ jest bliska osoba bez wymagań |
| ☐ kontakt jest 1:1 | ☐ kontakt może być równoległy, bez bezpośredniej komunikacji |
| ☐ ma wpływ na przebieg aktywności | ☐ wie, co się wydarzy i jak długo potrwa |
| ☐ może negocjować lub wybierać | ☐ są rutyny / powtarzalność |
| ☐ jest najedzona / napita | ☐ jest wypoczęta |
| ☐ temperatura jest komfortowa | ☐ nie ma bólu / dyskomfortu |
| ☐ inne: | |

4. Wsparcie i regulatory

Z kim osoba najłatwiej współpracuje / przy kim czuje się bezpiecznie?

Co zmniejsza napięcie?

- | | |
|--|--|
| ☐ cisza / wyciszenie bodźców | ☐ ruch — huśtawka / trampolina / spacer |
| ☐ ciężar / ucisk | ☐ chłód lub ciepło |
| ☐ stereotypie / bujanie / skakanie | ☐ jedzenie / picie |
| ☐ sen / drzemka | ☐ toaleta |
| ☐ obecność bliskiej osoby bez wymagań | ☐ samotność / wycofanie |
| ☐ kontakt fizyczny | ☐ dystans / przestrzeń osobista |
| ☐ wycofanie wymagania | ☐ dostęp do ulubionej aktywności |
| ☐ wybór / możliwość decyzji | ☐ informacja, ile to potrwa |
| ☐ inne: | |

Co daje energię / pomaga odbudować zasoby?

5. Od czego zależy funkcjonowanie?

Zachowanie / gotowość zależy szczególnie od...

- | | |
|--|---|
| ☐ hałas | ☐ liczba osób |
| ☐ zmiana planu | ☐ pora dnia |
| ☐ sen | ☐ jedzenie / picie |
| ☐ ból / dyskomfort | ☐ temperatura |
| ☐ kontakt społeczny | ☐ presja czasu |
| ☐ oczekiwanie | ☐ przejścia między aktywnościami |
| ☐ inne: | |

Jak zmienia się zachowanie w zależności od tych warunków?

6. Bezpieczne przestrzenie i osoby

Gdzie / przy kim osoba może wracać do regulacji bez dodatkowych wymagań?

7. Konteksty eskalacji i profilaktyka

Kiedy najczęściej rośnie ryzyko eskalacji?

- | | |
|---|--|
| ☐ oczekiwanie / czekanie | ☐ koniec aktywności |
| ☐ zmiana planu | ☐ hałas / tłok |
| ☐ kontakt społeczny | ☐ korekta zachowania |
| ☐ brak wpływu | ☐ przejście do innego miejsca |
| ☐ zmęczenie / głód / ból | ☐ inne: |

Co może zmniejszyć ryzyko eskalacji?

- | | |
|--|---|
| ☐ uprzedzenie / przygotowanie | ☐ timer / plan wizualny |
| ☐ wybór kiedy / jak / w jakiej kolejności | ☐ negocjacja / omówienie |
| ☐ jasny koniec | ☐ brak pośpiechu |
| ☐ obecność bliskiej osoby | ☐ dostęp do regulacji sensorycznej |
| ☐ inne: | |

Czy są sytuacje bez agresji mimo trudności?

- ☐ Tak ☐ Nie ☐ Nie wiem

Jeśli tak – gdzie / kiedy i co wtedy pomaga?