## STATISTIC STATISTIC

#### RICARDO



Departamento de matemática y física, FIMGC-USNCH

 $E ext{-}mail$ : ricardomallqui6@gmail.com

URL: www.fractales.com

Estadística en artistas Ricardo Michel Mallqui Baños

Un libro de estadística, basado en código Asymptote y LaTeX.

#### Bibliografia.

Incluye Indice.

1. Estadística descriptiva 2. Estadística Inferencial



Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esto libro puede ser reproducido en cualquier forma, o por cualquier medio, sin permiso por escrito del editor.

Departamento de matemática y física, FIMGC-USNCH

 ${\it E-mail:}$  ricardomallqui6@gmail.com

URL: www.fractales.com

## Índice general

Índice general	I										
Lista de figuras	II										
ista de tablas											
Presentación	v										
I Estadística descriptiva	VI										
1. Preliminares	1										
1.1. Conceptos básicos	1 1										
1.2. Organización de datos en tablas de frecuencias	2 2										
1.2.2. Distribución de frecuencias continuas	4										
1.3.1. Histograma de frecuencias	4										
1.3.2. Gráficos circulares	4										
2. Medidas estadísticas de variables cuantitativas	7										
2.1. Medidas de tendencia central	7										
2.1.1. Media	8										
2.1.3. Moda	8										
2.2. Medidas de dispersión	8										
2.3. Medidas de variacion	8										
3. Variables estadísticas bidimensionales	9										
II Cálculo de probabilidades	12										
4. Variables aleatorias	13										
5. www	14										

6. Variables aleatorias discretas	15
7. Variables aleatorias continuas	16
III Inferencial estadística	19
8. Distribuciones muestrales	21
Referencias	22
Índices	22
A. Sistemas de coordenadas	I

## Lista de figuras

1.1.	Histograma de frecuencias	4
1.2.	Circular	Ę
1.3.	Diagrama de barras	E
	Meadiana	
3.1.	$f(x)$ wwww $\left(x, \frac{f(x)+g(x)}{2}\right)$ www	11
5.1.		14
7.1.	www2	16
7.2.	wwwww	17
7.3.	wwwww	18
8.1.	Normal	21

## Lista de tablas

1.1.	Combinaciones de los tres segmentos de la seccion aurea	;
2.1.	Combinaciones de los tres segmentos de la seccion aurea	7
	Combinaciones de los tres segmentos de la seccion aurea	
3.2.	www	1(

## Presentación

## Parte I Estadística descriptiva

#### **Preliminares**

#### 1.1. Conceptos básicos

**Definición 1.1 (Poblacion)** A statistical population is a data set (usually large, sometimes conceptual) that is our target of interest.

**Definición 1.2 (Poblacion)** A statistical population is a data set (usually large, sometimes conceptual) that is our target of interest.

**Definición 1.3 (Poblacion)** A statistical population is a data set (usually large, sometimes conceptual) that is our target of interest.

**Definición 1.4 (Poblacion)** A statistical population is a data set (usually large, sometimes conceptual) that is our target of interest.

**Definición 1.5 (Poblacion)** A statistical population is a data set (usually large, sometimes conceptual) that is our target of interest.

Teorema 1.6 wwwwwwwwwwwwwwwww

#### 1.1.1. Variables estadísticas

Definición 1.7 (Variables cuantitativas) Una variable estadística es una característica que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de adoptar diferentes valores, los cuales pueden medirse u observarse. Las variables adquieren valor cuando se relacionan con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o de una teoría. Existen dos clases de variables: Cualitativas y cuantitativas.

- 1. Cualitativas. Son aquellas variables que están propensos a ser nominadas textualmente.
  - a) Nominales. Son características que simplemente nominan y están propensos a ser jerarquizados u ordenados tales como: El estado civil (soltero, casado, divorciado, viudo), Religión (católica, evangélico, judío, etc).

- b) Ordinales. Son características que que si están propensos a ser jerarquizados tales como: Nivel de instrucción (inicial, primaria, secundaria, superior).
- 2. Cuantitativas. Son aquellas variables que están propensos a ser medidas mediante números ya sean números enteros o reales.
  - a) Discretas. Aquellas que solo son medidos mediante números enteros por ejemplo: Número de hijos y número de habitaciones.
  - b) Continuas. Aquellas que solo son medidos mediante números reales es decir este incluye a los números racionales e irracionales. Estatura, volumen, peso.

## 1.2. Organización de datos en tablas de frecuencias

#### 1.2.1. Distribución de frecuencias

El uso de tablas de distribución de frecuencias y gráficas como un medio para presentar la información de un conjunto de datos de forma resumida. En grados anteriores ya se ha trabajado con gráficas para variables cuantitativas discretas, por lo que esta será la primera vez que el estudiante trabajará con gráficas que son adecuadas para presentar información de variables cuantitativas continuas.

**Definición 1.8** La tabulación es un proceso en el cual los datos son ordenados en grupos llamados clases para un análisis más eficaz de estos, los datos podrían estar clasificados mediante una variable cualitativa o cuantitativa en el caso de las variables cualitativas  $Y_i$ , se considera la siguiente Tabla 1.1

En el caso de variables cuantitativas ademas si los datos son muy variados, que para se clasificados adecuadamente, necesitan generarse particiones de longitudes semejantes entonces se utiliza el siguiente proceso; el número de las particiones r se consideran de acuerdo a tres criterios.

- 1. Criterio del investigador r no puede ser más de 20 ni menos de 5
- 2.  $r = \sqrt{n}$  donde n es el número de datos
- 3. La regla de Starges que consiste en considerar la fórmula  $r=3,322 \cdot \log_{10} n$  Una vez establecido el número de particiones se procede a generar los límites laterales de cada una de las particiones, sea L la longitud de todo el conjunto es decir  $L=x_{\rm max}-x_{\rm min}$  entonces la longitud de las particiones o amplitud interválica se obtiene con  $l=\frac{L}{r}$

Cuadro 1.1: Combinaciones de los tres segmentos de la seccion aurea

$Y_i$	$f_i$	$F_{i}$	$F_i*$	$h_i$	$H_i$	$H_i$	$h_i \%$	$H_i \%$	$H_i * \%$
2	1	1.00	20.00	0.05	0.05	0.0025	0.25	0.25	0.2500
3	2	3.00	19.00		0.15	0.0050	0.50	0.50	0.7500
4	5	8.00	17.00	0.25	0.40	0.0125	1.25	1.25	2.0000
5	7	15.00	12.00	0.35	0.75	0.0175	1.75	1.75	3.7500
6	4	19.00	5.00	0.20	0.95	0.0100	1.00	1.00	4.7500
7	1	20.00	1.00	0.05	1.00	0.0025	0.25	0.25	5.0000
$\sum$	20						5		

Tenga en cuenta que n es el número de datos, es decir

$$n = f_1 + f_2 + \ldots + f_r = \sum_{i=1}^r f_i$$

donde  $f_i$  es número de datos en la partición  $X_i$ , una de las r particiones del conjunto total de datos.

- 1. Las frecuencias absolutas  $f_i$  indican el número de datos con la característica  $X_i$ .
- 2. Las frecuencias absolutas acumuladas menor que  $F_i$  se obtienen mediantela fórmula

$$F_m = f_1 + f_2 + \ldots + f_m = \sum_{i=1}^m f_i.$$

3. Las frecuencias absolutas acumuladas mayor que  $F_i^*$  obedecen a la fórmula

$$F_m^* = f_m + f_{m+1} + \dots + f_r$$

$$= \sum_{i=m}^r f_i$$

$$= n - \sum_{i=1}^{m-1} f_i$$

$$= n - (f_1 + f_2 + \dots + f_{m-1})$$

4. Las frecuencias absolutas relativas se obtienen mediante la fórmula

$$h_m = \frac{f_m}{n}$$

5. Las frecuencias absolutas relativas menor que obedecen a la fórmula

$$H_m = \frac{f_m}{n}$$

6. Las frecuencias absolutas relativas mayor que son

$$H_m^* = \frac{F_m}{n}$$

- 7. Las frecuencias absolutas relativas porcentuales obedece $h_i\,\%=100\cdot h_i$
- 8. Las frecuencias absolutas relativas menor que porcentuales obedecen a la fórmula  $H_i \% = 100 \cdot H_i$
- 9. Las frecuencias absolutas relativas mayor que porcentuales obedecen a la fórmula  $H_i^*\,\%=100\cdot H_i^*$
- 10.  $Y_i$  marca de clase o punto medio de la clase i

#### 1.2.2. Distribución de frecuencias continuas

#### 1.3. Gráficos estadísticos

#### 1.3.1. Histograma de frecuencias




Figura 1.1: Histograma de frecuencias

#### 1.3.2. Gráficos circulares




Figura 1.2: Circular

#### 1.3.3. Diagrama de barras



Figura 1.3: Diagrama de barras



Figura 1.4: Meadiana

## Medidas estadísticas de variables cuantitativas

#### 2.1. Medidas de tendencia central

Son aquellas medidas que buscan un dato representivo central de un conjunto de datos tales como la media, la moda y la mediana.

Definición 2.1 (Datos agrupados y no agrupados) La principal diferencia entre los datos agrupados y los no agrupados es que los agrupados están clasificados según un criterio y los no agrupados se encuentran en el mismo formato que cuando se

#### Comentario 2.1 ()

.

Cuadro 2.1: Combinaciones de los tres segmentos de la seccion aurea.

Clase	$Y_i$	$f_i$	$F_{i}$	 $H_i^* \%$
$[y_1, y_2)$				 $H_1^* \%$
$[y_2,y_3)$	$y_2$	$f_2$		 $H_1^*\%$
$[y_3,y_4)$	$y_3$	$f_3$		 $H_1^*\%$
:	:	:		:

- 2.1.1. Media
- 2.1.2. Mediana
- 2.1.3. Moda
- 2.2. Medidas de dispersión
- 2.3. Medidas de variacion

## Variables estadísticas bidimensionales

When we put (vertically) large expressions inside of parentheses (or brackets, or curly braces, etc.), the parentheses don't resize to fit the expression and instead remain relatively small. For instance,

$$f(x) = \pi(\frac{\sqrt{x}}{x-1})$$

comes out as

When we put (vertically) large expressions inside of parentheses (or brackets, or curly braces, etc.), the parentheses don't resize to fit the expression and instead remain relatively small. For instance,

$$f(x) = \pi(\frac{\sqrt{x}}{x-1})$$

comes out as

When we put (vertically) large expressions inside of parentheses (or brackets, or curly braces, etc.), the parentheses don't resize to fit the expression and instead remain relatively small. For instance,

$$f(x) = \pi(\frac{\sqrt{x}}{x - 1})$$

comes out as

Cuadro 3.1: Combinaciones de los tres segmentos de la seccion aurea.

$Y_i$	$f_i$	$F_i$	$F_i*$	$h_i$	$H_i$	$H_i$	$h_i \%$	$H_i\%$	$H_i * \%$
2	1	1.0000	20.0000		0.0500	0.0025	0.2500	0.2500	0.2500
3	2	3.0000	19.0000		0.1500	0.0050	0.5000	0.5000	0.7500
4	5	8.0000	17.0000	0.2500	0.4000	0.0125	1.2500	1.2500	2.0000

Continúa en la proxima página

Cuadro 3.1 – continua de la página anterior

$Y_{i}$	$f_i$	$F_i$	$F_i*$		$H_i$	$H_i$	$h_i\%$	$H_i\%$	$H_i * \%$
5	7	15.0000	12.0000	0.3500	0.7500	0.0175	1.7500	1.7500	3.7500
6	4	19.0000	5.0000	0.2000	0.9500	0.0100	1.0000	1.0000	4.7500
7	1	20.0000	1.0000		1.0000	0.0025	0.2500	0.2500	5.0000
	20						5		

Cuadro 3.2: www.

Variables	$y_1$	$y_2$	 $y_j$	 $y_n$	Total
$x_1$	$f_{11}$	$f_{12}$	 $f_{1j}$	 $f_{1e}$	$f_1$
$x_2$	$f_{21}$	$f_{22}$	 $f_{2j}$	 $f_{2e}$	$f_2$
$x_i$	$f_{i1}$	$f_{i2}$	 $f_{ij}$	 $f_{ie}$	$f_j$
$x_k$	$f_{k1}$	$f_{k2}$	 $f_{kj}$	 $f_{ke}$	$f_k$
Total	$f_{1}$	$f \cdot_2$	 $f \cdot_j$	 $f_n$	$n = \sum_{1}^{n} \sum_{1}^{n} f_{ij}$



Figura 3.1: f(x) wwww  $\left(x, \frac{f(x) + g(x)}{2}\right)$  www

## Parte II Cálculo de probabilidades

## Variables aleatorias

Definición 4.1 (Experimento aleatorio) El porceso en el cual
<b>Definición 4.2 (Espacio muestral)</b> El porceso en el cual
Definición 4.3 (Suceso) El porceso en el cual
Definición 4.4 (Evento) El porceso en el cual Se donta con $\epsilon$
Definición 4.5 (title) wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Comentario 4.1 (title) wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Teorema 4.6 (title) wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
Proposición 4 6 1 (title) ของของของของของของของ

### $\mathbf{w}\mathbf{w}\mathbf{w}$



Figura 5.1:

## Variables aleatorias discretas

## Variables aleatorias continuas



Figura 7.1: www2



Figura 7.2: wwwwww



Figura 7.3: wwwwww

# Parte III Inferencial estadística

La inferencia estadística es primordialmente de naturaleza inductiva y llega a generalizar respecto de las características de una población valiéndose de observaciones empíricas de la muestra.

Al utilizar estadísticas muestrales para estudiar un parámetro de la población es muy normal que ambos sean diferentes y la igualdad entre ambos sea mera coincidencia. La diferencia entre la estadística muestral y el correspondiente parámetro de la población se suele llamar error de estimación. Solo conoceríamos dicho error si se conociera el parámetro poblacional que por lo general se desconoce. La única forma de tener alguna certeza al respecto es hacer todas las observaciones posibles del total de la población; en la mayoría de las aplicaciones prácticas es imposible o impracticable.

## Distribuciones muestrales

La inferencia estadística es primordialmente de naturaleza inductiva y llega a generalizar respecto de las características de una población valiéndose de observaciones empíricas de la muestra.



Figura 8.1: Normal

(Hilbert y Cohn-Vossen, 2020). "Geometry and the Imagination" this environment shares the counter of the previously defined thm environment. (Gutiérrez, 2015) (Gallego, Cid, Brito, y Rojas, 2020)

## Referencias

- Gallego, J. C., Cid, C. D. V., Brito, J. G., y Rojas, A. V. (2020). Introducción a las técnicas de investigación social. (Google-Books-ID: 3HGUDAAAQBAJ)
- Gutiérrez, S. J. (2015). Competencia matemática y mediación del aprendizaje, en estudiantes de la escuela de formación profesional de educación primaria, unsch 2015, (tesis de maestría). UNSCH, Ayacucho. Descargado de http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/1357
- Hilbert, D., y Cohn-Vossen, S. (2020). Geometry and the imagination. American Mathematical Society. Descargado de https://books.google.com.pe/books?id=5y1tzgEACAAJ

## Índice alfabético

```
frecuencias absolutas, 3
frecuencias absolutas acumuladas menor que, 3
frecuencias absolutas relativas, 3
frecuencias absolutas relativas menor que, 3
www, 21
wwww, 21
wwww, 21
wwww3, 21
wwww, 21
```

# Apéndice A Sistemas de coordenadas