

# STATISTIC STATISTIC

RICARDO



Departamento de matemática y física, FIMGC-USNCH  
*E-mail:* ricardomallqui6@gmail.com  
*URL:* [www.fractales.com](http://www.fractales.com)

Estadística en artistas  
Ricardo Michel Mallqui Baños

Un libro de estadística, basado en código Asymptote y LaTeX.

Bibliografía.

Incluye Índice.

1. Estadística descriptiva 2. Estadística Inferencial



Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducido en cualquier forma, o por cualquier medio, sin permiso por escrito del editor.

Departamento de matemática y física, FIMGC-USNCH

*E-mail:* ricardomallqui6@gmail.com

**URL:** [www.fractales.com](http://www.fractales.com)

# Índice general

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Índice general                                                | I         |
| Lista de figuras                                              | II        |
| Lista de tablas                                               | III       |
| Presentación                                                  | V         |
| <br>                                                          |           |
| <b>I Estadística descriptiva</b>                              | <b>VI</b> |
| <b>1. Preliminares</b>                                        | <b>1</b>  |
| 1.1. Conceptos básicos . . . . .                              | 1         |
| 1.1.1. Variables estadísticas . . . . .                       | 1         |
| 1.2. Organización de datos en tablas de frecuencias . . . . . | 2         |
| 1.2.1. Distribución de frecuencias . . . . .                  | 2         |
| 1.2.2. Distribución de frecuencias continuas . . . . .        | 4         |
| 1.3. Gráficos estadísticos . . . . .                          | 4         |
| 1.3.1. Histograma de frecuencias . . . . .                    | 4         |
| 1.3.2. Gráficos circulares . . . . .                          | 4         |
| 1.3.3. Diagrama de barras . . . . .                           | 5         |
| <b>2. Medidas estadísticas de variables cuantitativas</b>     | <b>6</b>  |
| 2.1. Medidas de tendencia central . . . . .                   | 6         |
| 2.1.1. Media . . . . .                                        | 7         |
| 2.1.2. Mediana . . . . .                                      | 7         |
| 2.1.3. Moda . . . . .                                         | 7         |
| 2.2. Medidas de dispersión . . . . .                          | 7         |
| 2.3. Medidas de variación . . . . .                           | 7         |
| <b>3. Variables estadísticas bidimensionales</b>              | <b>8</b>  |
| <br>                                                          |           |
| <b>II Cálculo de probabilidades</b>                           | <b>11</b> |
| <b>4. Variables aleatorias</b>                                | <b>12</b> |
| <b>5. www</b>                                                 | <b>13</b> |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 6. Variables aleatorias discretas | 14     |
| 7. Variables aleatorias continuas | 15     |
| <br>III Inferencial estadística   | <br>18 |
| 8. Distribuciones muestrales      | 20     |
| Referencias                       | 21     |
| <br>Índices                       | <br>21 |
| A. Sistemas de coordenadas        | I      |

# Lista de figuras

|      |                                                               |    |
|------|---------------------------------------------------------------|----|
| 1.1. | Histograma de frecuencias . . . . .                           | 4  |
| 1.2. | Circular . . . . .                                            | 4  |
| 1.3. | Diagrama de barras . . . . .                                  | 5  |
| 1.4. | Madiana . . . . .                                             | 5  |
| 3.1. | $f(x)$ www $\left(x, \frac{f(x)+g(x)}{2}\right)$ ww . . . . . | 10 |
| 5.1. | . . . . .                                                     | 13 |
| 7.1. | www2 . . . . .                                                | 15 |
| 7.2. | wwwww . . . . .                                               | 16 |
| 7.3. | wwwww . . . . .                                               | 17 |
| 8.1. | Normal . . . . .                                              | 20 |

# Lista de tablas

|                                                                       |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 1.1. Combinaciones de los tres segmentos de la seccion aurea. . . . . | 3 |
| 2.1. Combinaciones de los tres segmentos de la seccion aurea. . . . . | 6 |
| 3.1. Combinaciones de los tres segmentos de la seccion aurea. . . . . | 8 |
| 3.2. www. . . . .                                                     | 9 |

# Presentación

Este libro se elaboró

Double underlined text Double underlined text

*Slanted underlined* SMALL CAPS UNDERLINED

Parte I

**Estadística descriptiva**



# Capítulo 1

## Preliminares

### 1.1. Conceptos básicos

**Definición 1.1 (Poblacion)** *A statistical population is a data set (usually large, sometimes conceptual) that is our target of interest.*

**Definición 1.2 (Poblacion)** *A statistical population is a data set (usually large, sometimes conceptual) that is our target of interest.*

**Definición 1.3 (Poblacion)** *A statistical population is a data set (usually large, sometimes conceptual) that is our target of interest.*

**Definición 1.4 (Poblacion)** *A statistical population is a data set (usually large, sometimes conceptual) that is our target of interest.*

**Definición 1.5 (Poblacion)** *A statistical population is a data set (usually large, sometimes conceptual) that is our target of interest.*

**Teorema 1.6** *wwwwwwwwwwwwwwwwww*

#### 1.1.1. Variables estadísticas

**Definición 1.7 (Variables cuantitativas)** *Una variable estadística es una característica que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de adoptar diferentes valores, los cuales pueden medirse u observarse. Las variables adquieren valor cuando se relacionan con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o de una teoría. Existen dos clases de variables: Cualitativas y cuantitativas.*

1. *Cualitativas. Son aquellas variables que están propensos a ser nominadas textualmente.*
  - a) *Nominales. Son características que simplemente nominan y están propensos a ser jerarquizados u ordenados tales como: El estado civil (soltero, casado, divorciado, viudo), Religión (católica, evangélico, judío, etc).*

- b) *Ordinales. Son características que que si están propensos a ser jerarquizados tales como: Nivel de instrucción (inicial, primaria, secundaria, superior).*
- 2. *Cuantitativas. Son aquellas variables que están propensos a ser medidas mediante números ya sean números enteros o reales.*
  - a) *Discretas. Aquellas que solo son medidos mediante números enteros por ejemplo: Número de hijos y número de habitaciones.*
  - b) *Continuas. Aquellas que solo son medidos mediante números reales es decir este incluye a los números racionales e irracionales. Estatura, volumen, peso.*

## 1.2. Organización de datos en tablas de frecuencias

### 1.2.1. Distribución de frecuencias

El uso de tablas de distribución de frecuencias y gráficas como un medio para presentar la información de un conjunto de datos de forma resumida. En grados anteriores ya se ha trabajado con gráficas para variables cuantitativas discretas, por lo que esta será la primera vez que el estudiante trabajará con gráficas que son adecuadas para presentar información de variables cuantitativas continuas.

**Definición 1.8** *La tabulación es un proceso en el cual los datos son ordenados en grupos llamados clases para un análisis más eficaz de estos, los datos podrían estar clasificados mediante una variable cualitativa o cuantitativa en el caso de las variables cualitativas  $Y_i$ , se considera la siguiente Tabla 1.1*

En el caso de variables cuantitativas además si los datos son muy variados, que para ser clasificados adecuadamente, necesitan generarse particiones de longitudes semejantes entonces se utiliza el siguiente proceso; el número de las particiones  $r$  se consideran de acuerdo a tres criterios.

1. Criterio del investigador  $r$  no puede ser más de 20 ni menos de 5
2.  $r = \sqrt{n}$  donde  $n$  es el número de datos
3. La regla de Sturges que consiste en considerar la fórmula  $r = 3,322 \cdot \log_{10} n$   
Una vez establecido el número de particiones se procede a generar los límites laterales de cada una de las particiones, sea  $L$  la longitud de todo el conjunto es decir  $L = x_{\max} - x_{\min}$  entonces la longitud de las particiones o amplitud intervállica se obtiene con  $l = \frac{L}{r}$

Cuadro 1.1: Combinaciones de los tres segmentos de la seccion aurea.

| $Y_i$    | $f_i$ | $F_i$ | $F_i^*$ | $h_i$ | $H_i$ | $H_i$  | $h_i \%$ | $H_i \%$ | $H_i * \%$ |
|----------|-------|-------|---------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| 2        | 1     | 1.00  | 20.00   | 0.05  | 0.05  | 0.0025 | 0.25     | 0.25     | 0.2500     |
| 3        | 2     | 3.00  | 19.00   | 0.10  | 0.15  | 0.0050 | 0.50     | 0.50     | 0.7500     |
| 4        | 5     | 8.00  | 17.00   | 0.25  | 0.40  | 0.0125 | 1.25     | 1.25     | 2.0000     |
| 5        | 7     | 15.00 | 12.00   | 0.35  | 0.75  | 0.0175 | 1.75     | 1.75     | 3.7500     |
| 6        | 4     | 19.00 | 5.00    | 0.20  | 0.95  | 0.0100 | 1.00     | 1.00     | 4.7500     |
| 7        | 1     | 20.00 | 1.00    | 0.05  | 1.00  | 0.0025 | 0.25     | 0.25     | 5.0000     |
| $\Sigma$ | 20    |       |         |       |       |        | 5        |          |            |

Tenga en cuenta que  $n$  es el número de datos, es decir

$$n = f_1 + f_2 + \dots + f_r = \sum_{i=1}^r f_i$$

donde  $f_i$  es número de datos en la partición  $X_i$ , una de las  $r$  particiones del conjunto total de datos.

1. Las frecuencias absolutas  $f_i$  indican el número de datos con la característica  $X_i$ .
2. Las frecuencias absolutas acumuladas menor que  $F_i$  se obtienen mediante la fórmula

$$F_m = f_1 + f_2 + \dots + f_m = \sum_{i=1}^m f_i.$$

3. Las frecuencias absolutas acumuladas mayor que  $F_i^*$  obedecen a la fórmula

$$\begin{aligned} F_m^* &= f_m + f_{m+1} + \dots + f_r \\ &= \sum_{i=m}^r f_i = n - \sum_{i=1}^{m-1} f_i = n - (f_1 + f_2 + \dots + f_{m-1}) \end{aligned}$$

4. Las frecuencias absolutas relativas se obtienen mediante la fórmula

$$h_m = \frac{f_m}{n}$$

5. Las frecuencias absolutas relativas menor que obedecen a la fórmula

$$H_m = \frac{f_m}{n}$$

6. Las frecuencias absolutas relativas mayor que

$$H_m^* = \frac{F_m}{n}$$

7. Las frecuencias absolutas relativas porcentuales  $h_i \% = 100 \cdot h_i$

8. Las frecuencias absolutas relativas menor que porcentuales  $H_i \% = 100 \cdot H_i$
9. Las frecuencias absolutas relativas mayor que porcentuales  $H_i^* \% = 100 \cdot H_i^*$
10.  $Y_i$  marca de clase o punto medio de la clase  $i$

### 1.2.2. Distribución de frecuencias continuas

## 1.3. Gráficos estadísticos

### 1.3.1. Histograma de frecuencias



Figura 1.1: Histograma de frecuencias

### 1.3.2. Gráficos circulares



Figura 1.2: Circular

### 1.3.3. Diagrama de barras



Figura 1.3: Diagrama de barras



Figura 1.4: Meadiana

## Capítulo 2

# Medidas estadísticas de variables cuantitativas

### 2.1. Medidas de tendencia central

Son aquellas medidas que buscan un dato representativo central de un conjunto de datos tales como la media, la moda y la mediana.

**Definición 2.1 (Datos agrupados y no agrupados)** *La principal diferencia entre los datos agrupados y los no agrupados es que los agrupados están clasificados según un criterio y los no agrupados se encuentran en el mismo formato que cuando se*

**Comentario 2.1 ()**

.

Cuadro 2.1: Combinaciones de los tres segmentos de la sección anterior.

| Clase        | $Y_i$    | $f_i$    | $F_i$ | ... | $H_i^* \%$ |
|--------------|----------|----------|-------|-----|------------|
| $[y_1, y_2)$ | $y_1$    | $f_1$    | ...   | ... | $H_1^* \%$ |
| $[y_2, y_3)$ | $y_2$    | $f_2$    | ...   | ... | $H_1^* \%$ |
| $[y_3, y_4)$ | $y_3$    | $f_3$    | ...   | ... | $H_1^* \%$ |
| $\vdots$     | $\vdots$ | $\vdots$ | ...   | ... | $\vdots$   |

| $[y_{r-1}, y_r]$ | $y_r$ | $f_r$ | $\dots$ | $\dots$ | $H_1^* \%$ |
|------------------|-------|-------|---------|---------|------------|
|------------------|-------|-------|---------|---------|------------|

---

2.1.1. Media

2.1.2. Mediana

2.1.3. Moda

2.2. Medidas de dispersión

2.3. Medidas de variacion

## Capítulo 3

# Variables estadísticas bidimensionales

When we put (vertically) large expressions inside of parentheses (or brackets, or curly braces, etc.), the parentheses don't resize to fit the expression and instead remain relatively small. For instance,

$$f(x) = \pi\left(\frac{\sqrt{x}}{x-1}\right)$$

comes out as

When we put (vertically) large expressions inside of parentheses (or brackets, or curly braces, etc.), the parentheses don't resize to fit the expression and instead remain relatively small. For instance,

$$f(x) = \pi\left(\frac{\sqrt{x}}{x-1}\right)$$

comes out as

When we put (vertically) large expressions inside of parentheses (or brackets, or curly braces, etc.), the parentheses don't resize to fit the expression and instead remain relatively small. For instance,

$$f(x) = \pi\left(\frac{\sqrt{x}}{x-1}\right)$$

comes out as

Cuadro 3.1: Combinaciones de los tres segmentos de la seccion aurea.

| $Y_i$ | $f_i$ | $F_i$  | $F_i^*$ | $h_i$  | $H_i$  | $H_i$  | $h_i \%$ | $H_i \%$ | $H_i * \%$ |
|-------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|----------|----------|------------|
| 2     | 1     | 1.0000 | 20.0000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0025 | 0.2500   | 0.2500   | 0.2500     |
| 3     | 2     | 3.0000 | 19.0000 | 0.1000 | 0.1500 | 0.0050 | 0.5000   | 0.5000   | 0.7500     |
| 4     | 5     | 8.0000 | 17.0000 | 0.2500 | 0.4000 | 0.0125 | 1.2500   | 1.2500   | 2.0000     |

Continúa en la proxima página



**Cuadro 3.1 – continua de la página anterior**

| $Y_i$ | $f_i$ | $F_i$   | $F_i^*$ | $h_i$  | $H_i$  | $H_i$  | $h_i \%$ | $H_i \%$ | $H_i * \%$ |
|-------|-------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|----------|------------|
| 5     | 7     | 15.0000 | 12.0000 | 0.3500 | 0.7500 | 0.0175 | 1.7500   | 1.7500   | 3.7500     |
| 6     | 4     | 19.0000 | 5.0000  | 0.2000 | 0.9500 | 0.0100 | 1.0000   | 1.0000   | 4.7500     |
| 7     | 1     | 20.0000 | 1.0000  | 0.0500 | 1.0000 | 0.0025 | 0.2500   | 0.2500   | 5.0000     |
|       | 20    |         |         |        |        |        | 5        |          |            |

Cuadro 3.2: www.

| Variables | $y_1$         | $y_2$         | $\dots$ | $y_j$         | $\dots$ | $y_n$         | Total                          |
|-----------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|--------------------------------|
| $x_1$     | $f_{11}$      | $f_{12}$      | $\dots$ | $f_{1j}$      | $\dots$ | $f_{1e}$      | $f_1$                          |
| $x_2$     | $f_{21}$      | $f_{22}$      | $\dots$ | $f_{2j}$      | $\dots$ | $f_{2e}$      | $f_2$                          |
| $\dots$   | $\dots$       | $\dots$       | $\dots$ | $\dots$       | $\dots$ | $\dots$       | $\dots$                        |
| $x_i$     | $f_{i1}$      | $f_{i2}$      | $\dots$ | $f_{ij}$      | $\dots$ | $f_{ie}$      | $f_j$                          |
| $\dots$   | $\dots$       | $\dots$       | $\dots$ | $\dots$       | $\dots$ | $\dots$       | $\dots$                        |
| $x_k$     | $f_{k1}$      | $f_{k2}$      | $\dots$ | $f_{kj}$      | $\dots$ | $f_{ke}$      | $f_k$                          |
| Total     | $f_{\cdot 1}$ | $f_{\cdot 2}$ | $\dots$ | $f_{\cdot j}$ | $\dots$ | $f_{\cdot n}$ | $n = \sum_1^n \sum_1^n f_{ij}$ |



Figura 3.1:  $f(x)$   $\left(x, \frac{f(x)+g(x)}{2}\right)$

**Parte II**

**Cálculo de probabilidades**

## Capítulo 4

## Variables aleatorias

**Definición 4.1 (Experimento aleatorio)** *El porceso en el cual .....  
Se donata con  $\epsilon$*

**Definición 4.2 (Espacio muestral)** *El porceso en el cual ..... Se donda con  $\epsilon$*

**Definición 4.3 (Suceso)** *El porceso en el cual ..... Se donda con  $\epsilon$*

**Definición 4.4 (Evento)** *El porceso en el cual ..... Se donda con  $\epsilon$*

Definición 4.5 (title) ~~~~~

**Comentario 4.1 (title)** *xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

**Teorema 4.6 (title)** wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Proposición 4.6.1 (title) *xxxxxxxxxxxxxxxx*

## Capítulo 5

WWW



Figura 5.1:

## Capítulo 6

# Variables aleatorias discretas

## Capítulo 7

# Variables aleatorias continuas



Figura 7.1: www2



Figura 7.2: wwwwww





Figura 7.3: wwwwww

**Parte III**

**Inferencial estadística**

La inferencia estadística es primordialmente de naturaleza inductiva y llega a generalizar respecto de las características de una población valiéndose de observaciones empíricas de la muestra.

Al utilizar estadísticas muestrales para estudiar un parámetro de la población es muy normal que ambos sean diferentes y la igualdad entre ambos sea mera coincidencia. La diferencia entre la estadística muestral y el correspondiente parámetro de la población se suele llamar error de estimación. Solo conoceríamos dicho error si se conociera el parámetro poblacional que por lo general se desconoce. La única forma de tener alguna certeza al respecto es hacer todas las observaciones posibles del total de la población; en la mayoría de las aplicaciones prácticas es imposible o impracticable.

## Capítulo 8

# Distribuciones muestrales

La inferencia estadística es primordialmente de naturaleza inductiva y llega a generalizar respecto de las características de una población valiéndose de observaciones empíricas de la muestra.

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW



Figura 8.1: Normal

(Hilbert y Cohn-Vossen, 2020). “Geometry and the Imagination” this environment shares the counter of the previously defined thm environment. (Gutiérrez, 2015) (Gallego, Cid, Brito, y Rojas, 2020)

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

# Referencias

- Gallego, J. C., Cid, C. D. V., Brito, J. G., y Rojas, A. V. (2020). Introducción a las técnicas de investigación social. (Google-Books-ID: 3HGUDAAAQBAJ)
- Gutiérrez, S. J. (2015). *Competencia matemática y mediación del aprendizaje, en estudiantes de la escuela de formación profesional de educación primaria, unsch - 2015*, (tesis de maestría). UNSCH, Ayacucho. Descargado de <http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/1357>
- Hilbert, D., y Cohn-Vossen, S. (2020). *Geometry and the imagination*. American Mathematical Society. Descargado de <https://books.google.com.pe/books?id=5y1tzgEACAAJ>

# Índice alfabético

frecuencias absolutas, 3  
frecuencias absolutas acumuladas menor que, 3  
frecuencias absolutas relativas, 3  
frecuencias absolutas relativas menor que, 3  
  
www, 20  
    www, 20  
    www2, 20  
    www3, 20  
wwwwww, 20

## Apéndice A

# Sistemas de coordenadas