

ĐỀ THI GIỮA KỲ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Đề thi giữa kỳ đại số tuyến tính ??? – ???

Câu 1: Giải hệ phương trình tuyến tính sau:

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 0 \\ 3x_1 + x_3 + 6x_4 = -2 \\ 5x_1 + 7x_2 + 9x_3 + 8x_4 = 6 \\ -x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 2 \end{cases}$$

Câu 2: Giả sử A là ma trận khả nghịch. Chứng minh điều sau:

a) $A^2 \neq 0$.

b) $A^k \neq 0$ với mọi $k > 2$.

Câu 3: Tính các định thức sau:

a)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & m \\ m-1 & 2 & 3 \\ 3 & m+1 & 3 \end{bmatrix}$$

b)

$$B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Câu 4: Cho

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

a) Tìm ma trận phụ hợp $\text{adj}(A)$ của A .

b) Từ đó, tính A^{-1} .

Đề thi giữa kỳ đại số tuyến tính 2009 – 2010

Câu 1: Cho các ma trận $B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ và $C = \begin{bmatrix} -4 & 0 & 3 \\ -6 & 7 & 1 \end{bmatrix}$. Tồn tại hay không một ma trận A sao cho $AB = C$? Nếu có hãy tìm tất cả những ma trận A như vậy.

Câu 2: Cho ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 7 & 5 & 3 \\ 0 & a & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 4 & 0 \\ 3 & -1 & 7 & 1 \end{bmatrix}$$

trong đó $a \in \mathbb{R}$ là một tham số.

- a) Tính định thức của A .
- b) Tìm các giá trị của tham số a để ma trận A khả nghịch?

Câu 3: Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ và $B = A - I_3$.

- a) Hãy tính B^n , với n là số nguyên ≥ 1 .
- b) Áp dụng phần a) để tính $A^n, n \geq 1$.

Đề thi giữa kỳ đại số tuyến tính 2016 – 2017

Câu 1: Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}$

a) Xác định dạng bậc thang và tìm hạng của ma trận A .

b) Giải hệ phương trình tuyến tính $AX = 0$.

Câu 2: Tìm nghịch đảo của ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$.

Câu 3: Giải và biện luận (theo tham số m) hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + mx_3 = 1 \\ x_1 + mx_2 + x_3 = m \\ x_1 + x_2 - (m-1)x_3 = -2 \end{cases}$$

Câu 4: Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$. Tìm một ma trận $B \neq 0$ sao cho $AB = BA = 0$.

Đề thi giữa kỳ đại số tuyến tính 2017 – 2018

Câu 1: Cho các ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$; $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

a) Tìm ma trận nghịch đảo A^{-1} của A .

b) Tìm ma trận X sao cho $XA = AB$.

Câu 2: Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & 4 & -7 & 5 \\ 1 & 3 & -4 & 3 \end{bmatrix}$

a) Xác định dạng bậc thang và tìm hạng của ma trận A .

b) Giải hệ phương trình $AX = 0$.

Câu 3: Giải và biện luận (theo tham số m) hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + (1-m)x_3 = 1 \\ x_1 - mx_2 + 2x_3 = m+2 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 2 \end{cases}$$

Câu 4: Cho $A, B \in M_n(\mathbb{R})$, thỏa mãn $AB = 2A - 3B$. Chứng minh rằng $AB = BA$.

Đề thi giữa kỳ đại số tuyến tính 2018 – 2019

Câu 1: Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} m & -2 & 1 \\ 2 & m & 3 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$

- a) Tính định thức của ma trận A . Suy ra giá trị của m để A khả nghịch.
b) Tìm ma trận nghịch đảo của A trong trường hợp $m = 1$.

Câu 2: Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & 4 & -3 & 1 \end{bmatrix}$

- a) Xác định dạng bậc thang và tìm hạng của ma trận A .
b) Giải hệ phương trình $AX = 0$.

Câu 3: Giải và biện luận (theo tham số m) hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} 2mx_1 + (m - 3)x_2 = 4 \\ (3m + 1)x_1 + (m - 5)x_2 = m + 7 \end{cases}$$

Câu 4: Cho ma trận $A \in M_n(\mathbb{R})$ thỏa mãn $A^2 = 3A$. Chứng minh rằng $A + I_n$ là ma trận khả nghịch.

Đề thi giữa kỳ đại số tuyến tính 2019 – 2020

Câu 1: Kiểm tra tính khả nghịch và tìm A^{-1} nếu có với

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Câu 2: Giải và biện luận hệ phương trình sau theo tham số m :

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 7 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 8 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 9 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 = m \end{cases}$$

Câu 3: Cho hai ma trận $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -5 & 4 \\ 1 & -3 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$; $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -5 & 4m \\ 1 & -3 & 5 & 6m \\ m & m & -2m & m^2 \\ 0 & 1 & 1 & m \end{bmatrix}$

a) Tính định thức $\det A$.

b) Xác định tất cả các giá trị của tham số thực m sao cho $\det B = \det(2A)$

Câu 4: Vết của một ma trận vuông $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$, ký hiệu $\text{tr}(A)$, được định nghĩa là tổng của tất cả các hệ số trên đường chéo chính của A , nghĩa là $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$. Chứng minh rằng nếu $B \in M_n(\mathbb{R})$ thỏa $\text{tr}(BB^T) = 0$ thì $B = 0$.

Đề thi giữa kỳ đại số tuyến tính 2020 – 2021

Câu 1: Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 = 2 \\ x_1 + 3x_2 + 4x_3 - x_4 - x_5 = 1 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 + 4x_5 = 3 \\ 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 4x_4 + 5x_5 = 5 \end{cases}$$

Câu 2: Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$; $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

a) Tìm ma trận nghịch đảo A^{-1} của A .

b) Tìm ma trận X sao cho $XA = AB$.

Câu 3: Giải và biện luận (theo tham số m) hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + mx_3 = 2 \\ x_1 + mx_2 + x_3 = m + 1 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 1 \end{cases}$$

Câu 4: Chứng minh rằng, với mọi $A \in M_{3 \times 2}(\mathbb{R})$ ta có $\det(A \cdot A^T) = 0$, trong đó A^T là ma trận chuyển vị của A .

ĐỀ THI CUỐI KỲ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Đề thi cuối kỳ đại số tuyến tính 2009 – 2010

Câu 1:

1) Cho ma trận $A = (a_{kj})_n$ với $a_{kj} \in \mathbb{C}$ và a_{kj} là số phức liên hợp của a_{jk} với mọi $k; j$. Chứng minh rằng $\det A$ là số thực.

2) Sử dụng các tính chất của định thức, chứng minh đẳng thức sau

$$\begin{vmatrix} a_1 + b_1x & a_1 - b_1x & c_1 & d_1 \\ a_2 + b_2x & a_2 - b_2x & c_2 & d_2 \\ a_3 + b_3x & a_3 - b_3x & c_3 & d_3 \\ a_4 + b_4x & a_4 - b_4x & c_4 & d_4 \end{vmatrix} = -2x \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \\ a_4 & b_4 & c_4 & d_4 \end{vmatrix}$$

Câu 2: Trong không gian \mathbb{R}^3 cho các hệ vector $\mathcal{B} = (u_1; u_2; u_3); \mathcal{B}' = (v_1; v_2; v_3)$ với $u_1 = (1; 0; -1); u_2 = (0; -2; 1); u_3 = (0; 0; 1); v_1 = (2; 1; -1); v_2 = (1; 1; 6); v_3 = (-1; 1; m)$.

1) Tìm m để \mathcal{B}' là cơ sở của \mathbb{R}^3 .

2) Tìm ma trận đổi cơ sở từ \mathcal{B} sang \mathcal{B}' ứng với $m = 1$.

Câu 3: Trong không gian \mathbb{R}^4 cho các không gian con $W_1 = \langle (0; 0; 1; 0); (1; 2; 1; 0); (0; 0; 1; 1) \rangle$ và $W_2 = \langle (0; 1; 0; 1); (1; 1; 0; 2); (0; 1; 1; 1) \rangle$. Hãy tìm một cơ sở của không gian con $W_1 \cap W_2$.

Câu 4: Cho các ánh xạ tuyến tính $f : U \rightarrow V$ và $g : V \rightarrow W$ mà gf là đẳng cấu. Chứng minh rằng $\text{Im } f \cap \text{Ker } g = \{0\}$ và $V = \text{Im } f + \text{Ker } g$.

Câu 5: Toán tử tuyến tính φ trên \mathbb{R}^3 trong cơ sở $\mathcal{C} = ((1; 1; 1); (1; 2; 0); (3; 0; 0))$ có ma trận là

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

Hãy tìm một cơ sở và số chiều của $\text{Ker } \varphi$ và $\text{Im } \varphi$.

Đề thi cuối kỳ đại số tuyến tính 2011 – 2012

Câu 1: Gọi W là tập hợp các ma trận đối xứng thuộc $M_n(\mathbb{R})$. Chứng minh rằng W là không gian vector của $M_n(\mathbb{R})$. Tìm số chiều và một cơ sở của W .

Câu 2: Trong không gian \mathbb{R}^3 cho các hệ vector $\mathcal{B} = (u_1; u_2; u_3)$; $\mathcal{B}' = (v_1; v_2; v_3)$ với $u_1 = (1; 0; 1)$; $u_2 = (0; 1; 0)$; $u_3 = (2; 1; 0)$; $v_1 = (0; 0; 1)$; $v_2 = (0; 1; -1)$; $v_3 = (m; 1; 1)$.

1) Tìm m để \mathcal{B}' là một cơ sở của \mathbb{R}^3 .

2) Tìm ma trận đổi cơ sở từ \mathcal{B} sang \mathcal{B}' ứng với $m = 1$.

Câu 3: Cho toán tử tuyến tính $f: V \rightarrow V$ mà $ff = f$. Chứng minh rằng:

$$\text{Im } f \cap \text{Ker } f = \{0\} \text{ và } V = \text{Im } f + \text{Ker } f$$

Câu 4: Toán tử tuyến tính φ trên \mathbb{R}^3 trong cơ sở $\mathcal{C} = ((1; 1; -1); (1; 1; 0); (2; 0; 0))$ có ma trận là

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & 3 & 0 \end{bmatrix}. \text{ Hãy tìm một cơ sở và số chiều của } \text{Ker } \varphi \text{ và } \text{Im } \varphi.$$

Đề thi cuối kỳ đại số tuyến tính 2012 – 2013

Câu 1: Cho $A = (a_{ij})_n$ là ma trận vuông cấp n ($n \geq 2$) xác định bởi

$$a_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{khi } (i; j) \in \{(2; 2); (3; 3); \dots; (n; n)\} \\ 1, & \text{khi } (i; j) \notin \{(2; 2); (3; 3); \dots; (n; n)\} \end{cases}$$

Tính $\det A$.

Câu 2: Trong không gian \mathbb{R}^3 cho các cơ sở $\mathcal{B} = (u_1; u_2; u_3)$; $\mathcal{B}' = (v_1; v_2; v_3)$ với

$$u_1 = (3; 2; 1); u_2 = (0; 2; -1); u_3 = (0; 0; 1); v_1 = (1; 1; 0); v_2 = (1; 0; -1); v_3 = (1; 1; 1).$$

Tìm ma trận đổi cơ sở từ \mathcal{B} sang \mathcal{B}' .

Câu 3: Trong không gian \mathbb{R}^4 cho các không gian con

$$W_1 = \langle (0; 0; 1; 0); (1; 2; 1; 0); (0; 0; 1; 1) \rangle \text{ và } W_2 = \langle (x_1; x_2; x_3; x_4) \in \mathbb{R}^4 | x_4 = x_2 + x_1 \rangle$$

Hãy tìm một cơ sở của không gian con $W_1 \cap W_2$.

Câu 4: Cho $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ là toán tử tuyến tính mà $f \circ f = f$. Giả sử $\mathcal{X} = (w_1; w_2; \dots; w_r)$ và

$\mathcal{Y} = (w_{1+r}; w_{2+r}; \dots; w_n)$ lần lượt là cơ sở của $\text{Ker } f$ và $\text{Im } f$.

a) Chứng minh rằng $\mathcal{C} = (w_1; w_2; \dots; w_n)$ là cơ sở của \mathbb{R}^n .

b) Hãy tìm ma trận biểu diễn của toán tử f trong cơ sở \mathcal{C} .

Câu 5: Toán tử tuyến tính φ trên \mathbb{R}^3 trong cơ sở chính tắc $\mathcal{B}_0 = ((1; 0; 0); (0; 1; 0); (0; 0; 1))$ có ma trận biểu diễn là

$$\begin{bmatrix} 1 & -18 & 15 \\ -1 & -22 & 15 \\ 2 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

Hãy tìm một cơ sở và số chiều của $\text{Ker } \varphi$ và $\text{Im } \varphi$.

Đề thi cuối kỳ đại số tuyến tính 2013 – 2014

Câu 1: Cho ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tìm tất cả các ma trận 2×2 B sao cho $B \neq 0$; $B \neq I_2$ và B thỏa tính chất $AB = BA$

Câu 2:

Giải và biện luận hệ phương trình sau theo tham số a

$$\begin{cases} x + y - z = 2 \\ x + 2y + z = 3 \\ x + y + (a^2 - 5)z = a \end{cases}$$

Câu 3: Cho A là ma trận sau:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 0 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$

Tìm một cơ sở cho

- a) Không gian dòng của A .
- b) Không gian nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất $AX = 0$.

Câu 4: Giả sử A là một ma trận có kích thước 4×3 và B là một ma trận có kích thước 3×4 . Đặt $C = AB$. Hỏi có tồn tại ma trận A và B sao cho các cột của C độc lập tuyến tính hay không? Nếu có, hãy cho một ví dụ. Nếu không, hãy chứng minh.

Câu 5: Cho $V = \mathbb{R}_2[t]$ (không gian các đa thức thực có bậc nhỏ hơn hay bằng 2). Đặt

$$C = \{2 + t; t + t^2; 1 + t^2\} \text{ và } D = \{1; 1 + t; 1 + t + t^2\}$$

- a) Kiểm tra C và D là hai cơ sở của V .
- b) Tìm ma trận chuyển cơ sở ($C \rightarrow D$).

Câu 6: Cho ánh xạ tuyến tính

$$T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x_1; x_2; x_3) \mapsto (x_1 + 2x_2 + 3x_3; 2x_1 + 3x_2 + 4x_3)$$

Đặt $B = \{(1; 2; -1); (2; -1; 2); (3; 1; -1)\}$ và $C = \{(1; 2); (2; 3)\}$

- a) Kiểm tra C và B là hai cơ sở của \mathbb{R}^2 và \mathbb{R}^3 .
- b) Tìm ma trận biểu diễn ánh xạ tuyến tính T theo cơ sở B và C , $[T]_{B; C}$.

Đề thi cuối kỳ đại số tuyến tính 2014 – 2015

Câu 1: Giải và biện luận hệ phương trình sau theo tham số $m \in \mathbb{R}$.

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = m \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 - 2x_5 = 3m \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 + x_4 - x_5 = m + 1 \\ 2x_1 - 5x_2 + x_3 - 2x_4 + 2x_5 = m - 1 \end{cases}$$

Câu 2: Trong không gian \mathbb{R}^3 cho các hệ vector $\mathcal{B} = (u_1; u_2; u_3)$; $\mathcal{B}' = (v_1; v_2; v_3)$ với $u_1 = (1; 0; -1)$; $u_2 = (0; -2; 1)$; $u_3 = (0; 1; 1)$; $v_1 = (2; 1; -1)$; $v_2 = (1; 1; 6)$; $v_3 = (-1; 1; m)$.

a) Tìm m để \mathcal{B}' là một cơ sở của \mathbb{R}^3 .

b) Tìm ma trận đổi cơ sở từ \mathcal{B} sang \mathcal{B}' ứng với $m = 1$.

Câu 3: Cho $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ thỏa điều kiện $a_{ii} > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$ với mọi i . Chứng minh rằng $\det A \neq 0$.

Câu 4: Cho các ánh xạ tuyến tính $f : U \rightarrow V$ và $g : V \rightarrow W$ mà gf là đẳng cấu. Chứng minh rằng $\text{Im } f \cap \text{Ker } g = \{0\}$ và $V = \text{Im } f + \text{Ker } g$.

Câu 5: Toán tử tuyến tính φ trên \mathbb{R}^4 trong cơ sở

$\mathcal{B}_0 = ((1; 0; 0; 0); (0; 1; 0; 0); (0; 0; 1; 0); (0; 0; 0; 1))$ có ma trận là $\begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 & 0 \\ 4 & 7 & 13 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 8 & 12 & 2 \end{bmatrix}$. Hãy tìm

một cơ sở và số chiều của $\text{Ker } \varphi$ và $\text{Im } \varphi$. Toán tử φ có phải là đơn cấu, toàn cấu không? Tại sao?

Đề thi cuối kỳ đại số tuyến tính 2015 – 2016

Câu 1: Giải và biện luận (theo tham số m) hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 = 3 \\ x_1 + (3-m)x_2 + 2x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + (m+1)x_3 = 3-m \end{cases}$$

Câu 2: Trong không gian \mathbb{R}^3 , cho các vector $u_1 = (1; 1; 2)$; $u_2 = (2; 1; 3)$; $u_3 = (3; -1; 1)$ và $u = (9; 1; 9)$.

a) Chứng minh tập hợp $\mathcal{B} = \{u_1; u_2; u_3\}$ là cơ sở của \mathbb{R}^3 và xác định tọa độ của vector u theo cơ sở \mathcal{B} .

b) Xác định cơ sở $\mathcal{C} = \{v_1; v_2; v_3\}$ của \mathbb{R}^3 sao cho ma trận chuyển cơ sở từ \mathcal{C} sang \mathcal{B} là

$$(\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B}) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -2 \\ 2 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

Câu 3: Cho W là không gian của \mathbb{R}^4 sinh bởi các vector $u_1 = (1; 1; 2; 1)$; $u_2 = (1; 2; 3; 2)$; $u_3 = (-1; 3; 1; 1)$; $u_4 = (5; -2; 5; 2)$

a) Chứng minh tập hợp $\mathcal{B} = (u_1; u_2; u_3)$ là cơ sở của W và xác định tọa độ của u_4 theo cơ sở \mathcal{B} .

b) Cho $u = (1; m; 3; m-2) \in \mathbb{R}^4$. Tìm m để $u \in W$. Với giá trị m vừa tìm được, hãy biểu diễn vector u dưới dạng tổ hợp tuyến tính của $u_1; u_2; u_3$.

Câu 4: Cho ánh xạ tuyến tính $f \in L(\mathbb{R}^4; \mathbb{R}^3)$ xác định bởi:

$$f(x; y; z; t) = (x + y + 2z - t; x + 2y - z + t; x + 3y - 4z + 3t)$$

a) Tìm một cơ sở của không gian $\text{Im } f$ và một cơ sở của không gian $\text{Ker } f$.

b) Xác định ma trận biểu diễn f theo cặp cơ sở $\mathcal{B}_0, \mathcal{B}$; trong đó \mathcal{B}_0 là cơ sở chính tắc của \mathbb{R}^4 và $\mathcal{B} = \{(1; 0; 1); (0; -1; 0); (0; 1; 2)\}$ là cơ sở của \mathbb{R}^3 .

Câu 5:

a) Cho V là không gian vector trên \mathbb{R} , $\dim V = 3$ và $u; v; w \in V$. Chứng minh rằng $\mathcal{B} = \{u; v; w\}$ là cơ sở của V khi và chỉ khi $\mathcal{B}' = \{u + v; v - w; w + 2u\}$ là cơ sở của V .

b) Cho $A; B \in M_n(\mathbb{R})$ thỏa mãn điều kiện $AB = BA$ và $A^2 = B^2 = 0$. Chứng minh rằng $(I_n + A + B)$ khả nghịch và $(A + B + AB)$ không khả nghịch.

Đề thi cuối kỳ đại số tuyến tính 2016 – 2017

Câu 1: Cho hai ma trận $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$; $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$.

- a) Tìm ma trận nghịch đảo của A .
- b) Tìm ma trận X thỏa mãn $AXA = AB$.

Câu 2: Cho tập hợp $W = \{(x; y; z) \in \mathbb{R}^3 | x - y = 2z\}$

- a) Chứng minh W là không gian con của không gian vector \mathbb{R}^3 .
- b) Tìm cơ sở và xác định số chiều của không gian W .

Câu 3: Cho tập hợp $\mathcal{B} = \{u_1 = (1; 2; 2); u_2 = (1; 1; -1)\}$ và W là không gian sinh bởi \mathcal{B} .

- a) Chứng minh \mathcal{B} là cơ sở của W .
- b) Tìm m để vector $u = (1; -1; m)$ thuộc không gian W và với giá trị đó của m , hãy xác định tọa độ của u theo cơ sở \mathcal{B} .

Câu 4: Giả sử $\mathcal{B} = \{u; v\}$ là cơ sở của không gian vector V . Đặt $\mathcal{B}' = \{u - 2v; 3u - 5v\}$.

- a) Chứng minh \mathcal{B}' là cơ sở của V và xác định ma trận chuyển cơ sở từ \mathcal{B}' sang \mathcal{B} .
- b) Cho $w \in V$ thỏa mãn $[w]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$. Hãy xác định tọa độ của w theo cơ sở \mathcal{B}' .

Câu 5: Cho toán tử tuyến tính $f \in L(\mathbb{R}^3)$ xác định bởi:

$$f(x; y; z) = (x + 2y - 3z; 2x + 3y + z; 3x + 4y + 5z)$$

- a) Xác định cơ sở cho các không gian $\text{Ker } f$ và $\text{Im } f$.
- b) Cho $\mathcal{B} = \{u_1 = (1; -1; 0); u_2 = (1; 0; -1); u_3 = (0; -1; 0)\}$. Chứng tỏ \mathcal{B} là cơ sở của \mathbb{R}^3 và xác định ma trận biểu diễn f theo cơ sở \mathcal{B} .

Đề thi cuối kỳ đại số tuyến tính 2017 – 2018

Câu 1: Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & m \\ 1 & m & 3 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

- a) Tìm các giá trị của m để A khả nghịch.
- b) Tìm nghịch đảo của A trong trường hợp $m = 1$.

Câu 2: Cho $W = \{(x; y; z) \in \mathbb{R}^3 | x + y = 2x + z\}$ và $W' = \{(x; y; z) \in \mathbb{R}^3 | xy = 2xz\}$. Chứng minh rằng W là không gian con của \mathbb{R}^3 và W' không là không gian con của \mathbb{R}^3 .

Câu 3: Trong \mathbb{R}^3 , cho $u_1 = (1; 1; 2)$; $u_2 = (2; 1; 1)$; $u_3 = (1; 3; 7)$ và $\mathcal{B} = \{u_1; u_2; u_3\}$.

- a) Chứng minh \mathcal{B} là cơ sở của \mathbb{R}^3 và tìm tọa độ của vector $u = (5; 4; 6)$ theo cơ sở \mathcal{B} .
- b) Tìm m để $v = (1; 3; m)$ là tổ hợp tuyến tính của $u_1; u_2$. Với giá trị m vừa tìm được, hãy xác định dạng biểu diễn tuyến tính của v theo u_1 và u_2 .
- c) Xác định cơ sở $\mathcal{B}' = \{u'_1; u'_2; u'_3\}$ của \mathbb{R}^3 sao cho ma trận chuyển cơ sở từ \mathcal{B}' sang \mathcal{B} là

$$(\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Câu 4: Cho ánh xạ tuyến tính $f \in L(\mathbb{R}^4; \mathbb{R}^3)$ xác định bởi:

$$f(x; y; z; t) = (x + y - z - t; x - y + z + 2t; x + 3y - 3z - 4t)$$

- a) Tìm một cơ sở của không gian $\text{Im } f$ và một cơ sở của không gian $\text{Ker } f$.
- b) Xác định ma trận biểu diễn f theo cặp cơ sở $\mathcal{B}_0, \mathcal{B}$; trong đó \mathcal{B}_0 là cơ sở chính tắc của \mathbb{R}^4 và $\mathcal{B} = \{(1; 0; -1); (0; 1; 0); (0; -1; 1)\}$ là cơ sở của \mathbb{R}^3 .

Câu 5: Cho $A \in M_n(\mathbb{R})$ thỏa mãn $A^3 + 3A^2 + 3A + I_n = 0$. Chứng minh rằng A khả nghịch nhưng $A + I_n$ không khả nghịch.

Đề thi cuối kỳ đại số tuyến tính 2018 – 2019

Câu 1: Trong không gian \mathbb{R}^3 , cho tập hợp $\mathcal{B} = \{u_1; u_2; u_3\}$ và W là không gian sinh bởi \mathcal{B} , trong đó $u_1 = (1; 2; -2); u_2 = (1; 4; m - 4); u_3 = (1; m - 2; -m)$.

- a) Tìm các giá trị của m để $W = \mathbb{R}^3$.
b) Trong trường hợp $W \neq \mathbb{R}^3$, hãy biểu diễn u_3 theo $u_1; u_2$ và tìm một cơ sở cho không gian W .

Câu 2: Trong không gian \mathbb{R}^4 , cho tập hợp $\mathcal{B} = \{u_1; u_2; u_3\}$ và W là không gian sinh bởi \mathcal{B} , trong đó $u_1 = (1; 1; 1; 2); u_2 = (1; 2; 2; 1); u_3 = (1; -1; -2; 1)$.

- a) Chứng minh \mathcal{B} là cơ sở của W và $u = (2; 6; 7; 3) \in W$.
b) Tìm m để $v = (2; 1; m; m) \in W$. Với giá trị m vừa tìm được, hãy xác định tọa độ vector v theo cơ sở \mathcal{B} .
c) Xác định cơ sở $\mathcal{B}' = \{u'_1; u'_2; u'_3\}$ của W sao cho ma trận chuyển cơ sở từ \mathcal{B}' sang \mathcal{B} là

$$(\mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Câu 3: Cho f là một toán tử tuyến tính trên \mathbb{R}^4 xác định bởi:

$$f(x; y; z; t) = (x + y + 3z - 2t; x + 2y + 5z - 3t; x - y - z; x + z - t)$$

- a) Tìm một cơ sở của không gian $\text{Im } f$ và một cơ sở của không gian $\text{Ker } f$.
b) Xác định ma trận biểu diễn f theo cặp cơ sở

$\mathcal{B} = \{u_1 = (1; 0; -1; 0); u_2 = (0; 1; -1; 0); u_3 = (0; 1; 0; -1); u_4 = (1; -1; 0; 1)\}$ của \mathbb{R}^4 .

Câu 4: Cho V là không gian vector hữu hạn chiều trên \mathbb{R} và W là không gian con của V sao cho $\dim W = \dim V - 1$. Chứng minh rằng tồn tại một cơ sở của V mà không có vector nào nằm trong W .

Đề thi cuối kỳ đại số tuyến tính 2019 – 2020

Câu 1: Giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính theo tham số thực m :

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 + 3x_4 = 5 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 + 10x_4 = -5 \\ 4x_1 + 5x_2 - 6x_3 + 7x_4 = m \end{cases}$$

Câu 2: Trong không gian \mathbb{R}^3 , cho các vector

$$u_1 = (1; 3; 0); u_2 = (2; 7; 1); u_3 = (3; 10; 2)$$

- a) Chứng minh $\mathcal{B} = (u_1; u_2; u_3)$ là một cơ sở của \mathbb{R}^3 .
- b) Tìm ma trận chuyển cơ sở từ \mathcal{B} sang cơ sở chính tắc \mathcal{B}_0 của \mathbb{R}^3 .
- c) Tìm tọa độ của vector $u(5; 16; 3)$ trong cơ sở \mathcal{B} .
- d) Tìm vector $v \in \mathbb{R}^3$ biết $[v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Câu 3: Cho f là một toán tử tuyến tính trên \mathbb{R}^3 định bởi

$$f(x; y; z) = (6x - 2y + 4z; 18x - 6y + 13z; 6x - 2y + 3z)$$

- a) Tìm số chiều và một cơ sở cho mỗi không gian $\text{Im } f; \text{Ker } f$.
- b) Chứng minh $\text{Im } f \cap \text{Ker } f = \{0\}$.
- c) Tìm ma trận biểu diễn f theo cơ sở $\mathcal{B} = \{u_1; u_2; u_3\}$ được cho như trong Câu 2.

Câu 4: Cho V là không gian vector n chiều, S là một tập sinh của V và $u_1; \dots; u_{n-1} \in V$ là $n - 1$ vector độc lập tuyến tính. Chứng minh rằng tồn tại $u \in S$ sao cho $\{u_1; \dots; u_{n-1}; u\}$ là một cơ sở của V .