

Fitxa 01 · Preguntes 1 i 2

80 preguntes essencials. La resposta correcta està ressaltada i indicada amb CORRECTA. Referències al solucionari final.



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

1. A quin cas del temari correspon aquesta imatge?

- A) El míldiu de la patata i el tomàquet
- B) La cendrosa del roser
- C) La cendrosa o malura de la vinya
- D) [CORRECTA] El míldiu de la vinya**

2. Quina descripció recull les característiques del cas il·lustrat?

- A) [CORRECTA] Taques translúcides a l'anvers amb aspecte oliós; al revers tenen un aspecte polsós blanc. No estan limitades pels nervis.**
- B) Polsim blanc; les fulles es caragolen i cauen prematurament. Té especial importància en flor tallada.
- C) Polsim blanquinós amb aparença de cendra que desapareix quan es passen els dits per damunt; és present en ambdues cares de la fulla i en les baies.
- D) Taques olioses a l'anvers de la fulla; posteriorment s'assequen. En la patata pot afectar la part aèria i el tubercle.

Fitxa 02 · Preguntes 3 i 4



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

3. A quin cas del temari correspon aquesta imatge?

- A) La cendrosa del roser
- B) El míldiu de la vinya
- C) [CORRECTA] El míldiu de la patata i el tomàquet**
- D) La cendrosa o malura de la vinya

4. Quina descripció recull les característiques del cas il·lustrat?

- A) [CORRECTA] Taques olioses a l'anvers de la fulla; posteriorment s'assequen. En la patata pot afectar la part aèria i el tubercle.**
- B) Polsim blanc; les fulles es caragolen i cauen prematurament. Té especial importància en flor tallada.
- C) Polsim blanquinós amb aparença de cendra que desapareix quan es passen els dits per damunt; és present en ambdues cares de la fulla i en les baies.
- D) Taques translúcides a l'anvers amb aspecte oliós; al revers tenen un aspecte polsós blanc. No estan limitades pels nervis.

Fitxa 03 · Preguntes 5 i 6



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

5. A quin cas del temari correspon aquesta imatge?

A) [CORRECTA] La cendrosa o malura de la vinya

B) La cendrosa del roser

C) El míldiu de la vinya

D) El míldiu de la patata i el tomàquet

6. Quina descripció recull les característiques del cas il·lustrat?

A) Taques olioses a l'anvers de la fulla; posteriorment s'assequen. En la patata pot afectar la part aèria i el tubercle.

B) Polsim blanc; les fulles es caragolen i cauen prematurament. Té especial importància en flor tallada.

C) Taques translúcides a l'anvers amb aspecte oliós; al revers tenen un aspecte polsós blanc. No estan limitades pels nervis.

D) [CORRECTA] Polsim blanquinós amb aparença de cendra que desapareix quan es passen els dits per damunt; és present en ambdues cares de la fulla i en les baies.

Fitxa 04 · Preguntes 7 i 8



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

7. A quin cas del temari correspon aquesta imatge?

A) [CORRECTA] La podridura grisa

B) La cendrosa o malura de la vinya

C) El míldiu de la patata i el tomàquet

D) El míldiu de la vinya

8. Quina descripció recull les característiques del cas il·lustrat?

A) Taques olioses a l'anvers de la fulla; posteriorment s'assequen. En la patata pot afectar la part aèria i el tubercle.

B) Polsim blanquinós amb aparença de cendra que desapareix quan es passen els dits per damunt; és present en ambdues cares de la fulla i en les baies.

C) [CORRECTA] Pansiment inicial i podridures dels fruits amb micelis grisosos d'aspecte pulverulent que s'expandeixen des de l'origen.

D) Taques translúcides a l'anvers amb aspecte oliós; al revers tenen un aspecte polsós blanc. No estan limitades pels nervis.

Fitxa 05 · Preguntes 9 i 10



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

9. A quin cas del temari correspon aquesta imatge?

A) [CORRECTA] La moniliosi

B) El míldiu de la patata i el tomàquet

C) El míldiu de la vinya

D) La cendrosa o malura de la vinya

10. Quina descripció recull les característiques del cas il·lustrat?

A) Taques olioses a l'anvers de la fulla; posteriorment s'assequen. En la patata pot afectar la part aèria i el tubercle.

B) Taques translúcides a l'anvers amb aspecte oliós; al revers tenen un aspecte polsós blanc. No estan limitades pels nervis.

C) Polsim blanquinós amb aparença de cendra que desapareix quan es passen els dits per damunt; és present en ambdues cares de la fulla i en les baies.

D) [CORRECTA] Fructificació del fong amb aparença d'encoixinat i coloració grisenca. Els fruits redueixen el volum i es queden momificats.

Fitxa 06 · Preguntes 11 i 12



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

11. A quin cas del temari correspon aquesta imatge?

- A) La cendrosa o malura de la vinya
- B) El míldiu de la patata i el tomàquet
- C) El míldiu de la vinya
- D) [CORRECTA] El rovell dels cereals**

12. Quina descripció recull les característiques del cas il·lustrat?

- A) Taques olioses a l'anvers de la fulla; posteriorment s'assequen. En la patata pot afectar la part aèria i el tubercle.
- B) Polsim blanquinós amb aparença de cendra que desapareix quan es passen els dits per damunt; és present en ambdues cares de la fulla i en les baies.
- C) Taques translúcides a l'anvers amb aspecte oliós; al revers tenen un aspecte polsós blanc. No estan limitades pels nervis.
- D) [CORRECTA] Pústules vermelloses a les fulles que s'ennegreixen amb la maduració del fong; en tocar-les, els dits queden negres.**

Fitxa 07 · Preguntes 13 i 14



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

13. A quin cas del temari correspon aquesta imatge?

- A) El míldiu de la vinya
- B) La cendrosa o malura de la vinya
- C) El míldiu de la patata i el tomàquet
- D) [CORRECTA] El motejat de la pomera i el motejat de la perera**

14. Quina descripció recull les característiques del cas il·lustrat?

- A) [CORRECTA] Taques rodones i fosques a fulles i fruits. A la primavera pot provocar defoliació i caiguda de fruits; més tard, taques marrons circulars als fruits.**
- B) Polsim blanquinós amb aparença de cendra que desapareix quan es passen els dits per damunt; és present en ambdues cares de la fulla i en les baies.
- C) Taques olioses a l'anvers de la fulla; posteriorment s'assequen. En la patata pot afectar la part aèria i el tubercle.
- D) Taques translúcides a l'anvers amb aspecte oliós; al revers tenen un aspecte polsós blanc. No estan limitades pels nervis.

Fitxa 08 · Preguntes 15 i 16



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

15. A quin cas del temari correspon aquesta imatge?

- A) El míldiu de la vinya
- B) El míldiu de la patata i el tomàquet
- C) La cendrosa o malura de la vinya
- D) [CORRECTA] L'arrufat del pesseguer**

16. Quina descripció recull les característiques del cas il·lustrat?

- A) [CORRECTA] Deformacions i bonys en fulles de color vermellós. Afecta fulles i brots tendres, també fruits; les fulles malaltes cauen.**
- B) Taques olioses a l'anvers de la fulla; posteriorment s'assequen. En la patata pot afectar la part aèria i el tubercle.
- C) Polsim blanquinós amb aparença de cendra que desapareix quan es passen els dits per damunt; és present en ambdues cares de la fulla i en les baies.
- D) Taques translúcides a l'anvers amb aspecte oliós; al revers tenen un aspecte polsós blanc. No estan limitades pels nervis.

Fitxa 09 · Preguntes 17 i 18



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

17. A quin cas del temari correspon aquesta imatge?

- A) Les pseudomones de la perera
- B) La taca bacteriana dels fruiters de pinyol
- C) [CORRECTA] Xylella fastidiosa**
- D) El foc bacterià

18. Quina descripció recull les característiques del cas il·lustrat?

- A) Necrosi de flors i ràpid ennegriment dels brots tendres, que solen corbar-se; aspecte de cremat de flors i fulles.
- B) Petites lesions circulars necròtiques al receptacle o fruit en creixement, que es poden ajuntar i estendre fins al peduncle.
- C) Petites taques groguenques a les fulles que es necrosen i cauen; als fruits, taques verd clar que es necrosen i s'eixamplen; possibles xancres a les branques.

D) [CORRECTA] Colonitza el xilema, obtura els vasos i bloqueja el transport d'aigua i nutrients; estrès hídric, deficiències minerals i assecament de fulles i branques.

Fitxa 10 · Preguntes 19 i 20



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

19. A quin cas del temari correspon aquesta imatge?

A) La taca bacteriana dels fruiters de pinyol

B) [CORRECTA] El foc bacterià

C) Xylella fastidiosa

D) Les pseudomonas de la perera

20. Quina descripció recull les característiques del cas il·lustrat?

A) Petites taques groguenques a les fulles que es necrosen i cauen; als fruits, taques verd clar que es necrosen i s'eixamplen; possibles xancres a les branques.

B) Petites lesions circulars necròtiques al receptacle o fruit en creixement, que es poden ajuntar i estendre fins al peduncle.

C) Colonitza el xilema, obtura els vasos i bloqueja el transport d'aigua i nutrients; estrès hídric, deficiències minerals i assecament de fulles i branques.

D) [CORRECTA] Necrosi de flors i ràpid ennegriment dels brots tendres, que solen corbar-se; aspecte de cremat de flors i fulles.

Fitxa 11 · Preguntes 21 i 22



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

21. A quin cas del temari correspon aquesta imatge?

- A) El foc bacterià
- B) Xylella fastidiosa
- C) Les pseudomones de la perera

D) [CORRECTA] El tumor del coll

22. Quina descripció recull les característiques del cas il·lustrat?

- A) Necrosi de flors i ràpid ennegriment dels brots tendres, que solen corbar-se; aspecte de cremat de flors i fulles.
- B) Petites lesions circulars necròtiques al receptacle o fruit en creixement, que es poden ajuntar i estendre fins al peduncle.
- C) Colonitza el xilema, obtura els vasos i bloqueja el transport d'aigua i nutrients; estrès hídric, deficiències minerals i assecament de fulles i branques.

D) [CORRECTA] Gales i tumors al coll de l'arrel que disminueixen la circulació de la saba i debiliten la planta; danys importants als viviers.

Fitxa 12 · Preguntes 23 i 24



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

23. A quin cas del temari correspon aquesta imatge?

- A) La flavescència daurada de la vinya
- B) Fitoplasmes en plantes ornamentals
- C) L'ESFY
- D) [CORRECTA] La tristor de la pera**

24. Quina descripció recull les característiques del cas il·lustrat?

A) Esgroguiments severos, escombres de bruixa i afebliment; en pins, proliferació de brots i acícules deformades que evolucionen cap a l'assecada de la branca.

B) [CORRECTA] Branques poc desenvolupades, menys fulles i més petites, verd pàl·lid; coloracions vermelloses anticipades i lleuger enrotllament cap al revers.

C) Brotada i floració a l'hivern; enrotllament i esgroguiment de fulles a l'estiu. L'arbre deixa de produir en pocs anys.

D) Caragolament de fulles, coloracions grogues o vermelles i manca d'agostament; disminució de collita pel dessecament o mal quallat dels raïms.

Fitxa 13 · Preguntes 25 i 26



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

25. A quin cas del temari correspon aquesta imatge?

- A) L'ESFY
- B) Fitoplasmes en plantes ornamentals
- C) [CORRECTA] La flavescència daurada de la vinya**
- D) La tristor de la pera

26. Quina descripció recull les característiques del cas il·lustrat?

- A) Branques poc desenvolupades, menys fulles i més petites, verd pàl·lid; coloracions vermelloses anticipades i lleuger enrotllament cap al revers.
- B) Esgroguiments severos, escombres de bruixa i afebliment; en pins, proliferació de brots i acícules deformades que evolucionen cap a l'assecada de la branca.
- C) Brotada i floració a l'hivern; enrotllament i esgroguiment de fulles a l'estiu. L'arbre deixa de produir en pocs anys.
- D) [CORRECTA] Caragolament de fulles, coloracions grogues o vermelles i manca d'agostament; disminució de collita pel dessecament o mal quallat dels raïms.**

Fitxa 14 · Preguntes 27 i 28



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

27. A quin cas del temari correspon aquesta imatge?

- A) El virus de l'entrenús curt
- B) El virus del bronzejat del tomàquet
- C) El virus de la tristesa dels cítrics
- D) [CORRECTA] El virus de la Sharka**

28. Quina descripció recull les característiques del cas il·lustrat?

- A) Asimetria del limbe i mosaics groguencs; sarments amb entrenusos curts, dobles nusos, bifurcacions i creixement en zig-zag.
- B) Saturació dels vasos conductors, pèrdua de vigor, fulles descolorides, dures i petites i fruits més petits; defoliació final i mort de l'arbre.
- C) En tomàquet, bronzejat amb punts i taques necrosades; en pebrot, mosaics i deformacions en fulles joves i anells necrosats en fulles adultes.

D) [CORRECTA] Taques i anells cloròtics a fulles i pètals; fruits deformats amb taques en bandes o anells i caiguda prematura.

Fitxa 15 · Preguntes 29 i 30



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

29. A quin cas del temari correspon aquesta imatge?

- A) El virus de l'entrenús curt
- B) El virus del bronzejat del tomàquet
- C) [CORRECTA] El virus de la tristesa dels cítrics**
- D) El virus de la Sharka

30. Quina descripció recull les característiques del cas il·lustrat?

- A) Taques i anells cloròtics a fulles i pètals; fruits deformats amb taques en bandes o anells i caiguda prematura.
- B) En tomàquet, bronzejat amb punts i taques necrosades; en pebrot, mosaics i deformacions en fulles joves i anells necrosats en fulles adultes.
- C) [CORRECTA] Saturació dels vasos conductors, pèrdua de vigor, fulles descolorides, dures i petites i fruits més petits; defoliació final i mort de l'arbre.**
- D) Asimetria del limbe i mosaics groguencs; sarments amb entrenusos curts, dobles nusos, bifurcacions i creixement en zig-zag.

Fitxa 16 · Preguntes 31 i 32



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

31. A quin cas del temari correspon aquesta imatge?

- A) El virus de la Sharka
- B) El virus de l'entrenús curt
- C) [CORRECTA] El virus del bronzejat del tomàquet**
- D) El virus de la tristesa dels cítrics

32. Quina descripció recull les característiques del cas il·lustrat?

- A) Saturació dels vasos conductors, pèrdua de vigor, fulles descolorides, dures i petites i fruits més petits; defoliació final i mort de l'arbre.
- B) Asimetria del limbe i mosaics groguencs; sarments amb entrenusos curts, dobles nusos, bifurcacions i creixement en zig-zag.
- C) [CORRECTA] En tomàquet, bronzejat amb punts i taques necrosades; en pebrot, mosaics i deformacions en fulles joves i anells necrosats en fulles adultes.**
- D) Taques i anells cloròtics a fulles i pètals; fruits deformats amb taques en bandes o anells i caiguda prematura.

Fitxa 17 · Preguntes 33 i 34



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

33. A quin cas del temari correspon aquesta imatge?

- A) El virus de l'entrenús curt
- B) El virus de la Sharka
- C) [CORRECTA] El virus de la cullera del tomàquet**
- D) El virus de la tristesa dels cítrics

34. Quina descripció recull les característiques del cas il·lustrat?

- A) Taques i anells cloròtics a fulles i pètals; fruits deformats amb taques en bandes o anells i caiguda prematura.
- B) Saturació dels vasos conductors, pèrdua de vigor, fulles descolorides, dures i petites i fruits més petits; defoliació final i mort de l'arbre.
- C) Asimetria del limbe i mosaics groguencs; sarments amb entrenusos curts, dobles nusos, bifurcacions i creixement en zig-zag.
- D) [CORRECTA] Aturada del creixement, folíols arrodonits amb bonys i fulles caragolades cap a l'anvers en forma de cullera; avortament de flors i fruits petits.**

Fitxa 18 · Preguntes 35 i 36



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

35. A quin cas del temari correspon aquesta imatge?

- A) La cendrosa o malura de la vinya
- B) El míldiu de la vinya
- C) [CORRECTA] Els nematodes**
- D) El míldiu de la patata i el tomàquet

36. Quina descripció recull les característiques del cas il·lustrat?

- A) Polsim blanquinós amb aparença de cendra que desapareix quan es passen els dits per damunt; és present en ambdues cares de la fulla i en les baies.
- B) [CORRECTA] Deformacions de les arrels, disminució del creixement, nanisme, agalles circulars i esgrogueïment de fulles.**
- C) Taques olioses a l'anvers de la fulla; posteriorment s'assequen. En la patata pot afectar la part aèria i el tubercle.
- D) Taques translúcides a l'anvers amb aspecte oliós; al revers tenen un aspecte polsós blanc. No estan limitades pels nervis.

Fitxa 19 · Preguntes 37 i 38



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

37. Què distingeix una malaltia infecciosa d'una fisiopatia?

A) [CORRECTA] La causa és un agent viu

B) La causa és sempre la llum

C) La causa és sempre la temperatura

D) La causa és sempre la humitat

38. Una alteració és causada per condicions de temperatura, sense cap agent viu. Com s'anomena?

A) Micosi

B) Bacteriosi

C) Virosi

D) [CORRECTA] Fisiopatia

Fitxa 20 · Preguntes 39 i 40



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

39. Quins tres elements han de coincidir perquè es desenvolupi una malaltia?

- A) Hifes, miceli i espores
- B) Clorosi, necrosi i nanisme
- C) [CORRECTA] Hoste susceptible, patogen viu i ambient adequat**
- D) Xilema, floema i saba

40. Quins factors ambientals destaca el triangle de la malaltia?

- A) Hipertrofia i hiperplàsia
- B) [CORRECTA] Temperatura i humitat**
- C) Xilema i floema
- D) Espores i miceli

Fitxa 21 · Preguntes 41 i 42



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

41. Diverses patologies poden donar símptomes semblants. Què pot caldre per confirmar el diagnòstic?

- A) Identificar sempre pel cultiu
- B) Donar per fet que és un virus
- C) [CORRECTA] Un laboratori especialitzat**
- D) Escollir només pel color

42. Quines pistes de les taques s'han d'interpretar al camp?

- A) Només la data de plantació
- B) Només el nom del cultiu
- C) [CORRECTA] El color i les característiques**
- D) Només la presència d'un vector

Fitxa 22 · Preguntes 43 i 44



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

43. Com s'anomenen els filaments que conformen el miceli?

- A) Vasos conductors
- B) [CORRECTA] Hifes**
- C) Estilets
- D) Espores

44. Què passa durant la fase d'incubació d'una infecció fúngica?

- A) La planta no pot contenir el patògen
- B) El fong només viu en matèria morta
- C) [CORRECTA] La infecció ja s'ha produït, però els símptomes encara no apareixen**
- D) El miceli es transforma en un nematode

Fitxa 23 · Preguntes 45 i 46



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

45. Quina relació defineix les micorrizes?

- A) [CORRECTA] Una simbiosi entre fongs i arrels amb benefici mutu**
- B) Una necrosi de l'escorça
- C) Un tumor bacterià
- D) Una transmissió per empelt

46. Quina funció tenen els fongs sapròfits?

- A) [CORRECTA] Descompondre matèria orgànica morta i contribuir a l'humus**
- B) Fixar nitrogen com Rhizobium
- C) Colonitzar exclusivament el floema
- D) Formar sempre tumors al coll

Fitxa 24 · Preguntes 47 i 48



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.


47. Quins mecanismes de reproducció asexual es destaquen?

- A) Empelts i esqueixos
- B) [CORRECTA] Espores i fraccionament del miceli**
- C) Poda i maneig
- D) Enquistament i estilet

48. Quina condició afavoreix el desenvolupament dels fongs?

- A) [CORRECTA] Humitat relativa elevada o disponibilitat d'aigua**
- B) Absència de tota aigua
- C) Només vent, sense humitat
- D) Només llum intensa

Fitxa 25 · Preguntes 49 i 50



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

49. Què és la necrosi?

- A) Augment del volum cel·lular
- B) Augment del nombre de cèl·lules
- C) Coloració verda dels pètals
- D) [CORRECTA] Mort prematura de cèl·lules d'un teixit o òrgan**

50. Què pot causar marciment en col·lapsar-se?

- A) [CORRECTA] Els vasos conductors**
- B) Els pètals amb virescència
- C) Les arrels amb micorrizes
- D) El volum cel·lular augmentat

Fitxa 26 · Preguntes 51 i 52



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

51. Què augmenta en la hipertròfia?

- A) El nombre de cèl·lules
- B) La mort de cèl·lules
- C) [CORRECTA] El volum de les cèl·lules**
- D) El nombre d'espores

52. Què augmenta en la hiperplàsia?

- A) La necrosi dels teixits
- B) La mida de l'estilet
- C) [CORRECTA] El nombre de cèl·lules**
- D) El volum de cada cèl·lula

Fitxa 27 · Preguntes 53 i 54



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

53. Per on progressen els fongs vasculars *Fusarium* i *Verticillium*?

- A) Només sobre matèria morta
- B) [CORRECTA] Pels vasos de la saba**
- C) Només als pètals
- D) Només sobre la melassa

54. Quin patró es descriu per *Fusarium* i verticil·losi?

- A) [CORRECTA] Marciment de tiges i fulles que s'estén verticalment**
- B) Polsim blanc superficial exclusivament
- C) Tumors grisos als grans de blat de moro
- D) Anells concèntrics a les fulles d'olivera

Fitxa 28 · Preguntes 55 i 56



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

55. Quina descripció correspon als bacteris?

- A) Hifes que formen un miceli
- B) Invertebrats vermiformes sense potes
- C) [CORRECTA] Procariotes unicel·lulars amb paret cel·lular rígida**
- D) ARN sense embolcall proteic

56. Què significa procariota?

- A) Cèl·lula sense material genètic
- B) Cos format per vasos conductors
- C) Cos format per hifes
- D) [CORRECTA] Material genètic al citoplasma, sense nuclí diferenciat**

Fitxa 29 · Preguntes 57 i 58



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

57. Per on penetren els bacteris en els teixits vegetals?

A) [CORRECTA] Ferides o obertures naturals

B) Perforant sempre l'epidermis intacta

C) Mitjançant un estilet propi

D) Mitjançant hifes

58. Quines vies poden dispersar bacteris?

A) Només enquistament

B) Només fraccionament del miceli

C) Només espores i miceli

D) [CORRECTA] Vectors, material vegetal, maneig, vent, pluja i reg

Fitxa 30 · Preguntes 59 i 60



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

59. Quin tret diferencia els fitoplasmes dels bacteris descrits amb paret rígida?

- A) Tenen un estilet bucal
- B) Tenen arrels pròpies
- C) Tenen hifes i miceli
- D) [CORRECTA] No tenen paret cel·lular rígida**

60. En quins vasos vegetals es localitzen els fitoplasmes?

- A) Epidermis
- B) Xilema
- C) [CORRECTA] Floema**
- D) Parènquima foliar exclusivament

Fitxa 31 · Preguntes 61 i 62



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.


61. Quins insectes destaquen com a vectors dels fitoplasmes?

- A) Només trips
- B) Només Monochamus
- C) [CORRECTA] Cicadèl·lids, homòpters i psíl·lids**
- D) Només escolítids

62. Quina via també pot transmetre fitoplasmes?

- A) Fraccionament del miceli
- B) Fixació de nitrogen
- C) [CORRECTA] Empelts, esqueixos i rizomes infectats**
- D) Espores transportades pel vent

Fitxa 32 · Preguntes 63 i 64



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

63. Què és la fil·lòdia?

- A) [CORRECTA] Transformació de pètals i sèpals en estructures foliars**
- B) Mort descendent
- C) Coloració verda sense canvi de forma
- D) Podridura tova

64. Amb què es relaciona l'escombra de bruixa?

- A) Formació d'espores negres
- B) Bloqueig exclusiu del xilema
- C) [CORRECTA] Pèrdua de la dominància apical**
- D) Formació d'un estilet

Fitxa 33 · Preguntes 65 i 66



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

65. Quins components bàsics tenen els virus?

A) [CORRECTA] Proteïnes i àcids nucleics

B) Arrels i tiges

C) Potes i segments

D) Hifes i miceli

66. Què necessita un virus per multiplicar-se?

A) Només una espora

B) [CORRECTA] Una cèl·lula

C) Només humus

D) Només aigua de reg

Fitxa 34 · Preguntes 67 i 68



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

67. Què no posseeix un viroide, a diferència d'un virus autèntic?

- A) Informació genètica
- B) ARN
- C) Capacitat d'infecció
- D) [CORRECTA] Embolcall proteic**

68. Quina afecció es cita com a causada per un viroide?

- A) [CORRECTA] Exocortis dels cítrics (CEVd)**
- B) Bronzejat del tomàquet (TSWV)
- C) Sharka (Plum Pox Virus)
- D) Tristesa dels cítrics (CTV)

Fitxa 35 · Preguntes 69 i 70



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

69. Quin conjunt recull vies de transmissió dels virus vegetals?

- A) Només fraccionament del miceli
- B) [CORRECTA] Vectors, lesions de maneig i material vegetal de reproducció**
- C) Només humus
- D) Només espores

70. Quins teixits lliures de virus es poden utilitzar en cultiu in vitro?

- A) Brots infectats
- B) Teixits necrosats
- C) Fruits amb mosaics
- D) [CORRECTA] Teixits meristemàtics**

Fitxa 36 · Preguntes 71 i 72



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

71. Quins canvis de color es descriuen en fulles afectades per virus?

- A) Només bolets de color de mel
- B) Només miceli gris
- C) Només pols negra d'espores
- D) [CORRECTA] Anells, mosaics, motejats i línies**

72. Quina alteració del creixement es descriu en les virosis?

- A) Fixació de nitrogen
- B) [CORRECTA] Entrenusos curts i nanisme**
- C) Creació d'humus
- D) Formació de micorrizes

Fitxa 37 · Preguntes 73 i 74



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

73. Quina forma corporal tenen els nematodes?

- A) [CORRECTA] Vermiforme, no segmentada i sense potes**
- B) Filaments que formen miceli
- C) Cos amb sis potes
- D) Cèl·lula amb paret rígida

74. Quina estructura utilitzen els nematodes fitoparàsits per perforar la paret cel·lular?

- A) Miceli
- B) Espora
- C) Hifa

D) [CORRECTA] Estilet

Fitxa 38 · Preguntes 75 i 76



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

75. Quin mecanisme ajuda els nematodes en condicions desfavorables?

- A) Hiperplàsia
- B) Virescència
- C) [CORRECTA] Enquistament**
- D) Fil·lòdia

76. On solen viure i alimentar-se els nematodes fitoparàsits?

- A) Només al miceli
- B) [CORRECTA] Al sòl, d'arrels o tiges subterrànies**
- C) Només sobre melassa
- D) Només a les flors

Fitxa 39 · Preguntes 77 i 78



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

77. Quin gènere s'associa als nematodes dels nòduls o de l'embolat de les arrels?

- A) Xiphinema spp.
- B) Longidorus spp.
- C) [CORRECTA] Meloidogyne spp.**
- D) Ditylenchus spp.

78. Quin efecte tenen les gales de Meloidogyne a les arrels?

- A) Fixació beneficiosa de nitrogen
- B) [CORRECTA] Disfunció important de la nutrició de la planta**
- C) Formació de micorrizes
- D) Creació d'humus

Fitxa 40 · Preguntes 79 i 80



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

79. Quina parella de nematodes ectoparàsits es destaca com a transmissora de virus?

- A) Meloidogyne spp. i Ditylenchus spp.
- B) Heterorhabditis bacteriophora i Steinernema feltiae
- C) Bursaphelenchus xylophilus i Meloidogyne spp.
- D) [CORRECTA] Xiphinema spp. i Longidorus spp.**

80. Quins cultius s'esmenten especialment per a aquests nematodes vectors?

- A) Només lleguminoses
- B) Només cereals
- C) [CORRECTA] Vinya i fruiters**
- D) Només pins

Solucionari

1. D) El míldiu de la vinya

El míldiu de la vinya

Taques translúcides a l'anvers amb aspecte oliós; al revers tenen un aspecte polsós blanc. No estan limitades pels nervis.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 12.

2. A) Taques translúcides a l'anvers amb aspecte oliós; al revers tenen un aspecte polsós blanc. No estan limitades pels nervis.

El míldiu de la vinya

Taques translúcides a l'anvers amb aspecte oliós; al revers tenen un aspecte polsós blanc. No estan limitades pels nervis.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 12.

3. C) El míldiu de la patata i el tomàquet

El míldiu de la patata i el tomàquet

Taques olioses a l'anvers de la fulla; posteriorment s'assequen. En la patata pot afectar la part aèria i el tubercle.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 13.

4. A) Taques olioses a l'anvers de la fulla; posteriorment s'assequen. En la patata pot afectar la part aèria i el tubercle.

El míldiu de la patata i el tomàquet

Taques olioses a l'anvers de la fulla; posteriorment s'assequen. En la patata pot afectar la part aèria i el tubercle.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 13.

5. A) La cendrosa o malura de la vinya

La cendrosa o malura de la vinya

Polsim blanquinós amb aparença de cendra que desapareix quan es passen els dits per damunt; és present en ambdues cares de la fulla i en les baies.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 13.

6. D) Polsim blanquinós amb aparença de cendra que desapareix quan es passen els dits per damunt; és present en ambdues cares de la fulla i en les baies.

La cendrosa o malura de la vinya

Polsim blanquinós amb aparença de cendra que desapareix quan es passen els dits per damunt; és present en ambdues cares de la fulla i en les baies.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 13.

Solucionari

7. A) La podridura grisa

La podridura grisa

Pansiment inicial i podridures dels fruits amb micelis grisosos d'aspecte pulverulent que s'expandeixen des de l'origen.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 15.

8. C) Pansiment inicial i podridures dels fruits amb micelis grisosos d'aspecte pulverulent que s'expandeixen des de l'origen.

La podridura grisa

Pansiment inicial i podridures dels fruits amb micelis grisosos d'aspecte pulverulent que s'expandeixen des de l'origen.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 15.

9. A) La moniliosi

La moniliosi

Fructificació del fong amb aparença d'encoixinat i coloració grisenca. Els fruits redueixen el volum i es queden momificats.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 15.

10. D) Fructificació del fong amb aparença d'encoixinat i coloració grisenca. Els fruits redueixen el volum i es queden momificats.

La moniliosi

Fructificació del fong amb aparença d'encoixinat i coloració grisenca. Els fruits redueixen el volum i es queden momificats.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 15.

11. D) El rovell dels cereals

El rovell dels cereals

Pústules vermelloses a les fulles que s'ennegreixen amb la maduració del fong; en tocar-les, els dits queden negres.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 16.

12. D) Pústules vermelloses a les fulles que s'ennegreixen amb la maduració del fong; en tocar-les, els dits queden negres.

El rovell dels cereals

Pústules vermelloses a les fulles que s'ennegreixen amb la maduració del fong; en tocar-les, els dits queden negres.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 16.

Solucionari

13. D) El motejat de la pomera i el motejat de la perera

El motejat de la pomera i el motejat de la perera

Taques rodones i fosques a fulles i fruits. A la primavera pot provocar defoliació i caiguda de fruits; més tard, taques marrons circulars als fruits.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 20.

14. A) Taques rodones i fosques a fulles i fruits. A la primavera pot provocar defoliació i caiguda de fruits; més tard, taques marrons circulars als fruits.

El motejat de la pomera i el motejat de la perera

Taques rodones i fosques a fulles i fruits. A la primavera pot provocar defoliació i caiguda de fruits; més tard, taques marrons circulars als fruits.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 20.

15. D) L'arrufat del presseguer

L'arrufat del presseguer

Deformacions i bonys en fulles de color vermellós. Afecta fulles i brots tendres, també fruits; les fulles malaltes cauen.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 20.

16. A) Deformacions i bonys en fulles de color vermellós. Afecta fulles i brots tendres, també fruits; les fulles malaltes cauen.

L'arrufat del presseguer

Deformacions i bonys en fulles de color vermellós. Afecta fulles i brots tendres, també fruits; les fulles malaltes cauen.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 20.

17. C) Xylella fastidiosa

Xylella fastidiosa

Colonitza el xilema, obtura els vasos i bloqueja el transport d'aigua i nutrients; estrès hídric, deficiències minerals i assecament de fulles i branques.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 27.

18. D) Colonitza el xilema, obtura els vasos i bloqueja el transport d'aigua i nutrients; estrès hídric, deficiències minerals i assecament de fulles i branques.

Xylella fastidiosa

Colonitza el xilema, obtura els vasos i bloqueja el transport d'aigua i nutrients; estrès hídric, deficiències minerals i assecament de fulles i branques.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 27.

Solucionari

19. B) El foc bacterià

El foc bacterià

Necrosi de flors i ràpid ennegriment dels brots tendres, que solen corbar-se; aspecte de cremat de flors i fulles.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 27.

20. D) Necrosi de flors i ràpid ennegriment dels brots tendres, que solen corbar-se; aspecte de cremat de flors i fulles.

El foc bacterià

Necrosi de flors i ràpid ennegriment dels brots tendres, que solen corbar-se; aspecte de cremat de flors i fulles.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 27.

21. D) El tumor del coll

El tumor del coll

Gales i tumors al coll de l'arrel que disminueixen la circulació de la saba i debiliten la planta; danys importants als viviers.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 28.

22. D) Gales i tumors al coll de l'arrel que disminueixen la circulació de la saba i debiliten la planta; danys importants als viviers.

El tumor del coll

Gales i tumors al coll de l'arrel que disminueixen la circulació de la saba i debiliten la planta; danys importants als viviers.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 28.

23. D) La tristor de la pera

La tristor de la pera

Branques poc desenvolupades, menys fulles i més petites, verd pàl·lid; coloracions vermelloses anticipades i lleuger enrotllament cap al revers.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 33.

24. B) Branques poc desenvolupades, menys fulles i més petites, verd pàl·lid; coloracions vermelloses anticipades i lleuger enrotllament cap al revers.

La tristor de la pera

Branques poc desenvolupades, menys fulles i més petites, verd pàl·lid; coloracions vermelloses anticipades i lleuger enrotllament cap al revers.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 33.

Solucionari

25. C) La flavescència daurada de la vinya

La flavescència daurada de la vinya

Caragolament de fulles, coloracions grogues o vermelles i manca d'agostament; disminució de collita pel dessecament o mal quallat dels raïms.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 33.

26. D) Caragolament de fulles, coloracions grogues o vermelles i manca d'agostament; disminució de collita pel dessecament o mal quallat dels raïms.

La flavescència daurada de la vinya

Caragolament de fulles, coloracions grogues o vermelles i manca d'agostament; disminució de collita pel dessecament o mal quallat dels raïms.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 33.

27. D) El virus de la Sharka

El virus de la Sharka

Taques i anells cloròtics a fulles i pètals; fruits deformats amb taques en bandes o anells i caiguda prematura.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 38.

28. D) Taques i anells cloròtics a fulles i pètals; fruits deformats amb taques en bandes o anells i caiguda prematura.

El virus de la Sharka

Taques i anells cloròtics a fulles i pètals; fruits deformats amb taques en bandes o anells i caiguda prematura.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 38.

29. C) El virus de la tristesa dels cítrics

El virus de la tristesa dels cítrics

Saturació dels vasos conductors, pèrdua de vigor, fulles descolorides, dures i petites i fruits més petits; defoliació final i mort de l'arbre.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 39.

30. C) Saturació dels vasos conductors, pèrdua de vigor, fulles descolorides, dures i petites i fruits més petits; defoliació final i mort de l'arbre.

El virus de la tristesa dels cítrics

Saturació dels vasos conductors, pèrdua de vigor, fulles descolorides, dures i petites i fruits més petits; defoliació final i mort de l'arbre.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 39.

Solucionari

31. C) El virus del bronzejat del tomàquet

El virus del bronzejat del tomàquet

En tomàquet, bronzejat amb punts i taques necrosades; en pebrot, mosaics i deformacions en fulles joves i anells necrosats en fulles adultes.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 40.

32. C) En tomàquet, bronzejat amb punts i taques necrosades; en pebrot, mosaics i deformacions en fulles joves i anells necrosats en fulles adultes.

El virus del bronzejat del tomàquet

En tomàquet, bronzejat amb punts i taques necrosades; en pebrot, mosaics i deformacions en fulles joves i anells necrosats en fulles adultes.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 40.

33. C) El virus de la cullera del tomàquet

El virus de la cullera del tomàquet

Aturada del creixement, folíols arrodonits amb bonys i fulles caragolades cap a l'anvers en forma de cullera; avortament de flors i fruits petits.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 41.

34. D) Aturada del creixement, folíols arrodonits amb bonys i fulles caragolades cap a l'anvers en forma de cullera; avortament de flors i fruits petits.

El virus de la cullera del tomàquet

Aturada del creixement, folíols arrodonits amb bonys i fulles caragolades cap a l'anvers en forma de cullera; avortament de flors i fruits petits.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 41.

35. C) Els nematodes

Els nematodes

Deformacions de les arrels, disminució del creixement, nanisme, agalles circulars i esgrogueïment de fulles.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 42.

36. B) Deformacions de les arrels, disminució del creixement, nanisme, agalles circulars i esgrogueïment de fulles.

Els nematodes

Deformacions de les arrels, disminució del creixement, nanisme, agalles circulars i esgrogueïment de fulles.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 42.

37. A) La causa és un agent viu

Malalties infeccioses i fisiopaties

Les malalties infeccioses són produïdes per un agent viu; les no infeccioses, per agents abiòtics.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 5.

Solucionari

38. D) Fisiopatia

Malalties infeccioses i fisiopaties

Les malalties no infeccioses són causades per agents abiòtics i també s'anomenen fisiopaties.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 5.

39. C) Hoste susceptible, patogen viu i ambient adequat

El triangle de la malaltia

Cal que hi siguin simultàniament la planta hoste susceptible, el patogen viu i l'ambient adequat.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 6.

40. B) Temperatura i humitat

El triangle de la malaltia

L'ambient adequat depèn bàsicament d'una temperatura i una humitat determinades.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 6.

41. C) Un laboratori especialitzat

Interpretar sense precipitar el diagnòstic

En moltes ocasions no es pot donar un diagnòstic encertat sense un laboratori especialitzat i mètodes específics.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 44.

42. C) El color i les característiques

Interpretar sense precipitar el diagnòstic

Cal interpretar els signes de les plantes i observar el color i les característiques de les taques.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 44.

43. B) Hifes

Hifes, miceli i incubació

El cos vegetatiu està format per filaments anomenats hifes, que conformen el miceli.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 7.

44. C) La infecció ja s'ha produït, però els símptomes encara no apareixen

Hifes, miceli i incubació

Des que les espores infecten una planta poden passar uns dies fins que apareixen els símptomes.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 7.

45. A) Una simbiosi entre fongs i arrels amb benefici mutu

Fongs beneficiosos

Les micorrizes generen beneficis tant per al fong com per a les arrels de la planta.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 8.

Solucionari

46. A) Descompondre matèria orgànica morta i contribuir a l'humus

Fongs beneficiosos

Els sapròfits s'alimenten de matèria orgànica morta i contribueixen a la creació d'humus.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 8.

47. B) Espores i fraccionament del miceli

Reproducció i supervivència dels fongs

Les tipologies asexuals més comunes són les espores i el fraccionament del miceli.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 9.

48. A) Humitat relativa elevada o disponibilitat d'aigua

Reproducció i supervivència dels fongs

Poden desenvolupar-se en un ampli ventall de temperatures, però precisen humitats relatives elevades o aigua.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 9.

49. D) Mort prematura de cèl·lules d'un teixit o òrgan

Els símptomes necròtics

La necrosi es caracteritza per la mort prematura de les cèl·lules d'un teixit o òrgan.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 10.

50. A) Els vasos conductors

Els símptomes necròtics

Entre els símptomes necròtics hi ha el marciment causat pel col·lapse dels vasos conductors.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 10.

51. C) El volum de les cèl·lules

Hipertròfia i hiperplàsia

La hipertròfia és el creixement d'un òrgan per increment del volum cel·lular.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 11.

52. C) El nombre de cèl·lules

Hipertròfia i hiperplàsia

La hiperplàsia és el creixement per augment del nombre de cèl·lules.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 11.

53. B) Pels vasos de la saba

Cas pràctic: Fusarium i verticil·losi

Els fongs vasculars circulen pels vasos de la saba i poden bloquejar-los.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 24.

Solucionari

54. A) Marciment de tiges i fulles que s'estén verticalment

Cas pràctic: Fusarium i verticil·losi

Provoquen marciment de tiges i fulles que s'estén verticalment, i també clorosi, necrosi i defoliació.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 24.

55. C) Procariotes unicel·lulars amb paret cel·lular rígida

L'estructura dels bacteris

Els bacteris són organismes procariotes unicel·lulars de paret cel·lular rígida.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 25.

56. D) Material genètic al citoplasma, sense nucli diferenciat

L'estructura dels bacteris

Les cèl·lules procariotes tenen el nucli sense diferenciar i el material genètic al citoplasma.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 25.

57. A) Ferides o obertures naturals

Entrada i transmissió dels bacteris

No són capaços de perforar l'epidermis i necessiten una ferida o una obertura natural.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 25.

58. D) Vectors, material vegetal, maneig, vent, pluja i reg

Entrada i transmissió dels bacteris

Es poden transmetre per animals vectors, material de reproducció, poda, maneig, vent, pluja i aigua de reg.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 25.

59. D) No tenen paret cel·lular rígida

Estructura i localització dels fitoplasmes

Els fitoplasmes es consideren bacteris sense paret cel·lular rígida; poden canviar de forma.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 31.

60. C) Floema

Estructura i localització dels fitoplasmes

Es localitzen als vasos conductors del floema i es mouen arrossegats per la saba.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 31.

61. C) Cicadèl·lids, homòpters i psíl·lids

Transmissió dels fitoplasmes

Els vectors són majoritàriament cicadèl·lids, homòpters i psíl·lids.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 31.

Solucionari

62. C) Empelts, esqueixos i rizomes infectats

Transmissió dels fitoplasmes

Es transmeten per material vegetal de reproducció infectat i per plantes paràsites del gènere *Cuscuta*.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 31.

63. A) Transformació de pètals i sèpals en estructures foliars

Virescència, fil·lòdia i escombra de bruixa

La fil·lòdia transforma pètals i sèpals en estructures foliars.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 32.

64. C) Pèrdua de la dominància apical

Virescència, fil·lòdia i escombra de bruixa

La llista de símptomes inclou la pèrdua de la dominància apical, anomenada escombra de bruixa.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 32.

65. A) Proteïnes i àcids nucleics

Estructura i multiplicació dels virus

Tenen una estructura molt senzilla, bàsicament proteïnes i àcids nucleics.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 35.

66. B) Una cèl·lula

Estructura i multiplicació dels virus

Els virus tenen parasitisme obligat i requereixen una cèl·lula per multiplicar-se i desenvolupar el cicle.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 35.

67. D) Embolcall proteic

Què diferencia els viroides?

Els viroides no posseeixen embolcall proteic ni lípids.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 35.

68. A) Exocortis dels cítrics (CEVd)

Què diferencia els viroides?

El tema cita el viroide de l'exocortis dels cítrics i el del tubercle fusiforme de la patata.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 35.

69. B) Vectors, lesions de maneig i material vegetal de reproducció

Transmissió i propagació vegetal

Es transmeten per vectors, lesions durant el maneig i llavors, esqueixos, emplets o rizomes.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 36.

Solucionari

70. D) Teixits meristemàtics

Transmissió i propagació vegetal

Hi ha zones meristemàtiques lliures de virus que permeten propagar plantes sanes mitjançant cultiu in vitro.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 36.

71. D) Anells, mosaics, motejats i línies

Els símptomes de les virosis

Es descriuen clorosis i canvis de color en forma d'anells, mosaics, motejats i línies.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 37.

72. B) Entrenusos curts i nanisme

Els símptomes de les virosis

Poden produir entrenusos més curts, nanisme i decaïment general.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 37.

73. A) Vermiforme, no segmentada i sense potes

El cos i l'alimentació dels nematodes

Tenen cos allargat, més o menys transparent, no segmentat i sense potes.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 42.

74. D) Estilet

El cos i l'alimentació dels nematodes

Tots els nematodes fitoparàsits tenen un estilet a la boca per perforar la paret cel·lular i alimentar-se'n.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 42.

75. C) Enquistament

Reproducció i supervivència dels nematodes

Disposen de mecanismes d'enquistament quan les condicions no són favorables.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 42.

76. B) Al sòl, d'arrels o tiges subterrànies

Reproducció i supervivència dels nematodes

Solen viure a terra i alimentar-se d'arrels o tiges subterrànies, tot i que alguns afecten la part aèria.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 42.

77. C) Meloidogyne spp.

Cas pràctic: els nòduls de les arrels

Els nematodes dels nòduls o de l'embolat de les arrels són *Meloidogyne* spp.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 43.

Solucionari

78. B) Disfunció important de la nutrició de la planta

Cas pràctic: els nòduls de les arrels

La formació de gales a les arrels comporta una disfunció important en la nutrició de la planta.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 43.

79. D) Xiphinema spp. i Longidorus spp.

Cas pràctic: nematodes transmissors de virus

La importància de Xiphinema i Longidorus deriva de la capacitat de transmetre virus.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 43.

80. C) Vinya i fruiters

Cas pràctic: nematodes transmissors de virus

Afecten especialment la vinya i els fruiters.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 43.