

PADRONIZAÇÃO DA BATERIA DE AVALIAÇÃO DE IDOSOS

Flexibilidade

Back Scratch (MMSS)

- **Procedimento:** Esse teste é feito na posição em pé. Coloque uma mão atrás da cabeça e atrás do ombro e estenda o braço o máximo possível até o meio das costas, com a palma da mão tocando o corpo e os dedos voltados para baixo. Coloque o outro braço atrás das costas, com a palma da mão voltada para fora e os dedos para cima, e estenda o braço para cima o máximo possível, tentando tocar ou sobrepor os dedos médios de ambas as mãos. É necessário que um assistente oriente o indivíduo para que os dedos fiquem alinhados e meça a distância entre as pontas dos dedos médios. Se as pontas dos dedos se tocarem, a pontuação será zero. Se elas não se tocarem, meça a distância entre as pontas dos dedos (uma pontuação negativa); se elas se sobrepuserem, meça o quanto (uma pontuação positiva). O objetivo é tentar juntar as mãos por trás do corpo na região interescapular, uma por cima (abdução e rotação externa) e uma por baixo (adução e rotação interna).

(clique nesta imagem )



- **Tentativas:** Melhor de duas tentativas com cada lado (duas em um lado, depois duas em outro). Duas tentativas de familiarização antes das tentativas válidas

- **Pontuação:** Distância entre as falanges distais do terceiro dedo, Registre a melhor pontuação até um centímetro ou 1/2 polegada mais próximo. Quanto maior a pontuação, melhor o resultado.

Resultados dos Homens

Idade (anos)	Abaixo da média	Normal (cm)	Acima da média
60-64	< -16,5 cm	-16,5 a 0 cm	> 0 cm
65-69	< -19,1 cm	-19,1 a -2,5 cm	> -2,5 cm
70-74	< -20,3 cm	-20,3 a -2,5 cm	> -2,5 cm
75-79	< -22,9 cm	-22,9 a -5,1 cm	> -5,1 cm
80-84	< -24,1 cm	-24,1 a -5,1 cm	> -5,1 cm
85-89	< -25,4 cm	-25,4 a -7,6 cm	> -7,6 cm
90-94	< -26,7 cm	-26,7 a -10,2 cm	> -10,2 cm

Resultados das Mulheres

Idade (anos)	Abaixo da média	Normal (cm)	Acima da média
60-64	< -7,6 cm	-7,6 a 3,8 cm	> 3,8 cm
65-69	< -8,9 cm	-8,9 a 3,8 cm	> 3,8 cm
70-74	< -10,2 cm	-10,2 a 2,5 cm	> 2,5 cm
75-79	< -12,7 cm	-12,7 a 1,3 cm	> 1,3 cm
80-84	< -14,0 cm	-14,0 a 0 cm	> 0 cm
85-89	< -17,8 cm	-17,8 a -2,5 cm	> -2,5 cm
90-94	< -20,3 cm	-20,3 a -2,5 cm	> -2,5 cm

Obs.: Valores convertidos de polegadas (inches) para centímetros (cm).

1 polegada = 2,54 cm.

-
- (de Jones & Rikli, 2002)

Chair Sit-and-Reach (MMII)

- **Procedimento:** O indivíduo se senta na borda de uma cadeira (colocada contra uma parede por segurança). Um pé deve permanecer apoiado no chão. A outra perna é estendida para a frente com o joelho reto, o calcanhar no chão e o tornozelo dobrado a 90°. Coloque uma mão sobre a outra com as pontas dos dedos médios alinhadas. Instrua o indivíduo a inspirar e, ao expirar, estenda a mão para a frente em direção aos dedos dos pés, dobrando o quadril. Mantenha as costas retas e a cabeça erguida. Evite saltos ou movimentos rápidos e nunca se alongue a ponto de sentir dor. Mantenha o joelho reto e mantenha o alcance por 2 segundos. A distância é medida entre a ponta dos dedos das mãos e os dedos dos pés. Se as pontas dos dedos tocarem os dedos dos pés, a pontuação será zero. Se elas não se tocarem, meça a distância entre os dedos das mãos e dos pés (uma pontuação negativa); se elas se sobrepuserem, meça o quanto (uma pontuação positiva).

(clique nesta imagem )



- **Tentativas:** Melhor de duas tentativas com cada lado (duas em um lado, depois duas em outro). Duas tentativas de familiarização antes das tentativas válidas.
- **Pontuação:** A pontuação é registrada com a aproximação de 1/2 polegada ou 1 cm como a distância alcançada, seja uma pontuação negativa ou positiva. Registre qual perna foi usada para a medição.

RESULTADOS DOS HOMENS

Idade (anos)	Abaixo da média	Média (cm)	Acima da média
60-64	< -6,4 cm	-6,4 a 10,2 cm	> 10,2 cm
65-69	< -7,6 cm	-7,6 a 7,6 cm	> 7,6 cm
70-74	< -8,9 cm	-8,9 a 6,4 cm	> 6,4 cm
75-79	< -10,2 cm	-10,2 a 5,1 cm	> 5,1 cm
80-84	< -14,0 cm	-14,0 a 3,8 cm	> 3,8 cm
85-89	< -14,0 cm	-14,0 a 1,3 cm	> 1,3 cm
90-94	< -16,5 cm	-16,5 a -1,3 cm	> -1,3 cm

RESULTADOS DAS MULHERES

Idade (anos)	Abaixo da média	Média (cm)	Acima da média
60-64	< -1,3 cm	-1,3 a 12,7 cm	> 12,7 cm
65-69	< -1,3 cm	-1,3 a 11,4 cm	> 11,4 cm
70-74	< -2,5 cm	-2,5 a 10,2 cm	> 10,2 cm
75-79	< -3,8 cm	-3,8 a 8,9 cm	> 8,9 cm
80-84	< -5,1 cm	-5,1 a 7,6 cm	> 7,6 cm
85-89	< -6,4 cm	-6,4 a 6,4 cm	> 6,4 cm
90-94	< -11,4 cm	-11,4 a 2,5 cm	> 2,5 cm

Obs.: Valores convertidos de polegadas (inches) para centímetros (cm).
1 polegada = 2,54 cm.

- (Jones & Rikli, 2002)



Multicomponente

SPPB

Caminhada de 4 metros

- **Procedimento:** O indivíduo deve caminhar 4 metros em uma superfície plana, em velocidade habitual. O tempo é cronometrado.
- **Tentativas:** 2 tentativas são realizadas, e o melhor tempo é registrado
- **Pontuação:** A pontuação é atribuída com base no tempo gasto:
 - $\leq 4,82$ segundos: 4 pontos
 - 4,83 a 6,20 segundos: 3 pontos
 - 6,21 a 8,70 segundos: 2 pontos
 - 8,70 segundos: 1 ponto
 - Incapaz de completar: 0 pontos


Sentar e levantar 5 vezes

- **Procedimento:** O indivíduo deve sentar e levantar de uma cadeira sem usar os braços, 5 vezes o mais rápido possível
- **Tentativas:** 1 tentativa é realizada
- **Pontuação:** A pontuação é atribuída com base no tempo:
 - $\geq 11,19$ segundos: 4 pontos
 - 11,20 a 13,69 segundos: 3 pontos
 - 13,70 a 16,69 segundos: 2 pontos
 - $>16,70$ segundos: 1 ponto
 - >60 segundos ou incapaz: 0 pontos

Equilíbrio estático

- **Procedimento:** indivíduo deve manter três posições de equilíbrio por 10 segundos cada:
 - Pés juntos.
 - Pé semi-tandem (um pé à frente do outro, tocando parcialmente).
 - Pé tandem (um pé diretamente à frente do outro)
- **Tentativas:** 1 tentativa para cada posição
- **Pontuação:** A pontuação é atribuída com base no tempo mantido em cada posição:
 - Mantém as 3 posições por 10 segundos: 4 pontos
 - Mantém 2 posições por 10 segundos: 3 pontos
 - Mantém 1 posição por 10 segundos: 2 pontos
 - Não mantém nenhuma posição por 10 segundos: 1 ponto
 - Incapaz de tentar: 0 pontos

(clique nesta imagem )



(ELISABETTA TONET et al., 2023)

Aptidão cardiorrespiratória

2 min step test

- **Procedimento:** O indivíduo fica em pé ao lado da parede enquanto uma marca é colocada na parede no nível correspondente à metade do caminho entre a patela (rótula) e a crista ilíaca (parte superior do osso do quadril). Em seguida, o indivíduo marcha no lugar por dois minutos, levantando os joelhos até a altura da marca na parede. É permitido descansar e se segurar na parede ou em uma cadeira estável. Pare após dois minutos de caminhada.

(clique nesta imagem )



- **Tentativas:** 1 tentativa é realizada
- **Pontuação:** Registre o número total de vezes que o joelho direito atinge o nível da fita em dois minutos. Abaixo está uma tabela que mostra os intervalos recomendados para esse teste com base nas faixas etárias

Resultados dos Homens

Idade (anos)	Abaixo da média	Média	Acima da média
60-64	< 87	87 a 115	> 115
65-69	< 87	86 a 116	> 116
70-74	< 80	80 a 110	> 110
75-79	< 73	73 a 109	> 109
80-84	< 71	71 a 103	> 103
85-89	< 59	59 a 91	> 91
90-94	< 52	52 a 86	> 86

Resultados das Mulheres

Idade (anos)	Abaixo da média	Média	Acima da média
60-64	< 75	75 a 107	> 107
65-69	< 73	73 a 107	> 107
70-74	< 68	68 a 101	> 101
75-79	< 68	68 a 100	> 100
80-84	< 60	60 a 91	> 91
85-89	< 55	55 a 85	> 85
90-94	< 44	44 a 72	> 72

(Jones & Rikli, 2002).

Referências



Anna Różańska-Kirschke, Piotr Kocur, Małgorzata Wilk, Piotr Dylewicz, The Fullerton Fitness Test as an index of fitness in the elderly, Medical Rehabilitation 2006; 10(2): 9-16.

ELISABETTA TONET et al. Multi-domain lifestyle intervention in older adults after myocardial infarction: rationale and design of the PiPeLINE randomized clinical trial. Aging Clinical and Experimental Research, v. 35, n. 5, p. 1107–1115, 25 mar. 2023.

Jones C.J., Rikli R.E., Measuring functional fitness of older adults, The Journal on Active Aging, March April 2002, pp. 24–30.