2016年考研数学二真题与解析

一、选择题　1—8小题．每小题4分，共32分．

1．当$x\to 0^+$时，若$\ln^{\alpha}(1+2x)$，$(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}$均是比$x$高阶的无穷小，则$\alpha$的可能取值范围是（　）

（A）$(2,+\infty)$　　（B）$(1,2)$　　（C）$(\frac{1}{2},1)$　　（D）$(0,\frac{1}{2})$

【详解】$\ln^{\alpha}(1+2x)\sim 2^{\alpha}x^{\alpha}$，是$\alpha$阶无穷小，$(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}\sim\frac{1}{2^{\frac{1}{\alpha}}}x^{\frac{2}{\alpha}}$是$\frac{2}{\alpha}$阶无穷小，由题意可知$\begin{cases}\alpha>1\\ \frac{2}{\alpha}>1\end{cases}$

所以α的可能取值范围是$(1,2)$，应该选（B）.

2．下列曲线有渐近线的是

（A）$y=x+\sin x$　　（B）$y=x^2+\sin x$（C）$y=x+\sin\frac{1}{x}$　　（D）$y=x^2+\sin\frac{1}{x}$

【详解】对于$y=x+\sin\frac{1}{x}$，可知$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{y}{x}=1$且$\lim\limits_{x\to\infty}(y-x)=\lim\limits_{x\to\infty}\sin\frac{1}{x}=0$，所以有斜渐近线$y=x$

应该选（C）

3．设函数$f(x)$具有二阶导数，$g(x)=f(0)(1-x)+f(1)x$，则在$[0,1]$上（　）

（A）当$f'(x)\geq 0$时，$f(x)\geq g(x)$　（B）当$f'(x)\geq 0$时，$f(x)\leq g(x)$

（C）当$f''(x)\geq 0$时，$f(x)\geq g(x)$　（D）当$f''(x)\geq 0$时，$f(x)\leq g(x)$

【分析】此题考查的曲线的凹凸性的定义及判断方法.

【详解1】如果对曲线在区间$[a,b]$上凹凸的定义比较熟悉的话，可以直接做出判断．显然

$g(x)=f(0)(1-x)+f(1)x$就是联接$(0,f(0)),(1,f(1))$两点的直线方程．故当**$f''(x)\geq 0$时，**曲线是凹的，也就是**$f(x)\leq g(x)$，**应该选（D）

【详解2】如果对曲线在区间$[a,b]$上凹凸的定义不熟悉的话，可令

$F(x)=f(x)-g(x)=f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x$，则$F(0)=F(1)=0$，且$F''(x)=f''(x)$，故当

$f''(x)\geq 0$时，曲线是凹的，从而$F(x)\leq F(0)=F(1)=0$，即$F(x)=f(x)-g(x)\leq 0$，也就是

$f(x) \le g(x)$，应该选（D）

4．曲线 $\begin{cases} x = t^2 + 7, \\ y = t^2 + 4t + 1 \end{cases}$ 上对应于 $t = 1$ 的点处的曲率半径是（　　）

（A）$\frac{\sqrt{10}}{50}$　（B）$\frac{\sqrt{10}}{100}$　　(C）$10\sqrt{10}$　　（D）$5\sqrt{10}$

【详解】 曲线在点 $(x, f(x))$ 处的曲率公式 $K = \frac{|y''|}{\sqrt{(1+y'^2)^3}}$，曲率半径 $R = \frac{1}{K}$.

本题中 $\frac{dx}{dt} = 2t, \frac{dy}{dt} = 2t + 4$，所以 $\frac{dy}{dx} = \frac{2t+4}{2t} = 1 + \frac{2}{t}$，$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-\frac{2}{t^2}}{2t} = -\frac{1}{t^3}$，

对应于 $t = 1$ 的点处 $y' = 3, y'' = -1$，所以 $K = \frac{|y''|}{\sqrt{(1+y'^2)^3}} = \frac{1}{10\sqrt{10}}$，曲率半径 $R = \frac{1}{K} = 10\sqrt{10}$.

应该选（C）

5．设函数 $f(x) = \arctan x$，若 $f(x) = xf'(\xi)$，则 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\xi^2}{x^2} =$（　　）

（A）1　　（B）$\frac{2}{3}$　　（C）$\frac{1}{2}$　　（D）$\frac{1}{3}$

【详解】注意（1）$f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$，（2）$x \to 0$ 时，$\arctan x = x - \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$.

由于 $f(x) = xf'(\xi)$．所以可知 $f'(\xi) = \frac{1}{1+\xi^2} = \frac{f(x)}{x} = \frac{\arctan x}{x}$，$\xi^2 = \frac{x - \arctan x}{(\arctan x)^2}$，

$$\lim_{x\to 0} \frac{\xi^2}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{x - arx\tan x}{x(\arctan x)^2} = \lim_{x\to 0} \frac{x - (x - \frac{1}{3}x^3) + o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{3}.$$

6．设 $u(x, y)$ 在平面有界闭区域 D 上连续，在 D 的内部具有二阶连续偏导数，且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \neq 0$ 及

$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$，则（　　）.

（A）$u(x, y)$ 的最大值点和最小值点必定都在区域 D 的边界上；

（B）$u(x, y)$ 的最大值点和最小值点必定都在区域 D 的内部；

（C）$u(x, y)$ 的最大值点在区域 D 的内部，最小值点在区域 D 的边界上；

（**D**）$u(x,y)$的最小值点在区域 *D* 的内部，最大值点在区域 *D* 的边界上.

【详解】$u(x,y)$ 在平面有界闭区域 *D* 上连续，所以$u(x,y)$在 D 内必然有最大值和最小值．并且如果在内部存在驻点(x_0,y_0)，也就是$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial y}=0$，在这个点处$A=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2},C=\frac{\partial^2 u}{\partial y^2},B=\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}$，由条件，显然$AC-B^2<0$，显然$u(x,y)$不是极值点，当然也不是最值点，所以$u(x,y)$的最大值点和最小值点必定都在区域 *D* 的边界上.
所以应该选（A）.

7．行列式$\begin{vmatrix}0&a&b&0\\a&0&0&b\\0&c&d&0\\c&0&0&d\end{vmatrix}$等于

（A）$(ad-bc)^2$　　（B）$-(ad-bc)^2$　　（C）$a^2d^2-b^2c^2$　　（D）$-a^2d^2+b^2c^2$

【详解】

$$\begin{vmatrix}0&a&b&0\\a&0&0&b\\0&c&d&0\\c&0&0&d\end{vmatrix}=-a\begin{vmatrix}a&0&b\\0&d&0\\c&0&d\end{vmatrix}+b\begin{vmatrix}a&0&b\\0&c&0\\c&0&d\end{vmatrix}=-ad\begin{vmatrix}a&b\\c&d\end{vmatrix}+bc\begin{vmatrix}a&b\\c&d\end{vmatrix}=-(ad-bc)^2$$

应该选（B）.

8．设$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是三维向量，则对任意的常数k,l，向量$\alpha_1+k\alpha_3$，$\alpha_2+l\alpha_3$线性无关是向量$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关的

（A）必要而非充分条件　　（B）充分而非必要条件
（C）充分必要条件　　（D） 非充分非必要条件

【详解】若向量$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关，则

（$\alpha_1+k\alpha_3$，$\alpha_2+l\alpha_3$）$=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\k&l\end{pmatrix}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)K$，对任意的常数$k,l$，矩阵 K 的秩都等于 2，所以向量$\alpha_1+k\alpha_3$，$\alpha_2+l\alpha_3$一定线性无关.

而当$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$时，对任意的常数$k,l$，向量$\alpha_1+k\alpha_3$，$\alpha_2+l\alpha_3$线性无关，但$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性相关；故选择（A）.

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分. 把答案填在题中横线上）

9. $\int_{-\infty}^{1}\frac{1}{x^2+2x+5}dx=$_____.

【详解】$\int_{-\infty}^{1}\frac{1}{x^2+2x+5}dx=\int_{-\infty}^{1}\frac{dx}{(x+1)^2+4}=\frac{1}{2}\arctan\frac{x+1}{2}|_{-\infty}^{1}=\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{4}-(-\frac{\pi}{2})\right)=\frac{3\pi}{8}$.

10. 设 $f(x)$ 为周期为 4 的可导奇函数，且 $f'(x)=2(x-1),x\in[0,2]$，则 $f(7)=$_____.

【详解】当 $x\in[0,2]$ 时，$f(x)=\int 2(x-1)dx=x^2-2x+C$，由 $f(0)=0$ 可知 $C=0$，即 $f(x)=x^2-2x$；$f(x)$ 为周期为 4 奇函数，故 $f(7)=f(-1)=f(1)=1$.

11. 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $e^{2yz}+x+y^2+z=\frac{7}{4}$ 确定的函数，则 $dz|_{\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)}=$_____.

【详解】设 $F(x,y,z)=e^{2yz}+x+y^2+z-\frac{7}{4}$，$F_x=1,F_y=2ze^{2yz}+2y,F_z=2ye^{2yz}+1$，当 $x=y=\frac{1}{2}$ 时，$z=0$，$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=-\frac{1}{2}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}=-\frac{1}{2}$，所以 $dz|_{\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)}=-\frac{1}{2}dx-\frac{1}{2}dy$.

12. 曲线 L 的极坐标方程为 $r=\theta$，则 L 在点 $(r,\theta)=\left(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 处的切线方程为_____.

【详解】先把曲线方程化为参数方程 $\begin{cases}x=r(\theta)\cos\theta=\theta\cos\theta\\ y=r(\theta)\sin\theta=\theta\sin\theta\end{cases}$，于是在 $\theta=\frac{\pi}{2}$ 处，$x=0,y=\frac{\pi}{2}$，$\frac{dy}{dx}|_{\frac{\pi}{2}}=\frac{\sin\theta+\theta\cos\theta}{\cos\theta-\theta\sin\theta}|_{\frac{\pi}{2}}=-\frac{2}{\pi}$，则 L 在点 $(r,\theta)=\left(\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 处的切线方程为 $y-\frac{\pi}{2}=-\frac{2}{\pi}(x-0)$，即 $y=-\frac{2}{\pi}x+\frac{\pi}{2}$.

13. 一根长为 1 的细棒位于 x 轴的区间 $[0,1]$ 上，若其线密度 $\rho(x)=-x^2+2x+1$，则该细棒的质心坐标 $\bar{x}=$_____.

【详解】质心坐标 $\bar{x}=\frac{\int_0^1 x\rho(x)dx}{\int_0^1\rho(x)dx}=\frac{\int_0^1(-x^3+2x^2+x)dx}{\int_0^1(-x^2+2x+1)dx}=\frac{\frac{11}{12}}{\frac{5}{3}}=\frac{11}{20}$.

14. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2^2+2ax_1x_3+4x_2x_3$ 的负惯性指数是 1，则 a 的取值范围

是_____.

【详解】由配方法可知

$$\begin{aligned} f(x_1,x_2,x_3) &= x_1^2 - x_2^2 + 2ax_1x_3 + 4x_2x_3 \\ &= (x_1 + ax_3)^2 - (x_2 - 2x_3)^2 + (4 - a^2)x_3^2 \end{aligned}$$

由于负惯性指数为 1，故必须要求 $4-a^2 \geq 0$，所以 a 的取值范围是 $[-2,2]$.

三、解答题

15.（本题满分 10 分）

求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\int_1^x (t^2(e^{\frac{1}{t}}-1)-t)dt}{x^2 \ln(1+\frac{1}{x})}$.

【分析】. 先用等价无穷小代换简化分母，然后利用洛必达法则求未定型极限.

【详解】

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\int_1^x (t^2(e^{\frac{1}{t}}-1)-t)dt}{x^2 \ln(1+\frac{1}{x})} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\int_1^x (t^2(e^{\frac{1}{t}}-1)-t)dt}{x} = \lim_{x\to\infty}(x^2(e^{\frac{1}{x}}-1)-x)$$

$$= \lim_{x\to\infty}\left(x^2(\frac{1}{x}+\frac{1}{2x^2}+o(\frac{1}{x^2})-x \right) = \frac{1}{2}$$

16.（本题满分 10 分）

已知函数 $y=y(x)$ 满足微分方程 $x^2+y^2y'=1-y'$，且 $y(2)=0$，求 $y(x)$ 的极大值和极小值.

【详解】

解：把方程化为标准形式得到 $(1+y^2)\dfrac{dy}{dx}=1-x^2$，这是一个可分离变量的一阶微分方程，两边分别积分

可得方程通解为：$\dfrac{1}{3}y^3+y=x-\dfrac{1}{3}x^3+C$，由 $y(2)=0$ 得 $C=\dfrac{2}{3}$，

即 $\dfrac{1}{3}y^3+y=x-\dfrac{1}{3}x^3+\dfrac{2}{3}$.

令 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1-x^2}{1+y^2}=0$，得 $x=\pm1$，且可知 $\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{-2x(1+y^2)^2-2y(1-x^2)^2}{(1+y^2)^3}$；

当 $x=1$ 时，可解得 $y=1$，$y''=-1<0$，函数取得极大值 $y=1$；

当 $x=-1$ 时，可解得 $y=0$，$y''=2>0$，函数取得极小值 $y=0$.

17.（本题满分 10 分）

设平面区域 $D=\{(x,y)\,|\,1\le x^2+y^2\le 4, x\ge 0. y\ge 0\}$. 计算 $\iint_D \frac{x\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}dxdy$

【详解】由对称性可得

$$\iint_D \frac{x\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}dxd=\iint_D \frac{y\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}dxd=\frac{1}{2}\iint_D \frac{(x+y)\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{x+y}dxdy$$

$$=\frac{1}{2}\iint_D \frac{\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{1}dxd=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_1^2 r\sin\pi r dr=-\frac{3}{4}$$

18.（本题满分 10 分）

设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数，$z=f(e^x\cos y)$ 满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=(4z+e^x\cos y)e^{2x}$. 若 $f(0)=0, f'(0)=0$，求 $f(u)$ 的表达式.

【详解】

设 $u=e^x\cos y$，则 $z=f(u)=f(e^x\cos y)$，

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f'(u)e^{x\cos y}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f''(u)e^{2x}\cos^2 y+f'(u)e^x\cos y;$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=-f'(u)e^x\sin y, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f''(u)e^{2x}\sin^2 y-f'(u)e^x\cos y;$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f''(u)e^{2x}=f''(e^x\cos y)e^{2x}$$

由条件 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=(4z+e^x\cos y)e^{2x}$，

可知

$$f''(u)=4f(u)+u$$

这是一个二阶常用系数线性非齐次方程.

对应齐次方程的通解为：

$f(u)=C_1e^{2u}+C_2e^{-2u}$ 其中 C_1, C_2 为任意常数.

对应非齐次方程特解可求得为 $y^*=-\frac{1}{4}u$.

故非齐次方程通解为 $f(u)=C_1e^{2u}+C_2e^{-2u}-\frac{1}{4}u$.

将初始条件 $f(0)=0, f'(0)=0$ 代入，可得 $C_1=\frac{1}{16}, C_2=-\frac{1}{16}$.

所以 $f(u)$ 的表达式为 $f(u)=\frac{1}{16}e^{2u}-\frac{1}{16}e^{-2u}-\frac{1}{4}u$.

19.（本题满分 10 分）

设函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a.b]$ 上连续，且 $f(x)$ 单调增加，$0\le g(x)\le 1$，证明：

（1） $0\le\int_a^x g(t)dt\le x-a,\ x\in[a,b]$；

（2） $\int_a^{a+\int_a^b g(t)dt} f(x)dx\le\int_a^b f(x)g(x)dx$.

【详解】

（1）证明：因为 $0\le g(x)\le 1$，所以 $\int_a^x 0dx\le\int_a^x g(t)dt\le\int_a^x 1dt\ \ x\in[a,b]$.

即 $0\le\int_a^x g(t)dt\le x-a,\ x\in[a,b]$.

（2）令 $F(x)=\int_a^x f(u)g(u)du-\int_a^{a+\int_a^x g(t)dt} f(u)du$，

则可知 $F(a)=0$，且 $F'(x)=f(x)g(x)-g(x)f\left(a+\int_a^x g(t)dt\right)$，

因为 $0\le\int_a^x g(t)dt\le x-a,$ 且 $f(x)$ 单调增加，

所以 $f\left(a+\int_a^x g(t)dt\right)\le f(a+x-a)=f(x)$. 从而

$F'(x)=f(x)g(x)-g(x)f\left(a+\int_a^x g(t)dt\right)\ge f(x)g(x)-g(x)f(x)=0,\qquad x\in[a,b]$

也是 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 单调增加，则 $F(b)\ge F(a)=0$，即得到

$$\int_a^{a+\int_a^b g(t)dt} f(x)dx\le\int_a^b f(x)g(x)dx.$$

20.（本题满分 11 分）

设函数 $f(x)=\frac{x}{1+x}, x\in[0,1]$，定义函数列

$$f_1(x)=f(x),\ f_2(x)=f(f_1(x)),\ \cdots, f_n(x)=f(f_{n-1}(x)),\cdots$$

设 S_n 是曲线 $y=f_n(x)$，直线 $x=1,\ y=0$ 所围图形的面积. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} nS_n$.

【详解】

$$f_1(x)=\frac{x}{1+x}, f_2(x)=\frac{f_1(x)}{1+f_1(x)}=\frac{\frac{x}{1+x}}{1+\frac{x}{1+x}}=\frac{x}{1+2x},\ f_3(x)=\frac{x}{1+3x},\cdots,$$

利用数学归纳法可得 $f_n(x)=\dfrac{x}{1+nx}$.

$$S_n=\int_0^1 f_n(x)dx=\int_0^1\frac{x}{1+nx}dx=\frac{1}{n}\int_0^1(1-\frac{1}{1+nx})dx=\frac{1}{n}(1-\frac{\ln(1+n)}{n}),$$

$$\lim_{n\to\infty}nS_n=\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{\ln(1+n)}{n}\right)=1.$$

21.（本题满分 11 分）

已知函数 $f(x,y)$ 满足 $\dfrac{\partial f}{\partial y}=2(y+1)$，且 $f(y,y)=(y+1)^2-(2-y)\ln y$，求曲线 $f(x,y)=0$ 所成的图形绕直线 $y=-1$ 旋转所成的旋转体的体积.

【详解】

由于函数 $f(x,y)$ 满足 $\dfrac{\partial f}{\partial y}=2(y+1)$，所以 $f(x,y)=y^2+2y+C(x)$，其中 $C(x)$ 为待定的连续函数.

又因为 $f(y,y)=(y+1)^2-(2-y)\ln y$，从而可知 $C(y)=1-(2-y)\ln y$，

得到 $f(x,y)=y^2+2y+C(x)=y^2+2y+1-(2-x)\ln x$.

令 $f(x,y)=0$，可得 $(y+1)^2=(2-x)\ln x$．且当 $y=-1$ 时，$x_1=1,x_2=2$.

曲线 $f(x,y)=0$ 所成的图形绕直线 $y=-1$ 旋转所成的旋转体的体积为

$$V=\pi\int_1^2(y+1)^2dx=\pi\int_1^2(2-x)\ln xdx=(2\ln 2-\frac{5}{4})\pi$$

22.（本题满分 11 分）

设 $A=\begin{pmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\1&2&0&3\end{pmatrix}$，E 为三阶单位矩阵.

（1） 求方程组 $AX=0$ 的一个基础解系；

（2） 求满足 $AB=E$ 的所有矩阵.

【详解】（1）对系数矩阵 A 进行初等行变换如下：

$$A=\begin{pmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\1&2&0&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\0&4&-3&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&3&-4\\0&1&-1&1\\0&0&1&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&-2\\0&0&1&-3\end{pmatrix},$$

得到方程组 $AX=0$ 同解方程组

$$\begin{cases} x_1 = -x_4 \\ x_2 = 2x_4 \\ x_3 = 3x_4 \end{cases}$$

得到 $AX = 0$ 的一个基础解系 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$.

（2）显然 B 矩阵是一个 4×3 矩阵，设 $B = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \\ x_4 & y_4 & z_4 \end{pmatrix}$

对矩阵 (AE) 进行进行初等行变换如下：

$$(AE) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & -3 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\to \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & -4 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 2 & 6 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & -1 & -4 & 1 \end{pmatrix}$$

由方程组可得矩阵 B 对应的三列分别为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix},$$

即满足 $AB = E$ 的所有矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} 2 - c_1 & 6 - c_2 & -1 - c_3 \\ -1 + 2c_1 & -3 + 2c_2 & 1 + 2c_3 \\ -1 + 3c_1 & -4 + 3c_2 & 1 + 3c_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}$$

其中 c_1, c_2, c_3 为任意常数.

23.（本题满分 11 分）

证明 n 阶矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & n \end{pmatrix}$ 相似.

【详解】证明：设 $A=\begin{pmatrix}1&1&\cdots&1\\1&1&\cdots&1\\\vdots&\vdots&&\vdots\\1&1&\cdots&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&\cdots&0&1\\0&\cdots&0&2\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&\cdots&0&n\end{pmatrix}$.

分别求两个矩阵的特征值和特征向量如下：

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-1&\cdots&-1\\-1&\lambda-1&\cdots&-1\\\vdots&\vdots&&\vdots\\-1&-1&\cdots&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-n)\lambda^{n-1},$$

所以 A 的 n 个特征值为 $\lambda_1=n,\lambda_2=\lambda_3=\cdots\lambda_n=0$；

而且 A 是实对称矩阵，所以一定可以对角化．且 $A\sim\begin{pmatrix}\lambda&&&\\&0&&\\&&\cdots&\\&&&0\end{pmatrix}$；

$$|\lambda E-B|=\begin{vmatrix}\lambda&0&\cdots&-1\\0&\lambda&\cdots&-2\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&\lambda-n\end{vmatrix}=(\lambda-n)\lambda^{n-1}$$

所以 B 的 n 个特征值也为 $\lambda_1=n,\lambda_2=\lambda_3=\cdots\lambda_n=0$；

2016年考研各科目专用题库复习和考试软件


说明：

本人已于 2015 年顺利通过了考研。由于考研的科目很多，题目更多，因此不能全部将各科试题上传，为了帮助各位顺利过关，本人叫朋友将考研的全部试题【政治、数学等】弄成一个复习、考试软件，非常好用，只要把题目的部分关键文字输进去就马上得到答案，也可以随时查找真题，哪一年的试题等等，功能很强大。但先要下载，然后双击即可安装，不喜勿看。

点击“软件下载”【　按住 ctrl 键点击即可　】

软件截图：




全真模拟考场
多种做题模式
章节专项训练
强大的错题强化复习
精确的智能判分
互动笔记
统计分析，做题记忆
试卷分类
全部
历年真题
模拟试题
预测试题
区域
全部
国考
安徽
切换区域
小提示：在分类上单击右键，可清空做题记录
双击进行单项训练
题目分类
已做过/总题数
正确率
40/1047
76%
5/164
82%
10/430
95%
9/205
86%
10/280
81%
5/265
93%
10/336
88%
25/600
97%
每个章节的正确率一目了然
选择强化正确率低的章节
整体分数自然就高了
分类精确的专项训练
按考试的科目、章节进行分类练习，针对性强。覆盖了应考的全部知识点，并且
可对试卷类型，区域进行赛选


全真模拟考场
多种做题模式
章节专项训练
强大的错题强化复习
精确的智能判分
互动笔记
统计分析，做题记忆
错题分类
全部 (114)
需要记忆的 (2)
我懂的 (0)
我不懂的 (0)
未分类的 (112)
双击进行错题考试
题目分类
错题数量
37
3
8
6
8
3
9
21
19
根据记忆曲线，你需要进行
第 2 阶段 7 题的复习
点击红点开始复习
100
80
60
40
20
1 2 3 4 5
天数
有效的错题复习模式+科学记忆法
软件自动提取错题，并加以分类，对于不同的题目，不同的类型进行塞选，让复习更加有效，并且每道错题都会定时提醒复习时间，确保记忆效率。


全真模拟考场
多种做题模式
章节专项训练
强大的错题强化复习
精确的智能判分
互动笔记
统计分析，做题记忆
判题结束
试卷总分：104.50分
得分：24.10分 (23.06)
考试时间：120分钟
用时：00:00:30
题目分类
总分
得分
正确率
12.5 3 24%
25 6 24%
10 2 20%
2.5 0 0%
6 1.8 30%
5 1 20%
8 2.4 30%
3.5 0.7 20%
32 7.2 22%
一目了然的智能判分
不仅仅可以计算出常规的得分，还能计算出每个分类的错误率，让你知道该加强哪个地方。

对于 $n-1$ 重特征值 $\lambda=0$，由于矩阵 $(0E-B)=-B$ 的秩显然为 1，所以矩阵 B 对应 $n-1$ 重特征值 $\lambda=0$ 的特征向量应该有 $n-1$ 个线性无关，进一步矩阵 B 存在 n 个线性无关的特征向量，即矩阵 B 一定可以对角化，且 $B\sim\begin{pmatrix}\lambda & & & \\ & 0 & & \\ & & \cdots & \\ & & & 0\end{pmatrix}$

从而可知 n 阶矩阵 $\begin{pmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 1 & \cdots & 1\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & 1 & \cdots & 1\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}0 & \cdots & 0 & 1\\ 0 & \cdots & 0 & 2\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & \cdots & 0 & n\end{pmatrix}$ 相似.