

有機化学実験 文献調査

Author: No.7 05253011 Fumiya Kashiwai / 柏井史哉

2025 年 10 月 20 日

1 3,6-dimethylphthalic anhydride の合成

1.1 Purpose and Background

scheme6-1.png

図 1: default

1.2 Experimental

1. ナスフラスコにアンバーリスト 320 mg、化合物 1 21.17 g をとり、マグネティックスターラーで攪拌しながら 130°C のオイルバスで蒸留して留分を得た。留分は水冷した。
2. 受けに用いていたフラスコが転倒し、産物をロスしたためあらためて操作を行った。

3. ナスフラスコにアンバーリスト 220 mg、化合物 **1** 21.00 g をとり、スターラーで攪拌しながら 130°C のオイルバスで蒸留して留分を得た。留分は氷冷して得た。蒸気温度が 75°C で流出が開始し、蒸気温度が 82°C まで上昇したのち、76°C 程度まで低下し液体の流出が穏やかになったところで蒸留を停止した。
4. 得られた留分は下層 (透明) と、上層 (黄色) にほぼ同体積で分離していた。下の水層をピペットで大方取り除いたのち、無水 Na₂SO₄ を加えて乾燥、ひだつきろしにより濾過することにより化合物 **2** の粗精製物 (9.93 g, 56%) を得た。
5. 三角フラスコに乳鉢で粉碎した無水マレイン酸 8.09 g、Et₂O を加え、マグネティックスターラーで激しく攪拌して懸濁させた。
6. 化合物 **2** の粗精製物 9.70 g をフラスコに加え、アルミホイルで蓋をして、室温で攪拌したところ、黄色の均質な溶液となった。45 min 程度攪拌を続けると白濁し、白色の沈澱が生じた。
7. 生じた沈澱を吸引濾過すると黄色がかった固体を得た。氷冷した Et₂O で洗浄し、白色の固体 **3** (8.17 g, 48%) を得た。この固体を風乾し、IR、¹H NMR スペクトルを測定した。また、この物質の融点の測定値は 71 – 72°C (文献値: 67 – 71°C) であった。
8. 乾燥した三角フラスコに濃 H₂SO₄ 40 mL をはかりとり、食塩を加えた氷浴により –6°C 程度に冷却した。温度をモニターしながら、溶液の温度を –3°C 前後に保って固体 **3** 4.01 g を少しずつ加えた。1 h 程度で固体を加え終わったのち、10 min 程度攪拌して溶液が均質になった。
9. 氷浴を外して溶液を室温に戻したのち、300 mL の氷水にゆっくりと加えたところ、白濁した。
10. 吸引濾過ののち、水 5 mL で洗浄し粘土状の白色固体を得た。
11. 得られた固体を 10% NaOH_{aq}. 30 mL に溶かし、AcOH 5 mL を加えた。析出した固体をひだ付き濾紙を通して、取り除いた。
12. 濾液に濃塩酸 4 mL を加えると白色の結晶が生じた。この結晶を吸引濾過によりろ別した。時間の都合上、結晶の状態で 4 days 風乾した。
13. 得られた固体を toluene 50 mL に溶解し、常圧蒸留を行い、toluene およびを留去した。はじめ蒸気温度 80°C 程度の成分が流出し、蒸気温度が低下したところで一旦加熱を停止し、熱時濾過により固体を除去した。
14. さらに蒸留を行い、蒸気温度 102°C 程度の成分を得た。全量 5 mL 程度まで濃縮し、氷冷して無色透明な固体 (0.95 g, 26%) を得た。得られた固体の IR スペクトル、¹H NMR スペクトルを取得した。測定した融点は 145 – 146°C (文献値: 146 – 147°C) であった。

1.3 Result and Discussion


1.4 Conclusion

2 hoge の合成

2.1 Purpose and Background

2.2 Experimental

1. ミツロフラスコに NaOH 1.15 g、水 100 mL を加え、攪拌して均一な溶液とした。



scheme6-2.png

図 2: default

2. 湯浴で 120°C に加熱し、穏やかに還流させながら滴下管から化合物 **1** 12.60 g を 5 min かけて滴下した。
3. TLC により反応の進行をモニターし、20 min 後に出発物 ($R_f =$) の消失確認した。滴下終了後 30 min 攪拌し、反応を終了とした。
4. 氷冷により室温まで冷却したのち、NaCl 10.56 g を加え、Et₂O 50 mL で 3 回抽出し、合わせた有機層を Brine で洗浄したのち、無水 Na₂SO₄ で乾燥、濾別して得られたエーテル溶液を、エバポレーターによる減圧下 (300 mmHg) で溶媒を留去し、8.02 g に減容した。
5. 得られた黒色の液体を減圧蒸留した。はじめ減圧すると液体が沸騰し、沸騰がおさまったのちに加熱すると 20 Torr/ 44°C で 1 つ目の留分が、19 Torr/ 75°C で 2 つ目の留分 (無色油状, 0.98 g, 9.2%) が

得られた。蒸気の温度が 50°C まで低下したところで蒸留操作を終了した。

6. 得られた無色油状の液体 **6** の GC、IR スペクトルを取得した。
7. 白色固体 **7** 9.95 g を水に溶かし 50 mL とした。
8. 三角フラスコに液体 **6**、先ほど調整した **7aq.** のうち 15 mL、1 M HCl_{aq.} を加え、攪拌すると白色固体が生じた。
9. 吸引濾過し、得られた白色固体を水、イソプロピルアルコール (IPA)、Et₂O の順に洗浄し、風乾したところ白色固体 (0.05 g) が得られた。この固体の融点の測定値は 88 – 89°C (文献値: 86 – 87°C) であった。
10. しばらく減圧を続けたところ濾液が白濁したため再度吸引濾過を行い、氷冷した IPA、Et₂O の順に洗浄したところ、白色固体 (0.63 g) が得られた。この固体の融点の測定値は 90°C であった。1 次結晶、2 次結晶を合わせた収量は 0.68 g (34%) であった。

■Appendix: **1 → 6 の再合成** 1 度目の反応で、1 段階目の反応の収率が著しく低かったため、**1** の滴下速度を小さくして再合成を試みた。

1. ミツロフラスコに NaOH 1.15 g、水 100 mL を加え、攪拌して均一な溶液とした。
2. 湯浴で 120°C に加熱し、穏やかに還流させながら滴下管から化合物 **1** 12.02 g を 40 min かけて滴下した。
3. 滴下終了後 20 min 攪拌したのち加熱を終了した。
4. 氷冷により室温まで冷却したのち、Et₂O 50 mL で 2 回抽出した。水層を NaCl で飽和させたのち、Et₂O 50 mL で洗浄し、合わせた有機層を Brine で洗浄した。無水 Na₂SO₄ で乾燥、濾別して得られたエーテル溶液を、エバポレーターによる減圧下 (300 mmHg) で溶媒を留去し減容した。
5. 得られた黒色の液体を減圧蒸留した。はじめ減圧すると液体が沸騰し、沸騰がおさまったのちに加熱すると、27 Torr/ 79°C で 2 つ目の留分 (無色油状, 3.42 g, 9.2%) が得られた。蒸気の温度が 50°C まで低下したところで蒸留操作を終了した。

2.3 Result and Discussion

2.4 Conclusion

Reference

- [1] Hugo E. Gottlieb, Vadim Kotlyar, and Abraham Nudelman, NMR Chemical Shifts of Common Laboratory Solvents as Trace Impurities J. Org. Chem. 1997, 62, 7512-7515