DIFUSION PLANESI

La OMS y la OIT reconocieron que la Silicosis es una de las enfermedades más graves que afecta a la población trabajadora, por lo que decidieron desarrollar e implementar a nivel global una iniciativa conducente a erradicar el problema al año 2030, mediante el desarrollo e implementación de un programa nacional orientado a disminuir gradualmente la exposición laboral a sílice.



Grado de Exposición a Sílice, según Fractura, Confinamiento de la Actividad de Riesgo y el % de Sílice Cristalina en la Materia Prima.

Fractura (1)	Tipo de Espacio	% Sílice Cristalina	Grado de Exposición
Hay Fractura	Espacio Cerrado **(2)**	Mayor al 30%	4
		Entre 1 y 30%	3
	Espacio Abierto **(3)**	Mayor al 30%	3
		Entre 1 y 30%	2
No Hay Fractura	Espacio Cerrado **(2)**	Mayor al 30%	3
		Entre 1 y 30%	2
	Espacio Abierto **(3)**	Mayor al 30%	2
		Entre 1 y 30%	1

Fractura de materia prima: Toda actividad que implique pulido, triturado, chancado, perforación, esmerilado, corte con herramientas de alta velocidad, tronadura, atomización abrasiva y demolición.

Espacio Cerrado : lugar que se encuentra delimitado por paredes y techo.

Espacio Abierto : lugar que se encuentra al aire libre, a la intemperie.