a posterior support mass

	3D mean	3D s1	3D s2	3D s3	2D
bh_rev (baseline)	0.04	0.03	0.04	0.03	0.01
bh_rev, seed 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
bh_rev_founder	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
gw_rev (GW)	–	–	–	–	0.00
bh_two	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
bh_two_founder	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
bh_multi (1–8 cells)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
bh_hetero_div	0.37	0.40	0.42	0.44	0.57
bh_hetero	0.06	0.17	0.13	0.18	0.15
bh_dd	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
bh_dd_hetero_div	0.41	0.29	0.43	0.32	0.83
bh_dd_hetero (final)	0.79	0.85	0.81	0.83	0.73
bh_dd_hetero, seed 1	0.91	0.94	0.93	0.94	0.93

b PPC: share of features outside 95%

3D mean	3D s1	3D s2	3D s3	2D
0.50	0.44	0.46	0.44	0.54
–	–	–	–	–
–	(0.42)	(0.60)	(0.29)	(0.79)
–	–	–	–	(0.44)
(0.67)	–	–	–	0.40
(0.21)	(0.15)	(0.27)	(0.38)	0.38
–	–	–	–	0.27
0.35	0.31	0.29	0.31	0.48
0.54	0.54	0.58	0.56	0.44
(0.54)	(0.42)	(0.56)	(0.48)	0.12
0.19	0.17	0.19	0.21	0.10
0.10	0.04	0.06	0.02	0.10
0.06	0.00	0.02	0.00	0.15

–: not fitted (gw_rev: 2D only) or no posterior sample inside the prior. Grey (0.xx): PPC from < 100 posterior samples (support ≈ 0), not reliable.