

Pembahasan Kuis 2 Alin 2023 Tipe C

Apakah $a(-4, 8, 3)$ $b(7, -4, 2)$ $c(-5, 5, 7)$ terletak pada bidang datar yang sama ?. Carilah Determinan A dengan merubah menjadi gauss.

Untuk melakukan pengecekan ini, kita perlu melakukan operasi menggunakan persamaan:

$$\det a \cdot (b \times c) = 0$$

Dimana jika mencari determinan tersebut menghasilkan nilai 0, maka ketiga titik tersebut berada pada bidang yang sama.

Berikutnya kita akan membuat matriks $a \cdot (b \times c)$ terlebih dahulu, Dimana matriks ini akan berbentuk:

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & 8 & 3 \\ 7 & -4 & 2 \\ -5 & 5 & 7 \end{vmatrix}$$

Setelah kita membentuk matriks tersebut, kita akan mencari menggunakan salah satu dari 3 metode yang telah diajarkan, yakni: Gauss, Segitiga Atas, Kofaktor baris, dan Kofaktor kolom. Pada kali ini, kita akan menggunakan metode Gauss

$$A = \begin{vmatrix} -4 & 8 & 3 \\ 7 & -4 & 2 \\ -5 & 5 & 7 \end{vmatrix}$$

$$\text{iterasi 1: } B_1 = B_1 \cdot -\frac{1}{4}$$

$$B_1 = \begin{pmatrix} -4 \\ 8 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot -\frac{1}{4}$$

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -0,75 \end{pmatrix}$$

$$-4 \begin{vmatrix} 1 & -2 & -0,75 \\ 7 & -4 & 2 \\ -5 & 5 & 7 \end{vmatrix}$$

$$\text{iterasi 2: } B_2 = B_2 + B_1 \cdot -7$$

$$B_2 = \begin{pmatrix} 7 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -0,75 \end{pmatrix} \cdot -7$$

$$B_2 = \begin{pmatrix} 7 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -7 \\ 14 \\ 5,25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 10 \\ 7,25 \end{pmatrix}$$

$$\text{iterasi 4: } B_2 = B_2 \cdot \frac{1}{5,45}$$

$$B_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 10 \\ 7,25 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{10}$$

$$B_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0,73 \end{pmatrix}$$

$$-4 \cdot 10 \begin{vmatrix} 1 & -2 & -0,75 \\ 0 & 1 & 0,73 \\ 0 & -5 & 3,25 \end{vmatrix}$$

$$\text{iterasi 5: } B_3 = B_3 + B_2 \cdot 5$$

$$B_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ 3,25 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0,73 \end{pmatrix} \cdot 5$$

$$B_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ 3,25 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 3,65 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 6,9 \end{pmatrix}$$

$$-4 \left| \begin{array}{ccc} 1 & -2 & -0,75 \\ 0 & 10 & 7,25 \\ -5 & 5 & 7 \end{array} \right|$$

$$\text{iterasi 3: } B_3 = B_3 + B_1 \cdot 5$$

$$B_3 = \begin{pmatrix} -5 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -0,75 \end{pmatrix} \cdot 5$$

$$B_3 = \begin{pmatrix} -5 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ -10 \\ -3,75 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ 3,25 \end{pmatrix}$$

$$-4 \left| \begin{array}{ccc} 1 & -2 & -0,75 \\ 0 & 10 & 7,25 \\ 0 & -5 & 3,25 \end{array} \right|$$

$$-4 \cdot 10 \left| \begin{array}{ccc} 1 & -2 & -0,75 \\ 0 & 1 & 0,73 \\ 0 & 0 & 6,9 \end{array} \right|$$

$$\text{iterasi 6: } B_3 = B_3 \cdot \frac{1}{8,56}$$


$$B_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 6,9 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{6,9}$$

$$B_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$-4 \cdot 10 \cdot 6,9 \left| \begin{array}{ccc} 1 & -2 & -0,75 \\ 0 & 1 & 0,73 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right|$$

$$\text{Nilai Determinan A: } -4 \cdot 10 \cdot 6,9 = -276$$

Diketahui k (-8, 7, 3) dan f (-6, 3, 5), carilah proyeksi orthogonal vector k terhadap f.



$$\text{Maka kita akan mencari } w_1: w_1 = \frac{k \cdot f}{\|f\|^2} \cdot f$$

$$\therefore w_1 = \frac{84}{70} \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} = 1,2 \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7,2 \\ 3,6 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$k \cdot f = k_1 \cdot f_1 + k_2 \cdot f_2 + k_3 \cdot f_3$$

$$k \cdot f = (-8 \cdot -6) + (7 \cdot 3) + (3 \cdot 5)$$

$$k \cdot f = 48 + 21 + 15 = 84$$

$$\|f\| = \sqrt{(f_1)^2 + (f_2)^2 + (f_3)^2}$$

$$\|f\| = \sqrt{(-6)^2 + 3^2 + 5^2}$$

$$\|f\| = \sqrt{36 + 9 + 25} = \sqrt{70}$$

$$\|f\|^2 = (\sqrt{70})^2 = 70$$

Carilah komponen vector k yang orthogonal terhadap f

Maka kita akan mencari w_2

$$w_2 = k - w_1$$

$$w_2 = \begin{pmatrix} -8 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -7,2 \\ 3,6 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0,8 & x \\ 3,4 & y \\ -3 & z \end{pmatrix}$$

Berapakah jarak antara titik (3, -7) ke garis $8x - 5 = 7y$

Untuk menemukan jawaban dari pertanyaan ini, kita bisa menggunakan rumus:

$$\|d\| = \frac{|a \cdot x_0 + b \cdot y_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Lalu kita akan identifikasi terlebih dahulu masing-masing komponen terhadap persamaan di atas.

Persamaan Garis bisa kita ubah menjadi bentuk : $8x - 7y - 5 = 0$

Sehingga,

$$a = 8 \qquad x_0 = 3$$

$$b = -7 \qquad y_0 = -7$$

$$c = -5$$

Sehingga

$$\|d\| = \frac{|a \cdot x_0 + b \cdot y_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\|d\| = \frac{|8 \cdot 3 + (-7) \cdot (-7) + (-5)|}{\sqrt{8^2 + (-7)^2}} = \frac{|24 + 49 - 5|}{\sqrt{64 + 49}} = \frac{|68|}{\sqrt{113}} = \frac{68}{\sqrt{113}} = 6,4$$

Carilah persamaan bidang yang melalui titik f (6, -7, 3) g (-6, 8, -3) h (8, -6, 3). Vektor normal adalah $hf \times hg$.
Dan titik $P_0 = f$

Untuk mengerjakan soal ini, kita bisa menggunakan persamaan:

$$\overline{P_0P} \cdot \bar{n} = 0$$

$$P_0 = f = (6, -7, 3)$$

$$P = (x, y, z)$$

$$\bar{n} = hf \times hg$$

$$hf = f - h$$

$$hg = g - h$$

$$= \begin{pmatrix} 6 \\ -7 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 8 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -6 \\ 8 \\ -3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 8 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -14 \\ 14 \\ -6 \end{pmatrix}$$

$$\therefore df \times dg = \begin{vmatrix} -2 & -1 & 0 \\ -14 & 14 & -6 \end{vmatrix}$$

$$\bar{n} = \left(\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 14 & -6 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} -2 & 0 \\ -14 & -6 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ -14 & 14 \end{vmatrix} \right)$$

$$\bar{n} = (6, -12, -42)$$

$$\therefore \overline{P_0P} \cdot \bar{n} = 0$$

$$[P - f] \cdot \bar{n} = 0$$

$$[(x - 6), (y - (-7)), (z - 3)] \cdot (6, -12, -42) = 0$$

$$[6 \cdot (x - 6)] + [-12 \cdot (y + 7)] + [-42 \cdot (z - 3)] = 0$$

$$(6x - 36) + (-12y - 84) + (-42z + 126) = 0$$

$$6x - 12y - 42z + 6 = 0$$

$$\text{Variabel X} = 6$$

$$\text{Variabel Y} = -12$$

$$\text{Variabel Z} = -42$$

$$\text{Variabel Konstanta} = 6$$

Hitunglah $h \cdot k$ jika diketahui $h + k = (7, -5, 8)$ dan $h - k = (5, -4, 7)$

Untuk menyelesaikan perkalian cross di atas, kita bisa menggunakan persamaan:

$$h \cdot k = \frac{1}{4} \cdot \|h + k\|^2 - \frac{1}{4} \cdot \|h - k\|^2$$

$$\|h + k\| = \sqrt{7^2 + (-5)^2 + 8^2} = \sqrt{49 + 25 + 64} = \sqrt{138}$$

$$\|h + k\|^2 = (\sqrt{138})^2 = 138$$

$$\|h - k\| = \sqrt{5^2 + (-4)^2 + 7^2} = \sqrt{25 + 16 + 49} = \sqrt{90}$$

$$\|h - k\|^2 = (\sqrt{90})^2 = 90$$

$$\therefore h \cdot k = \frac{1}{4} \cdot 138 - \frac{1}{4} \cdot 90 = 34,5 - 22,5 = 12$$

Carilah luas segitiga yang ditentukan oleh titik $a(9, -5, 3)$ $b(-8, 5, -7)$ $c(9, -4, 7)$. Titik pusat adalah b dan perkalian cross nya adalah $ba \times bc$.

Untuk mencari luas segitiga, kita bisa menggunakan rumus:

$$L\Delta = \frac{1}{2} \cdot \|ba \times bc\|$$

Dengan persamaan di atas, kita perlu mencari hasil perkalian cross dari $ca \times cb$ lalu kita cari Panjang dari hasil perkalian cross tersebut. Setelah itu kita kalikan dengan 0,5

$$ba = a - b$$

$$bc = c - b$$

$$= \begin{pmatrix} 9 \\ -5 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -8 \\ 5 \\ -7 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 9 \\ -4 \\ 7 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -8 \\ 5 \\ -7 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 17 \\ -10 \\ 10 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 17 \\ -9 \\ 14 \end{pmatrix}$$

$$\therefore ab \times ac = \begin{vmatrix} 17 & -10 & 10 \\ 17 & -9 & 14 \end{vmatrix}$$

$$= \left(\begin{vmatrix} -10 & 10 \\ -9 & 14 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} 17 & 10 \\ 17 & 14 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 17 & -10 \\ 17 & -9 \end{vmatrix} \right)$$

$$= \begin{pmatrix} -50, & -68, & 17 \\ x & y & z \end{pmatrix}$$

Setelah kita menemukan hasil perkalian cross $ab \times ac$, kita akan melanjutkan untuk menghitung Panjang dari hasil cross tersebut

$$\|ab \times ac\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{(-50)^2 + (-68)^2 + (17)^2} = \sqrt{7413} = 86,1$$

$$\text{Luas Segitiga: } \frac{1}{2} \cdot \|ab \times ac\| = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{7413} = \frac{\sqrt{7413}}{2} \text{ atau } \frac{1}{2} \cdot 86,1 = 43,05$$

$$\text{Luas Jajaran Genjang: } 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \|ab \times ac\| = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \sqrt{7413} = \sqrt{7413} \text{ atau } 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 86,1 = 86,1$$