🐾 Fauna

Retorno histórico da Ararinha-azul à natureza na Caatinga

- **Resumo:** Após ser declarada extinta na natureza no ano 2000 devido ao tráfico de animais e à perda de habitat, a ararinha-azul (*Cyanopsitta spixii*) protagonizou um dos maiores marcos da conservação mundial. Através de um programa internacional de reprodução em cativeiro e reintrodução em Curaçá (BA), dezenas de aves voltaram a voar livres no sertão e registraram os primeiros filhotes nascidos em liberdade após mais de duas décadas.
- **Fonte / Link:** Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) - Projeto Ararinha na Natureza

Mico-leão-dourado atinge marco histórico de recuperação na Mata Atlântica

- **Resumo:** Símbolo da luta contra a extinção no Brasil, o mico-leão-dourado chegou a ter apenas cerca de 200 indivíduos livres na década de 1970. Graças ao plantio de corredores ecológicos e à construção de um viaduto vegetado sobre a rodovia BR-101 no Rio de Janeiro para conectar fragmentos de floresta, a população silvestre superou a marca histórica de 4.800 animais.
- **Fonte / Link:** Associação Mico-Leão-Dourado (AMLD)

🌿 Flora

Pau-brasil entra na lista de alerta máximo de conservação internacional

- **Resumo:** A árvore que deu nome ao país e símbolo da Mata Atlântica voltou ao centro dos debates globais na Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (CITES). O Brasil liderou discussões históricas para restringir severamente o comércio internacional de sua madeira, que ainda sofre pressão pela exploração ilegal destinada à fabricação de arcos de violino de alto padrão no exterior.
- **Fonte / Link:** Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) / Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ)

Desmatamento no Cerrado supera o da Amazônia pela primeira vez na história

- **Resumo:** Levantamentos recentes do MapBiomas e do sistema Deter/PRODES (INPE) revelaram uma virada histórica preocupante para a flora brasileira: enquanto a perda de vegetação nativa na Amazônia apresentou queda acentuada, o Cerrado passou a concentrar mais da metade de todo o desmatamento do país (especialmente na região do Matopiba), ameaçando milhares de espécies de plantas exclusivas da savana.
- **Fonte / Link:** Relatório Anual do Desmatamento no Brasil - MapBiomas

🌦️ Clima

Seca histórica na Amazônia leva rios aos menores níveis em mais de 120 anos

- **Resumo:** Sob o efeito combinado do aquecimento global e do fenômeno El Niño, a bacia amazônica enfrentou a estiagem mais severa desde o início das medições oficiais no Porto de Manaus (em 1902). Rios gigantescos como o Negro, o Solimões e o Madeira atingiram cotas mínimas recordes, isolando comunidades ribeirinhas, interrompendo a navegação e provocando a mortandade de botos pelo superaquecimento da água nos

lagos rasos.

- **Fonte / Link:** Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM) - Monitoramento Hidrológico / INPE

Tragédia climática no Rio Grande do Sul: chuvas extremas atingem Pampa e Mata Atlântica

- **Resumo:** O estado do Rio Grande do Sul registrou o maior desastre climático de sua história recente, quando bloqueios atmosféricos provocaram volumes de chuva equivalentes a meses inteiros em poucos dias. A inundação recorde do Lago Guaíba e das bacias dos rios Taquari e Jacuí afetou mais de 90% dos municípios gaúchos, alterando ecossistemas inteiros na transição entre a Mata Atlântica e os campos do Pampa.
- **Fonte / Link:** Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)

🌱 Solo e Água

Identificação da primeira região de clima Árido no Brasil e avanço da desertificação na Caatinga

- **Resumo:** Um estudo inédito conduzido pelo Cemaden e pelo INPE constatou que, pela primeira vez na história do monitoramento climático brasileiro, uma área no norte da Bahia (dentro da Caatinga) deixou de ser classificada como "semiárida" e passou a ser oficialmente **árida**. O levantamento alerta que a degradação do solo somada à perda de umidade está acelerando o processo de desertificação no sertão nordestino.
- **Fonte / Link:** Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden)

Pantanal perde mais de 60% de sua superfície de água e enfrenta incêndios subterrâneos

- **Resumo:** Dados de monitoramento por satélite mostraram que o Pantanal vem sofrendo uma redução drástica na área que alaga anualmente durante as cheias. Com o solo da planície exposto e seco por mais tempo, o bioma enfrentou temporadas históricas de incêndios severos, incluindo o fenômeno do "fogo subterrâneo" (ou fogo de turfa), em que a matéria orgânica acumulada debaixo da terra queima lentamente por semanas sem chama visível na superfície.
- **Fonte / Link:** MapBiomas Água / LASA - Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais (UFRJ)