Ondas eletromagnéticas

Flaviano Williams Fernandes


Instituto Federal do Paraná Campus Irati

7 de novembro de 2024

Sumário

- A teoria do eletromagnetismo
- Ondas eletromagnéticas
- **Aplicações**
- **Apêndice**

Campo elétrico induzido



 Φ_B : B por area perpendicular a espira

Campo elétrico induzido \vec{E} .

Lei de Faraday

A variação do fluxo do campo magnético que atravessa uma espira fechada faz aparecer um campo elétrico induzido ao redor dessa espira.


Corollary

Ao contrário da corrente induzida, o campo elétrico pode existir na ausência de matéria.

Campo magnético induzido

Simetria dos fenômenos elétricos e magnéticos

Maxwell, usando a idéia de simetria, sugeriu que assim como a variação de um campo magnético no espaço pode induzir um campo elétrico, a variação do campo elétrico também pode induzir um campo magnético.




Campo magnético induzido \vec{B} .

Lei de Maxwell


A variação do fluxo do campo elétrico que atravessa uma espira fechada faz aparecer um campo magnético induzido ao redor dessa espira,

Prof. Flaviano W. Fernandes



Campo magnético induzido pela variação de \vec{E} . Campo elétrico induzido pela variação de \vec{B} .

A unificação das teorias do eletromagnetismo e a contribuição dada por Maxwell, sugeriu que os campos elétricos e magnéticos deveriam ser representados por funções senoidais, ou seja, tanto o campo elétrico quanto o magnético são ondas que se propagam na mesma direção e sentido e com a mesma velocidade c.



Onda eletromagnética.

A intensidade / da onda, ou seja, energia transportada por área e por tempo, é diretamente proporcional ao quadrado da amplitude do campo elétrico E dessa onda.

 $I \alpha E^2$.

Corollary

Uma onda transporta energia mas não transporta matéria, portanto a onda não possui massa.

A velocidade da onda eletromagnética

O campo elétrico é definido como

$$E = K \frac{Q}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2},$$

onde $\varepsilon_0 \approx 8,9 \times 10^{-12}$ F/m.

O campo magnético ao redor de um fio condutor é definido como

$$B=\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{i}{r},$$

onde $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \ N/A^2$.

Pela teoria do eletromagnetismo temos que a velocidade da onda é dado por

$$c=\frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}.$$

$$c \approx 3 \times 10^8 \ m/s$$
.

Aplicações


A luz como onda eletromagnética


Maxwell percebeu que a velocidade c obtida à partir do eletromagnetismo é exatamente idêntica a velocidade da luz, já bem conhecida ná época através de diversas técnicas de medição.

"A velocidade das ondas transversais em nosso meio hipotético, calculada a partir dos experimentos electromagnéticos dos Srs. Kohrausch e Weber, concorda tão exactamente com a velocidade da luz, calculada pelos experimentos óticos do Sr. Fizeau, que é difícil evitar a inferência de que a luz consiste nas ondulações transversais do mesmo meio que é a causa dos fenômenos eléctricos e magnéticos."

Corollary

A luz é uma onda eletromagnética capaz de se propagar no vácuo com a velocidade de aproximadamente $3 \times 10^8 \ m/s$. Isso é possível, pois podemos ter variações dos campos elétrico e magnético na ausência de matéria.





Onda eletromagnética.

Corollary

A radiação eletromagnética está presente em todos os lugares do nosso cotidiano.

Alfabeto grego

Alfa	Α	α
Beta	В	β
Gama	Γ	γ
Delta	Δ	δ
Epsílon	Ε	ϵ , ε
Zeta	Z	ζ
Eta	Η	η
Teta	Θ	θ
lota	1	ι
Capa	K	κ
Lambda	Λ	λ
Mi	Μ	μ

Ni	Ν	ν
Csi	Ξ	ξ
ômicron	0	0
Pi	П	π
Rô	Р	ρ
Sigma	Σ	σ
Tau	Τ	au
ĺpsilon	Υ	v
Fi	Φ	ϕ, φ
Qui	X	χ
Psi	Ψ	ψ
Ômega	Ω	ω

Referências



A. Máximo, B. Alvarenga, C. Guimarães, Física. Contexto e aplicações, v.1, 2.ed., São Paulo, Scipione (2016)

Esta apresentação está disponível para download no endereço https://flavianowilliams.github.io/education