

Ondas eletromagnéticas

Flaviano Williams Fernandes


Instituto Federal do Paraná
Campus Irati

14 de Julho de 2022

Sumário

- 1 **A teoria do eletromagnetismo**
- 2 **Ondas eletromagnéticas**
- 3 **Aplicações**
- 4 **Apêndice**

Campo elétrico induzido



Φ_B : B por area perpendicular a espira

Campo elétrico induzido \vec{E} .

Lei de Faraday

A variação do fluxo do campo magnético que atravessa uma espira fechada faz aparecer um campo elétrico induzido ao redor dessa espira.


Corollary

Ao contrário da corrente induzida, o campo elétrico pode existir na ausência de matéria.

Campo magnético induzido

Simetria dos fenômenos elétricos e magnéticos



Maxwell, usando a idéia de simetria, sugeriu que assim como a variação de um **campo magnético** no espaço pode induzir um **campo elétrico**, a variação do **campo elétrico** também pode induzir um **campo magnético**.



Campo magnético induzido \vec{B} .


Lei de Maxwell

A variação do fluxo do campo elétrico que atravessa uma espira fechada faz aparecer um campo magnético induzido ao redor dessa espira,



Campo elétrico induzido pela variação de \vec{B} . Campo magnético induzido pela variação de \vec{E} .

A unificação das teorias do eletromagnetismo e a contribuição dada por Maxwell, sugeriu que os campos elétricos e magnéticos deveriam ser representados por funções senoidais, ou seja, tanto o campo elétrico quanto o magnético são ondas que se propagam na mesma direção e sentido e com a mesma velocidade c .



Onda eletromagnética.

A intensidade I da onda, ou seja, energia transportada por área e por tempo, é diretamente proporcional ao quadrado da frequência de oscilação f dessa onda,

$$I \propto f^2.$$

Corollary

Uma onda transporta energia mas não transporta matéria, portanto a onda não possui massa.

A velocidade da onda eletromagnética

O campo elétrico é definido como

$$E = K \frac{Q}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2},$$

onde $\epsilon_0 \approx 8,9 \times 10^{-12} \text{ F/m}$.

O campo magnético ao redor de um fio condutor é definido como

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{i}{r},$$

onde $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$.

Pela teoria do eletromagnetismo temos que a velocidade da onda é dado por

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0}}.$$

Velocidade da onda eletromagnética no vácuo

$$c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}.$$

A luz como onda eletromagnética



Maxwell percebeu que a velocidade c obtida à partir do eletromagnetismo é exatamente idêntica a velocidade da luz, já bem conhecida na época através de diversas técnicas de medição.

"A velocidade das ondas transversais em nosso meio hipotético, calculada a partir dos experimentos electromagnéticos dos Srs. Kohrausch e Weber, concorda tão exactamente com a velocidade da luz, calculada pelos experimentos óticos do Sr. Fizeau, que é difícil evitar a inferência de que a luz consiste nas ondulações transversais do mesmo meio que é a causa dos fenómenos eléctricos e magnéticos."

Corollary

*A luz é uma onda eletromagnética capaz de se **propagar no vácuo** com a velocidade de aproximadamente 3×10^8 m/s. Isso é possível, pois podemos ter variações dos campos elétrico e magnético na ausência de matéria.*

Spectro eletromagnético



Onda eletromagnética.

Corollary

A radiação eletromagnética está presente em todos os lugares do nosso cotidiano.

Alfabeto grego

Alfa	A	α
Beta	B	β
Gama	Γ	γ
Delta	Δ	δ
Epsílon	E	ϵ, ε
Zeta	Z	ζ
Eta	H	η
Teta	Θ	θ
Iota	I	ι
Capa	K	κ
Lambda	Λ	λ
Mi	M	μ

Ni	N	ν
Csi	Ξ	ξ
ômicon	O	o
Pi	Π	π
Rô	P	ρ
Sigma	Σ	σ
Tau	T	τ
Ípsilon	Υ	υ
Fi	Φ	ϕ, φ
Qui	X	χ
Psi	Ψ	ψ
Ômega	Ω	ω

Referências

 A. Máximo, B. Alvarenga, C. Guimarães, Física. Contexto e aplicações, v.1, 2.ed., São Paulo, Scipione (2016)

Esta apresentação está disponível para download no endereço
<https://flavianowilliams.github.io/education>