

Estimation d'erreur - Problème rehaussé.

On se place ici dans le cadre de FEM standard.

Problème initial :

On considère initialement le problème de Poisson avec condition de Dirichlet homogène ou non homogène :

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{dans } \Omega \\ u = g & \text{sur } \Gamma \end{cases} \quad (\mathcal{P})$$

Problème considéré :

Dans notre cas, on souhaite appliquer une correction à la sortie d'un FNO. On considère ici que l'on possède une solution analytique u_{ex} et qu'après une utilisation du FNO, on obtient une solution du type

$$\tilde{\phi}(x, y) = u_{ex}(x, y) - \epsilon P(x, y)$$

avec P la perturbation (tel que $P = 0$ sur Γ) et ϵ petit.

On considère

$$\hat{\phi} = \tilde{\phi} + m = u_{ex} - \epsilon P + m = \widehat{u_{ex}} - \epsilon P$$

avec $\widehat{u_{ex}} = u_{ex} + m$ et m une constante.

On souhaite alors résoudre le problème suivant :

$$\begin{cases} -\Delta(\hat{\phi}C) = f & \Omega \\ (\hat{\phi}C) = g + m & \Gamma \end{cases} \quad (\mathcal{C})$$

On pose alors

$$\hat{u} = \hat{\phi}C$$

But du document :

Démontrer la propriété suivante (présentée dans le document "Explication - Rehaussement avec FEM") :

$$\left\| \frac{u+m}{\hat{\phi}} - C_h \right\|_{L^2(\Omega)} \leq ch^{k+1} \left\| \frac{u+m}{\hat{\phi}} \right\|_{H^{k+1}(\Omega)} \|\hat{\phi}\|_{L^2(\Omega)} \quad (1)$$

Problèmes variationnels :

Problème variationnel :

$$\text{Trouver } \hat{u} \in V \text{ tel que } a(\hat{u}, v) = l(v), \forall v \in V$$

Problème variationnel approché :

$$\text{Trouver } \hat{u}_h \in V_h \text{ tel que } a(\hat{u}_h, v_h) = l(v_h), \forall v_h \in V_h$$

1 Partie 1 : norme H^1

Comme V_h sous espace vectoriel de V , en posant $v = v_h$, on a l'orthogonalité de Galerkin :

$$a(\hat{\phi}C, \hat{\phi}v_h) - a(\hat{\phi}C_h, \hat{\phi}v_h) = 0 \quad \forall v_h \in V_h$$

Donc (**ATTENTION : Abus de notation sur v_h !**)

$$a(\hat{u} - \hat{u}_h, v_h) = 0 \quad \forall v_h \in V_h$$

On a alors

$$\begin{aligned} \nu \|\hat{u} - \hat{u}_h\|_1^2 &\leq \alpha a(\hat{u} - \hat{u}_h, \hat{u} - \hat{u}_h) && \text{par coercivité} \\ &= \alpha a(\hat{u} - \hat{u}_h, \hat{u} - I_h \hat{u} + I_h \hat{u} - \hat{u}_h) \\ &= \alpha a(\hat{u} - \hat{u}_h, \hat{u} - I_h \hat{u}) && \text{par orthogonalité de Galerkin en prenant } v_h = \hat{u}_h - I_h \hat{u} \\ &\leq \alpha |\hat{u} - \hat{u}_h|_1 |\hat{u} - I_h \hat{u}|_1 && \text{par continuité} \\ &\leq \alpha \|\hat{u} - \hat{u}_h\|_1 \|\hat{u} - I_h \hat{u}\|_1 \end{aligned}$$

Ainsi

$$\|\hat{u} - \hat{u}_h\|_1 \leq \alpha \|\hat{u} - I_h \hat{u}\|_1$$

Finalement en utilisant l'inégalité d'interpolation, on obtient

$$\boxed{\|\hat{u} - \hat{u}_h\|_1 \leq \alpha h^k \|\hat{u}\|_{k+1}} \quad (2)$$

2 Partie 2 : norme L^2

On applique la méthode de dualité d'Aubin-Nitsche. On considère le problème dual :

Soit $\hat{z} \in H_0^1(\Omega)$ solution du problème

$$\begin{cases} -\Delta \hat{z} = \hat{e}_h & \text{dans } \Omega \\ \hat{z} = 0 & \text{sur } \Gamma \end{cases}$$

avec $\hat{e}_h = \hat{u} - \hat{u}_h$. Alors

$$a(u, v) = - \int_{\Omega} \Delta u \cdot v = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v$$

et comme $e_h \in H_0^1(\Omega)$

$$a(\hat{z}, \hat{e}_h) = \int_{\Omega} (-\Delta \hat{z}) \cdot \hat{e}_h = \int_{\Omega} \hat{e}_h^2 = \|\hat{e}_h\|_0^2 \quad (3)$$

De plus, par les propriétés de régularité :

$$\hat{z} \in H^2(\Omega) \quad (4)$$

et

$$\|\hat{z}\|_2 \leq \alpha \|\hat{e}_h\|_0^2 = \alpha \|\hat{u} - \hat{u}_h\|_0^2 \quad (5)$$

Ainsi

$$\begin{aligned} \|\hat{u} - \hat{u}_h\|_0^2 &= \|\hat{e}_h\|_0^2 \\ &= a(\hat{z}, \hat{e}_h) && \text{par 3} \\ &= a(\hat{z} - I_h \hat{z}, \hat{e}_h) && \text{par orthogonalité de Galerkin} \\ &\leq \alpha \|\hat{z} - I_h \hat{z}\|_1 \|\hat{e}_h\|_1 && \text{par continuité} \\ &\leq \alpha h \|\hat{z}\|_2 \|\hat{e}_h\|_1 && \text{par 4 et par inégalité d'interpolation} \\ &\leq \alpha \cdot h \|\hat{z}\|_2 \cdot h^k \|\hat{u}\|_{k+1} && \text{par 2} \\ &\leq \alpha h^{k+1} \|\hat{u} - \hat{u}_h\|_0 \|\hat{u}\|_{k+1} && \text{par 5} \end{aligned}$$

Finalement

$$\boxed{\|\hat{u} - \hat{u}_h\|_0 \leq \alpha h^{k+1} \|\hat{u}\|_{k+1}} \quad (6)$$

3 Partie 3 : Conclusion avec 1

On veut maintenant démontrer 1 :

$$\|C - C_h\|_0 \leq \alpha h^{k+1} \|C\|_{k+1} \|\hat{\phi}\|_0$$

On a

$$\|C - C_h\|_0 = \left\| \frac{\hat{u} - \hat{u}_h}{\hat{\phi}} \right\|_0$$

Comment continuer??