Abstracts

1 Semaine 1:06/02/2023 - 10/02/2023

Pendant cette première semaine, j'ai du me familiariser avec le code "phifem" écrit par Vincent Vigon et les codes de génération des données fournit par Killian. L'idée étant de comprendre comment générer les données avec FEniCS pour ensuite les faire apprendre par un FNO. Après la réunion du 07/02, il semblerait que le sujet du stage porte sur l'entrainement d'un FNO puis la correction/certification des prédictions.

2 Semaine 2: 13/02/2023 - 17/02/2023

(Les résultats en semaine 1 ont été obtenus en début de semaine.)

Après la semaine dernière, on s'est dit qu'une bonne idée serait de prendre une solution manufacturée (analytique) afin de pouvoir comparer les erreurs avec FEM classique, PhiFEM, le FNO et le FNO+correction. On a choisi de prendre u comme une gaussienne et ainsi le f associé. Attention, il a fallut normaliser les F pour le FNO. On a également eut l'idée d'utiliser une solution sur-raffinée (à la place d'une solution exacte) mais ça n'a pas encore été testé.

3 Semaine 3:20/02/2023 - 24/02/2023

Pour cette semaine, on considère une nouvelle solution analytique (solution trigonométrique : $\sin * \cos$). Avec cette nouvelle solution, on va pouvoir prendre g différent de u_{ex} sur Ω comme souhaité pendant la semaine précédente.

A défaut de pouvoir faire tourner les entrainements (car plus d'units dispo sur colab) et en attente d'une solution avec v100, on va s'intéresser uniquement au problème de correction où on prendra comme $\bar{\phi}$ notre u_{ex} (-g si non homogène). En lui donnant comme nouvelle levelset notre solution exacte, C doit être très proche de 1 (à l'erreur machine).

4 Semaine $4: \frac{27}{02}/\frac{2023}{2023} - \frac{03}{03}/\frac{2023}{2023}$

On cherche à comprendre les problèmes d'interpolation de phi dans le cadre de la correction sur la solution exacte du problème de poisson avec condition de dirichlet homogène. Après la réunion du 28/02 avec Emmanuel et Vanessa, les points suivants sont à traiter :

- tester avec solution analytique + perturbation!
- enlever les termes de stabilisation afin de voir si le problème est dans la dérivée seconde de phi
- visualiser le ϕ et le ϕ' EF et le comparer au ϕ et ϕ' analytique
- comprendre le problème du extrapolate

Après la réception d'un ordinateur, on a passé la moitié de la semaine à essayer d'installer ce dont on avait besoin. En fin de semaine, les installations ont enfin été faite et je peux maintenant générer des données et entraîner le modèle sur ce nouveau PC.

5 Semaine 5:06/03/2023 - 10/03/2023

Pendant cette semaine, on a globalement cherché à comprendre les problèmes liés à l'interpolation de ϕ . On s'est donc concentré sur la précision de la correction lorsque l'on prend la solution analytique en entrée. On a testé avec deux solutions analytiques : la solution trigonométrique considérées précédemment et une solution polynomiale. La partie où l'on va utilisé le FNO sera considéré dans un second temps.

6 Semaine 6: 13/03/2023 - 17/03/2023

Après les tests de la semaine dernière sur la partie de correction/certification du modèle où l'on prend la solution analytique comme nouvelle level-set, il semblerait que la méthode avec les meilleurs résultats soit celle où l'on utilise la méthode extrapolate de FEniCS. C'est pourquoi, cette semaine on s'est intéressé en détail au code source de cette fonction FEniCS (Extrapolation). Étant donné que je n'étais pas présente mardi, mercredi après-midi et jeudi car j'étais malade, c'est tout ce qui a été fait cette semaine. De plus, une grosse partie de la méthode reste encore floue : la construction de la matrice A (pour la résolution du système linéaire dans compute_coefficients).

7 Semaine 7: 20/03/2023 - 24/03/2023

Lundi : Après discussion avec Michel des résultats obtenus les semaines précédentes, on a décidé de se concentrer sur la comparaison des erreurs PhiFEM, FNO et avec la correction (avec la méthode extrapolate de FEniCS). On a également parlé d'entrainer le modèle avec des données plus fines (nb_vert=128). Sur ma machine, ça n'a pas été possible (OOM : Out Of Memory). Je me suis donc connectée à Titan sur lequel l'entrainement a également crashé (Noyau mort). Je pense que le problème vient de l'installation de tensorflow (car j'ai cloné sur Titan l'environnement conda phifem) : il faudrait tester d'installer htop pour voir si la RAM est pleine. C'est un problème qui est mis de côté pour l'instant.

Mardi : Après discussion avec Michel et Emmanuel, Emmanuel a proposé de regarder les facteurs de division d'erreur sur la solution analytique pour différents \mathbb{P}^k . (Ensuite, on a une réunion d'équipe sur les FNO) Puis, une fois ces résultats obtenus, Michel a proposé de vérifier les pentes de convergence au niveau de l'interpolation de la level-set et sur la correction. Il a également proposé une nouvelle idée pour faire en sorte que la correction soit moins couteuse que PhiFEM classique : On entraine le réseau en $32 \times 32 \mathbb{P}^2$ puis on applique la correction sur du \mathbb{P}^1 puis on compare les erreurs (PhiFEM, FNO et FNO+Corr).

Pour le reste de la semaine, on s'est alors concentré sur cette nouvelle idée pour le FNO. La première complexité a été de pouvoir faire le passage d'une solution \mathbb{P}^2 de Numpy à FEniCS et de FEniCS à Numpy. Au vue des résultats obtenus sur la solution analytique trigonométrique, on pense qu'il est possible que les données soient "trop simple" (ne varie pas assez) pour que la correction ait un intérêt. En effet, il semblerait qu'un entrainement de seulement 500 époques nous donnent déjà de très bons résultats avec le FNO. La correction a alors du mal à corriger la solution obtenue par le FNO car elle est déjà très bonne. Pour justifier cette hypothèse, on choisit de changer le problème considéré : on repasse à Poisson avec condition de Dirichlet homogène où on prend f gaussienne. Comme l'on a pas de solution analytique pour ce problème, on considérera une solution sur-raffinée comme solution de référence.

8 Semaine $8: \frac{27}{03}/\frac{2023}{2023} - \frac{31}{03}/\frac{2023}{2023}$

L'idée principale de la semaine et de tester de rehausser la solution. Deux méthodes ont été proposées : rehausser par une constante m (proposée par Emmanuel) ou rehausser par la level-set initial ϕ (proposée par Michel).

J'ai également essayé de faire des boxplots pour comparer FEM standard, ϕ -FEM, FNO et FNO+Corr (pour différents nombres d'époques).

9 Semaine 9:03/04/2023 - 07/04/2023

Après les résultats obtenus avec le FNO, on va essayer de comparer les temps d'exécution et les erreurs obtenus pour FEM, Phi-FEM, le FNO et le FNO+corr à différentes époques.

Après discussion avec Emmanuel, on va considérer une level-set du type $\tilde{\phi} = u_{ex} + \epsilon * P$. On va tester le rehaussement avec FEM puis avec PhiFEM pour différents m sur cette solution perturbée. (Vendredi est férié)

10 Semaine 10: 10/04/2023 - 14/04/2023

(Lundi est férié)

Après discussion avec Michel et Emmanuel mardi matin, on a discuté de quelques points qu'il faudrait traité suite aux résultats obtenus avec PhiFEM :

- On garde la fonction $\phi_c(x,y) = ||x-0.5||_{\infty} 0.5$ pour construire les ensembles utilisés par PhiFEM. On utilise la levelset suivante pour PhiFEM: $\phi(x,y) = x(1-x)y(1-y)$.
- On effectue les courbes de convergence de PhiFEM sur le carré et sur le cercle pour ce problème. On étudiera également les erreurs d'interpolation.
- On cherchera ensuite à comparer les résultats FEM et PhiFEM. En effet, la semaine dernière on a considéré le même problème pour les deux méthodes mais les résultats obtenus sont très différents.
- Pour finir, Michel a proposé une analyse pour la sortie du FNO: la décomposition en série de Fourier de la solution (ce qui nous permettrait de déterminer dans lequel des cas on se trouve, parmis ceux observés sur la solution analytique et ainsi d'avoir une idée de la forme de la perturbation en sortie du FNO). Problème: Je ne comprends pas ce qui nous garantit que l'on peut faire cette décomposition, la sortie n'est pas forcément périodique!

On a également remarqué qu'il faut penser à prendre un epsilon de tolérance pour la construction des espaces (car si la la levelset se situe exactement à l'intersection de deux cellules il peut y avoir des problèmes d'arrondis).

11 Semaine 11: 17/04/2023 - 21/04/2023

Après discussion avec Emmanuel vendredi 14/04, les points suivants vont être traités cette semaine :

- On cherchera dans un premier temps à comprendre pour quoi FEM n'a pas l'air de fonctionner aussi bien que PhiFEM en prenant $f = f_p$ et en faisant varier ϵ .
- On va ensuite tester le rehaussement avec FEM et PhiFEM avec la solution exacte (sans perturbation, $\epsilon = 0$).
- On ecrira ensuite les formulations pour le rehaussement avec PhiFEM "au propre".
- On testera ensuite d'appliquer les conditions limites pour PhiFEM différemment : on les impose de manière forte sur notre bord approché Γ_h .

(Cette semaine, Michel est en vacance.)

12 Semaine 12:24/04/2023 - 28/04/2023

Cette semaine, j'ai corrigé certains des problèmes obtenus la semaine dernière. Les bons résultats sont présentés en semaine 11. J'ai également rédigé un document expliquant l'intérêt du rehaussement.

13 Semaine 13:01/05/2023-05/05/2023

On considère le problème de Poisson avec condition de Dirichlet homogène ou non homogène :

$$\begin{cases}
-\Delta u = f & \Omega \\
u = g & \Gamma
\end{cases} \tag{\mathcal{E}_1}$$

On a ainsi une EDP que l'on souhaite résoudre sur un domaine Ω . On note Γ le bord de Ω , c'est-à-dire $\Gamma = \partial \Omega$. Dans notre cas, on souhaite appliquer une correction à la sortie d'un FNO. On considère ici que l'on possède une solution analytique u et qu'après une utilisation du FNO, on obtient une solution du type

$$\tilde{\phi}(x,y) = u_p(x,y) = u(x,y) - \epsilon P(x,y)$$

avec P la perturbation (tel que $P = 0 \operatorname{sur} \Gamma$) et ϵ petit.

Ce document a pour but de comparer deux méthodes de correction de la solution obtenue.

14 Semaine 14:08/05/2023 - 12/05/2023

On souhaite faire fonctionner le rehaussement avec PhiFEM en utilisant la méthode duale. On commencera par faire les courbes de convergence puis on comparera pour différent cas tests, les erreurs en norme L^2 des méthodes suivantes : Φ -FEM par méthode directe, Φ -FEM par méthode duale, Correction par multiplication sans rehaussement, Correction par multiplication avec rehaussement par méthode duale, Correction par addition.

Après discussion avec Emmanuel, il semblerait que les résultats obtenus pour $\tilde{\phi}$ de degré 2 ne soient pas aberrant. On va alors continuer les tests sur le FNO en lui appliquant les mêmes méthodes de correction que celles testées sur la solution analytique.

Après relecture du document sur le rehaussement par Michel, il m'a demandé de faire la théorie sur l'erreur d'interpolation mis dans le document pour le rehaussement (inégalité 7 qui m'avait été dite par Emmanuel). Jeudi, on a alors discuté de ça avec Michel et vendredi j'ai alors relu ce que Michel avait fait pour essayer de bien comprendre.