

OTTH.

—
ICONES

FUNGORUM

8

HYDNEEN

TELEPHOREEN

GLAVARIACEEN

TREMELLINEEN

K.

Q 1



Otth.

Icones Fungorum

VIII (1855-890)

Hymenomycetes

Glycineen, Telephoreen, Clavariaceen
u. Tremellineen

(Geordnet nach Fries Hymenomycetes europei 1874)



255



Hydnellum subquamosum. Batsch

Sess. m. g. t. 21.

256



Hydnellum infundibulum. Swartz

Sess. m. g. t. 20.



Hydnellum rufescens · Schaeff.

Bott. 5. 89.



Hydnellum suaveolens. Scop. Wohlriechender Stachelchwamm.

no. 101

257

258



Hydnellum coeruleum. Fr.

Pl. Dan. T. 1374.

Hydnellum aurantiacum
Lippsii 23. & 36.

360



Hydnellum aurantiacum. Alb. & Schw.

Helsingborg.

260



Hydnellum aurantiacum. alb. & schw.

Fl. Dan. T. 1439

261



Hydnellum ferrugineum. f. Rostbrauner Stachelschwamm.

n. Bull. T. 409.

762



Hydnellum spadiceum. Pers.

Heimbergwald.

763



Hydnellum cinereum. Bull.

Bull. - T. 419.



Hydnellum velutinum. Fr.

Dammthaariger Stachelchwamm.

n. Bull. T. 453.

765



Hydnellum jonatum. Battch.

Battch. f. 224.

Hydnomyces cinnabarinus Batsch
B. f. 92 & 93.



Hydnomyces cinnabarinus? Batsch
(ist nicht *Hydnum tomentosum*)

im Sohlrüttewald, bey König.



Hydnum nigrum. Fr.



Hydnellum nigrum. Fr.

Heimbergwald.




Hydnellum graveolens. Delast.

im Heimbergwald



(*Hydnellum cyathiforme* Bull.) *Becherförmiger Stachelschwamm.*
Hydnellum serotinum. Fr.


n. Bull. T. 156.



ad gallofoune?
Hydnellum tomentosum. L. *Filziger Stachelschwamm.*

4. Harpe

771



Hydnellum coralloides. Scop.

Bremgartenwald.

772




Hydnellum Capit-medusae. Bull.

Bull. f. 412

1812 n. 1st

Fl. Dan. 1. 1789.


773



Hydnellum minutum. Schum.

Fl. Dan. 1. 1789.

774



Hydnellum cinnabarinum. Pers.

Fl. Dan. 1. 1789.


775



Hydnellum membranaceum. Bull. Häutiger Stachelchwamm.

n. Bull. S. 481.

776



Hydnellum ferruginosum. Fr.

an faulen Tannenhölz, im Scherben-Wald.

Gastromyces Roseoflavis.

Fr. Epix. o. 516 p.

377



Hydnellus aureum. Fr.

Beim Siechenhaus in einem abgestorbenen Apfelbaum.
Juli Wallau im September.

378



Hydnellus bicolor. Abb. a Schw.

Sturm's Flora.

n. Sturm


779



Hydnellum niveum. Pers.


nees Syst. f. 246.

280



Hydnellum farinaceum. Pers.

Fl. Dan. T. 1375.



Sistotrema confluens. Pers.

Zusammenfliessender Rissblattschwamm.

in Bull. F. 453.

7816₄





Sistotrema confluens. Pers.

am Hartlebury,
bei Helford.



Trichaptum canescens. Fr.

282



Radulum orbiculare. Fr.

Bell. p. 537.
T. 337 a. Bell.

283



grav. J. 278.

784


*Radulum molare. Fr.*

P.M.E.T. 22.f.1.

784 G 4




Fructification somewhat
worn & dark in Hymenomyceles 139.

*Phlebia merismoides. Fr.*

grav. T. 280.


285



Grandinix crustosa. (Hydnus. Pers.) Fr.

Nees Syst. f. 247.

286



Odontia Barba-joris. (Hydnus. Bals) Bart-odontie. Fr.

n. Bull. 481.2



Mucronella fascicularis (L.) Sacc. & T. p. 629
(Hydnellum fasciculare, all. a Schw.)

im Schätzwalde bei König.

288
6



Craterellus lutescens. (Merul. Pers.) Fr.

Bolh. I - 105.

289 0



Craterellus lutescens. (Merul. Pers.) Fr.

Pet. M. E. T. 13. f. 1.

289 1/2



Craterellus lutescens. (Merul. Pers.) Fr.

Batsh f. 36.

290



Craterellus ocreatus. Pers.

Pers. m. E. f. 13. f. 2.

791



Craterellus crispus. (*Helvella*, Bull.) Fr.

Bull. f. 465.

T 465

792



Craterellus clavatus. (*Merulius*, Pers.) Fr.

in den Wäldchen zwischen Bölingen & Göppingen im August.

Thelephora. Merisma.

793

Berl. Mitteil. 1868 p. 38.

Pl. 24.



Thelephora pallida. Ott, pallida, Willd.

im Hl. Dreingartenwall, im September.


794



Thelephora radata. Ach.

Nees Syst. f. 250.

795




Thelophora anthocephala. (Bull.?)
Sub?

Bull. T. 452.1.

T. 453. Bull.

796



Thelophora coralloides. Fr. Korallen-Wasenpilz.

n. Bull. T. 452.2

297



Thelophora mycetophila. Pers.

Bull. 3. 482.
5. 482 m. Ruy

298



Thelophora terrestris. Ehrh.

nees Syst. f. 251.

799



Thelyphora laciniata. Pers.

Fl. Dan. t. 1198.

799^a



Thelyphora laciniata. Pers.

Linnæus Spec. Pl. de Junc.

Bol. T. 173.


799 9



Thelphora laeviska, Pers.

im kleinen Brüngartenwald.
an der Lide.

800



Thelphora biennis. Dec:



Bull. f. 436.
f. 436. 1. 1. 1.



Thelephora cristata. Fr. (Menimadum) Kammförmiger Warzenspilz.

Pl. 415 f. n. Bull. T. 415. 1.

802




Thelephora sebacea var. *meridionalis*. Pers.

Pl. Dan. T. 1302.



Stereum purpureum. Fr.

gef. auf der Hl. Schäfe, an einem alten Stamm von
Salix caprea in September.



Stereum purpureum. Fr.
Thelephora purpurea. Pers.

Purpurfarbiger Wurzelpilz.

Persoon. 1801
T. 24. f. 28. 131

805



Stereum lilacinum. Pers.

Ballich. f. 131.

805^b



Stereum lilacinum. Pers.

im Bremgartenwald, an einem kläffterholz.

Novemb. 1853.

Glechoma
S. 26. S. 27.
Notopag. 24. & 25.

805^c



Stereum lilacinum? Pers.

im Brengartenwald an buchenem Klafterholz. Novemb.

806



Stereum hiscetum. (Willd: Thelph:)

Bull. T. 274.
7. 275. 28. 29.




Stereum spadiceum. (Pers. Thelph.) Fr.

Bull. T. 483. f. 5.

9.483. 1.5. 1. Bull.

807 6 3




Stereum spadiceum. (Pers. sub Thelph.) Fr.

im Wylerholz, am Fichtenrinde.

807^c



Stereum spadiceum. (Pers: sub Tholephi) Fr.

an liegenden Eichstämmen, bei Bern.

807^d

Stereum spadiceum. (stata obsoleta) (Pers) Fr. ?

auf den kleinen Schanze, an einem alten eichenen Posten.



Stereum Sanguinolentum. (alt. a Schw. sub Thelph.)
(Stabre violets)

an hauenden Balken, bei Bern.

808 1/2



Stereum Sanguinolentum. (Alba Schw. sub Thelph.) Fr.

bei Bern, an Tannenhölz.

809



Stereum ferrugineum. (Bull. sub auriculata)

Bull. T. 378.
T. 378. n. 3142

810



Stereum rugosum. (Schrad. sub Theloph.) Linn.

im Bremgartenwald, an Eichenholz.



Thelephora rubiginosa, Schrad.

Stereum rubiginosum, Link.

an einer alten Eiche im Brengartenwald. im October.



Stereum tabacinum. (Pers. Thaloph.) Fr.

an Haselzästen, am Lingenberg.



Stereum avellinum? Fr.

an Buchenholz, im Brüngartenwald



Stereum Disciforme. (Acc. Schizoph.)

Brüngartenwald.

pag. 25.



Stereum rugosum. (Pers.) Fr.

an alten Fichtenstöcken im Bremerholzwald.



Stereum abietinum (Schaeffler) Fr.
Skelet. 57.

an alten Tannenstöcken, im Engewald.

Mittheilungen 1868 pagg. 39

816

Nat. pagg. 52.



Stereum fulvidum, vth.

im Bremgartenwald, an abgefallenen
Buchenästen.

Mittheilungen 1857, p. 40.

817

Nat. p. 25



Stereum fuscо-olivaceum, vth.

ein ausgewachsener Pilz.

in Marzichli; an altem Tannenhag.

Nat. f. 25.



Stereum fuscopurpureum, Ott.
ein junger Pilz.

in Marfield by Dorn, am Tannenholz. - Junr.

Auricularia mesenterica

Phaeophora - Lab.

H. 2000. L. 1500. B. 500. H.

Nob. Bag. 25.



Auricularia mesenterica. Pers.

In der Enge bey Bern, an einer alten Esche.
Im November.



Auricularia mesenterica. Pers.

Wogenwohnbreche. 10 cm.



Corticium amorphum. Pers.

am Längenberg

822 724

Z. 16. p. 263.



Corticium quercinum. (Pers. sub Rebph.)

Bull. S. 436. f. 1.

No. 436 f. 1. a. Bull.

823



Corticium Mougeotii. Fr.

Im Bannwald bei Stoffelsburg.
im sogenannten Heimbergwald bey Schattweger.
an Zweigen von Weißkämmen.



Corticium incarnatum. Fr.


Pl. Dan. 5. 2035 f. 2.

824^b



Corticium incarnatum. Fr.


in der Enge bei Bern.
auf Eschen-Rinde.



Corticium maculiforme. Fr.

H. Dan. T. 1738. f. 2.

826



Corticium pubaneum (L.) Eger Ed. II.
(*Thelephora pectenaria*, Schum.)

H. Dan. T. 2035. f. 1.

827



827

Corticium Sambuci. Pers.

Grav. T. 242.



Cyphella muscigena. Fr.

Das. m. E. T. J. f. 6.

829




Cyphella galeata. (Schlecht. sub Menck.) Fr.

Fl. Dan. T. 2024. f. 1.



Cyphella muscicola. Fr.

Pl. Dan. T. 2083. f. 2.



Cyphella capula. (Holmsk.) Fr.

Pl. Dan. T. 1970. f. 3.



sulfurea Gr. Epix. 2. L.

(*Cypella Campanula*. Fr.)
(*Pesia Campanula*. Batsch)

Batsch. f. 146.


833



sulfurea Gr.


Cypella Campanula. Fr.
(*Pesia Campanula*. Batsch.)

Nees syst. f. 295.



Cyprella Goldbachii. (Weinm.) Fr.

Chaetocypha variabilis.
Corda in Sturm's Flora. T. 6



Cyprella Hoffmanni. Tul.
(oliorum
Peziza anomala. Pers.)

In der Enge, an Schenholz.



Clavaria amethystina. Bull.

Nees Syst. f. 151.



Clavaria amethystina. Bull. Amethyst = Heulenträger



Clavaria fastigiata. Linn.

Fl. Dan T. 836.



Clavaria muscoides. Linn.

Fl. Dan T. 775



Clavaria cinerea. Bull.

Quer. T. 64.


840



Clavaria rugosa. Bull.

Bull. T. 115.

840 b,



Clavaria rugosa Bull. Rundeliger Heulenträger

n. Bull. 448. 2.

841



Clavaria pyxidata Pers.

Pl. Dan. T. 1304.



Clavaria abietina. Schum.

Fl. Dan. 6 - 2030. f. 2.

843



Clavaria stricta. Pers.

Fl. Dan. 6 - 1302.



A
Clavaria



B.
el. Kunzei?

A. *Clavaria crispula*, Fr. gekräuselter Heudenträger.
B. *Clavaria Kunzei*, Fr. Kunze's Clavaria

n. Bull. 358.



Clavaria byssiseda, Pers.

Clavaria *purpurea*

846




Clavaria purpurea Fr.

die Farbe scheint nicht ganz richtig für sagen,
dass aus dem purpureum ins bläuliche
Ringeln öffnen, ist aber in Fl. Dan. so wie
hier abgebildet und colorirt.

Fl. Dan. T. 834.

Clavaria rufa

847



Clavaria rufa Fl. Dan.

Fl. Dan. T. 775. 25



Clavaria fusiformis. Sow.

Bol. T. 110.



Clavaria argillacea, Pers. Thonfarbiger Heulenträger.

n. Bull.

851 6/4



Clavaria argillacea, Pers.




Clavaria vermiculata. Scop.

n. Dr Brunn. — Wylerholz, am Waldsee.



Clavaria fragilis. var. *granulata*. Holmst.

Bolton T. III. f. 1.



unreinlich colorirt, so sie mehr rotbraun weiß zeigen.

Clavaria fragilis ^{Holmst.} var. *Glindrica*. zerbrechlicher Kaulenträger.



Clavaria ligula. Schöff.


Pl. Dan. T. 837.

855



Clavaria contorta. Holmsk.

Pl. Dan. T. 1852.



Clavaria fistulosa. Fl. Dan.

Pl. Dan. T. 1256.




Clavaria juncea. Fr.



Fl. Dan. T. 1257.


857 b₃



Clavaria juncea. Fr.

Bull. T. 463. H

463 Ha. Bill.



Clavaria canaliculata. Fr. Röhrliger Heudenträger

n. Bull. f. 496. L.M.

858 6/



Clavaria canaliculata. Fr.


Bolton T. 110.



Clavaria mucida . Pers.

Fl. Dan. 1376.

860




Clavaria uncialis. Grev.

Grev. T. 98.



Calocera furcata Fr.

Pl. Dan. T. 1305.




Calocera cornea Fr. Hornartiger Hornträger




Calocera corticalis. Fr.

Batsch. fig. 162.




Typhula erythropus. Fr.



Typhula erythrops. Fr.

Doll. T. 112.

866



Typhula erythrops. Fr

Grev. T. 43.



Typhula villosa. Fr.

Fl. Dan. T. 1968.



Typhula incarnata. Lásch.

Gren. T. 93.



Typhula gyrans. Fr.

Batah f. 164.



Typhula muscicola. Fr

Rees Syst. f. 154.



Typhula *grevillei*. Fr.

Sturms H. Vol. 3, T. 25.

Vol. 3, T. 25, in Sturm.

Typhula


Fr. 871 b

871 b



Typhula *grevillei*. Fr.

Grev. T. 49



Typhula filiformis Fr. Fädenförmigen Holzenträger.

Bull. 448. 1.


873



Metula phaeocystis
Pistillaria sclerotioide? Fr.

Sens: Myc. Scr.: T. XI. fig. 1, 2.

824




- *Sistillaria coccinea* (Corda) Fr. -

Sturm H. Vol. 3. T. 27.

Vol. 3. T. 27. in Sturm.

825




Sistillaria diaphana. Fr.

Pl. dae. 5. 1783.




Tremella fimbriata. Pers. gefranste Tremelle.

n. Bull. J. 272




Tremella frondosa. Fr.



Tremella foliacea. Pers


Bull. F. 406. A
406. A

879




Tremella lutescens. Fr. Gelbliche Tremelle

Bull. 406. c.




Tremella mesenterica. Reff. *Mesenterium-Tremelle*

n. Bull. P. 14.



Tremella albida. Huds. *Weißliche Tremelle*

386.A. n. Bull. P. 386.



Exidia recisa Fr.

abgeschnittener Lappenspätzl.


n. Bull. T. 460.

882^b



Exidia recisa. Fr.

Dittrich. in Stirnitz's Fl. T. 13.



Exidia glandulosa. Fr. Drüsiger Lappenspug.

n. Bull. S. 4 20. 1.



Exidia saccharina. Fr.

Bannwald.
der Haardbrüing



Exidia repanda. Fr.

Bremgartenwald.



Xerneola ex epicor II
Exidia auricula-judae. (From: Linn.) Fr. Judasohr.
Suriculacia sambucina Mart.

A. Hafner.

886b



Xerneola ex epicor. II.
Exidia auricula-judae. (Tremella, Linn.) Fr.
Suriculacia sambucina Mart.

an Holländischen Sträuchern bey Berlin.

Holz-Pag. 258-34.



Gymnopeltis helvellorides.^{Fr.} Helvellaceartige Gepfimie.
frische Laubbäume

in Holzrinde
gefunden auf neu brüschtem Stoff.


888.



Dacryomyces (Tortn.) deliquescentes (Bull.)

holziger Stoff.


nach Bulliard S. 455.



Dacrymyces roseus. Fr.

Bull. f. 455. f. 2.

890.



Dacrymyces stillatus. Nees.

Gro. f. 159.