

OTTH.

ICONES

FUNGORUM

7

POLYPOR.

POLYPORUS 2

- Solenia

K.

Q 1

Oth

Icones Fungorum

VII (1852-1854)

Hymenomycetes

Polyporeen

Polyporus 2 - Solenia

(geordnet nach Tries Hymenomycetes europei 1824)






Polyporus heteroclitus. (Boletes. Bolton.) Fr.


Bolt. F. 164.

653




Polyporus salignus. Fr.

a. Postelov in Sturm fl.




Polyporus epilucus. Fr.

Fl. Dan. T. 1794.




Polyporus nephroleucus. Fr.

n. Rostkov. T. 26
in Stevni Flora




Polyporus alutaceus. Fr.

in Postföhren in Sturm's Fl.
F. 30.



Polyporus testaceus. Fr.

Postföhren in Sturm's Fl. IV. 36.



Polyporus chioneus; var. stipitata. Fr.

Sors. M. E. F. 15. f. 4, 5.

659



Polyporus lactens. Fr.

a. Postkorn in Sturm's Fl.
F. 23.



Polyporus cæsius. (Schrad. Boletus.) Fr.

Vari. *Pilosa intus rosea.*


angeflockten Tannen am Kletterholz. Bonn.

660⁴




Polyporus cæsius. (Schrad. Boletus.) Fr.

bey Steffisburg, an altem Tannenholz.



Polyporus caesius. (Schrad; Bats.) Bläulicher Stöckerschwamm.

gefunden am Studentenbach auf einem Balzen.
in Bern



Polyporus trabens. Rostk.



Polyporus Destructor. (Schrad. Boletus.) Fr.


n. Postillou in Stirps fil.
T. 27
sab. Bol. albuscii Schrad.

663



Polyporus croceus. Fr. (Boletus. Pust.)


n. Postillou in Stirps fil.



Polyporus nidulans. Fr.

Boletus subcrocatus.
Bull. S. 482.

665



Polyporus spongiosus. (Pers. *Boletus*.*s.*) Fr.

Bull. S. 165.



Polyporus albus. Huds.


Bol. salicinus.
Bull. S. 433. f. 1.

667



Polyporus fumosus. (Pers. Boletus) Fr.


gef. an einem eichenen Stoffen in Weitzenheim.



Polyporus adustus. Fr.

an Buchen, bei Bern. im September.

668^b



Polyporus adustus. Fr.


Im Engewald, an Buchen Stöcken.



Polyporus crispus. (Pers. Boletus.) Fr.

Batich f. 227.

670



Polyporus crispus. (Pers. Boletus.) Fr.

n. Stirps Flora T. 37.



Hutfleisch zu dünne und
die Poren zu lang, darüber auf weißer
Hautlage
Hut braun, Stiel weißlich


Polyporus dichrous.? Fr.

Bol. pelleporus.
Bull. T. 501. f. 2.



Polyporus dichrous. Fr.

672



forma securis adnotata.

Polyporus dichrous. Fr.

Im Marpali bei Bern,
an Fäulniss-Bäcklein.

673



Polyporus Kymatodes. Rostk.

n. Rostkov in Steans fl.
T. 24.

674



Polyporus amorphus. Fr.

Am garten, und an Rinde von alten Tannenstäcken.
im September.

674 63



ad *P. amorphus* Dr. Eng. VII
Polyporus roseo-porosus. Rosse.

n. Rosse. St. & C.
T. 12.



Polyporus cuticularis. (Bull.: Boletus) Häutiger Löcherschwamm.

n. Bull. T. 462



Polyporus borealis. Fr.

nach Fr. zweifelhaft



Polyporus borealis. Fr. Nordischer Löcherschwamm.

Im Drengartenwald, am Abhang gegen die Dracke.
im September.



Polyporus pubescens. (Schum: Boletus.) Fr.



Polyporus pubescens. (Schum. Boletin.) Fr.

— a. Posterior H. fl.



Polyporus Dryadeus. (Pers.) Fr.

Waldnymphen-löcher-schwamm.




Polyporus resinosus (Schrad. Boletus) Fr.

Fl. Dan. T. 1138.




P. resinosus Fr. Epice Ed II.
Polyporus rubiginosus. (Schrad. Boletus) Fr.

Gramfet




Polyporus erubescens. Fr.

n. Postillor. T. 25.




Polyporus betulinus (Bull.) Fr. Birkenlöchenschwamm.



Polyporus betulinus. (Bull.: Boletus) Fr.

St. Dan. T. 1254.

6849




Polyporus betulinus. (Bull.: Bolet.) Fr.

Holzporlinge. T. 1254

n. Roskow in Skandin Flora. T. 22


772



Polyporus reticulatus Pustk.
petalimus?

"*Rostkovia* Stevns Pl.
T. 22.

685




Polyporus officinalis (Batsch) Verchenschwamm.

n. Bull. T. 296.



Polyporus appplanatus. (Pers.) Fr.

gef. an Eichen und Buchen im Beengartenwald und
im Engewald, letzterer abgeholzt



Polyporus appplanatus. (Pers.) Fr.

im Hornisbergwald, an einem Buchenstock.



Polyporus appplanatus. (Pers. Bolites) Fr.



peron var. sub nomine Pol. appplanatus
var. appplanatus n. Rostkow in Sturm.
fig. 130 & Baltch. fig. 130.



Polyporus appplanatus?
Polyporus subg. luteus

noch granaer in bestimmen

n. Rostkow. F. 32
in Sturm's fl.



Polyporus fomentarius. (Linn.) Fr.

a. Sturms Flora T. 52.



Polyporus fomentarius. (Linn.: Boletus,) Fr.

Lent f. 45.

690



Polyporus nigricans. Fr.

Hesth. Sturm's Flora T. 51.

690 3



Polyporus ignarius (Linn.) Fr.

kräftiger Feuerschwamm.

6. Brd. T. 454.





Polyporus ignarius. (L.) Fr.

Unächter Feuerschwamm.

n. Bull.

691



Polyporus fulvus. (Scop.: Boletus) Fr.

gelb Traubenschwamm

n. Rostkörn. T. 31.

82 G. p. 467.

*Polyporus Ribis* (Boletus Schum.) Fr.

Geiß Fruchtkörper.

von Oberried am Längenburg.

693

*Polyporus Salicinus.* var. *respiratorius*. (Pers.) Fr.

an einem alten Weingashain, bei Bern.



Polyporus cinnamomeus. Frøg.

Bey Steffisburg an einem Kirschbaum.




Polyporus pinicola. (Swtz) Fr. Fichtenlöcherschwamm.

gefunden an einem kahlenen Baum entroge
am Fuße des Hugspaltenhügels.

W. W. S. 1800. Fr. Sp. 5. 1807.

Nat. pag. 26.



Solyporus pinicola. (Swärtz) Fr.

an liegendem Tannenholze, andes July beg. Thun.
im October.

W. W. S. 1800. Fr. Sp. 5. 1807.


Fr. Sp. 5. 1807.

Nat. pag. 26.



Solyporus pinicola. (Swärtz) Fr.

schattig und ganz auf Begrenzung
an einem tannenen Block, im Werthof des H. Werkmeisters König,
begm schwägerthor. - im October.



Polyporus marginatus. (Boletus, Pers.) Fr.

Rostk. in Sturm's Flora
vol. 3. p. 43.

698

Mittheilungen 1844, pag. 54: 2. fig. 2.

Fr. 1844. Zeichnung 1844.




Polyporus rufopallidus. Fr. Rothbrauner Löcherschwamm.

Fr. 1844. Zeichnung 1844.

Bey Brienzwiler an altem Tannenhof, im August.


3



Polyporus fraxineus. (Bull.) Fr. Eschen-Lochschwamm.

n. Bull. T. 433.

200




Polyporus castaneus. Fr.

Rostkof. in Sturm's Flora. T. 47.



Polyporus annosus Tr. Epca. Ed II.
 (Polyporus subpileatus. Weinm.)
 (Trametes subpileata. Fr.)

an lebenden Tannenwurzeln, im Wylerholz, im September.




Polyporus annosus Tr. Epca. Ed II.
 (Polyporus subpileatus. Weinm.)
 (Trametes subpileata. Fr.)

Im Steinholzklein und im Engewald, an alten Tannenwurzeln.
 im Herbst.

201^c

Aug. 1872.
Moltsag, 23.



Polyponus annosus (L.) Epic. Ed. II.

(Sohporus subpileatus, Weinm.)

Frametes subpileata, Fr.


Im Engewald in der Höhlung einer alten Buchenwurzel.

July

Wetzlar, Pfalz.

Foto p. 272.


202



Sohporus populineus. (Schum: Boletus.) Fr.

und jetzt Frametes populinae, Fr.

St. Gall. 1. 1791.



Polyporus radiatus. (Boletus Sow.)

100 Promileg.

Rostkov in Skiemstl. F. 48.


204



Polyporus eavidus. Fr.

an einem Weidenstamm bey dem Weiber am Brunnental.

im November.



205
Polyporus albidus. Frog.

Polyphorus albida. Fr.

Schaff. T. 124.

206



Polyporus hirsutus. (Schrad.) Brauhhaariger Löcherschwamm.

an einem Kirschbaum wachsen.


206^b

Polyporus hiscutes, var. (Schrad.) Fr.

im Engewald, an
Buchenstücken.


Polyp. fl.

207



Polyporus hiscutes? (Bolotus Schrad.)

Schnin nach. Bod. auf feucht,
liegendem Laubholz!





Solyporales zonatus (Rees)
Finsodas (Schrad.)

gespontener Löchershämm.


an einem Buchenwipfel
im Birchwald.

709



Polyporus versicolor (Linn.) Fr. Bunter Löchershämm.


Linn



710
Polyporus versicolor, (Bol., Ann.) Fr. Bunter Löcherschwamm.

Bremgartenwald.



211



Polyporus Stereoides,? Fr.

Rostock. Sturm's Flora Vol. 3. T. 46.


712



Polyporus abietinus (Dicks.) Fr.

Fl. Dan. T. 1298.

713



Polyporus fuscatus Fr.

Fl. Dan. T. 163.


214



Polyporus abietinus. (Dicks.) Fr.

Pl. Dan. T. 2079. f. 2.

215



Polyporus obliquus. Fr.

"Posterior in St. f. 1."



Polyporus ferruginosus. (Boletus Schrad.) Fr.



n. Posthorn in H. Fl.
III. 6.



Polyporus contiguus. Fr.

Its blauwe vorm was door
Diekhardt als exogen ge-


n. Posthorn in H. Fl.
III. T. 8.



818
Polyporus purpureus. Fr.

n. Prospur.


Fig



Polyporus incarnatus. (*Boletus. Pers.*) Fr.

Perd. m. E. T. 16. f. 4.


220



Polyporus rhodulus. Fr.

Bull. 8.442.

221



Polyporus nitidus. Fr.

Bull. in St. 63.

223



Polyporus subfuscus-flavidus (Bosc.)

P. elegans? *medulla* Pers.?

n. Prostskov in H. fl.
vol. VI. t. II.

223



Polyporus medulla panis. (*Boletus*, Pers.) Fr.

bei Kestenberg an altem Pappelholz.

723^b

im Engewald.


Polyporus Medullaformis (Bottm.) Fr.in der Schniggenen bey Steffelsburg
an alten Fannenstäckchen

724

*Polyporus vulgaris*? Fr.



bey Thier.

neukirchen gehörte der Georgfuer



Polyporus molluscus. (Boletus. Pers.) Fr.

Rostk. in Stirnse & Linn. vol. 3. T. 64.



Poren vergrößert

Polyporus molluscus. (Boletus. Pers.) Fr.

726




Polyporus reticulatus. (Boletus. Pers.) Fr.

Nees Syst. f. 225

Appendix L.


227



Polyporus apophylloides. (Boletus.)

a. Postston in St. Fl.
VI. T. A.

nol p. 21.




Polyporus laevis. sub.

An geschälten liegenden Säppelstämmen (Saarbäumen)
bij der Zulgrinde bey Thun. Im Herbst.



Trametes odorata. (*Boletus. Wulf.*) Fr.

in den Alpen
gefunden im Engewald



Trametes gallina Fr.



Polyporus cinnabarinus (Bol. Jacq.) Zinnoberothe Lücherschwamm.

J. F. Trametes cinnabarinus. F.

z. Biol. T. 501.


Hithellwigen 1850. pag. 52.

Koh. pag. 23.




Trametes trogii. Berk. Dodge's Trametes.

Zifunden bei den Zulubäumen bei Thun
an poppelhöhlen.



Trametes gibbosa. (Dadalea Pers.) Fr.

gef. im Engawald.




Trametes Bulliardii Fr. Bulliard's Gramete.



Trametes suaveolens. (*Boletus*, Linn.) Fr.


An einer alten Weide, bei Holligen. im September.



Trametes odorata. (Sowerb. Polyp.)

Wohlriechende Tramete.

an einem alten Baum von Salix caprea
auf d. d. Schäfe.




Trametes serialis. Fr.

olim *Polyporus*. Fr.

in Brumertonwall.

237^b




Polyporus serialis. Fr.

just *Trametes serialis*. Fr.

Postb. M. Sturm & Son T-49.

Trametes. Agen. ord. in
Mittteil. 1870 pag. 94.
Not p. 20. 398.



Trametes nivea Oth.

an feulen Tannenhölz, im Wylsholz.

Mittl 1870 pag 92
Not pag 80. 399

239



Trametes trabea ? Oth.

in den Wäldern bei Berlin
an liegenden Eichenstämmen.

Mitchell 1890 pag 92
Plat. 80, & 399

239^b



Trametes trabea. Ott.

Schingnach-Bad,
an faunen Balken.

Mitchell 1890 pag 92.
Plat. 80, & 399.

239^c



Trametes trabea. Ott.

anderthal bey Thun an liegenden Tannenstämme.

Mittheilungen 1865 p. 157.


240

not p. 55.



Trametes Secretaria, ouh.

an einem alten Pappelbaum, bey Sulgenbach.
im September.



Dædalia quercina. Pers. Eichen-Wirkschwamm.

Bremgartenwald.

Fri. Ep. p. 493.



Dædalia confragosa. Pers.


Bull. S. 491.
T. 491. Baker.

243

Fr. 90 p. - 194.

*Dædlea cinerea. Fr.*Bull. 8, 537.
1. 537. 1. 537.

244



Dædlea unicolor. Soro. *Einfarbiger Wirschwamm.*
var. *rufescens*

n. Bull. T: 408.



745



Dedalea ferruginea. Schum.

Bl. Dan. 1. 2029.

746



Favolus europeus. Fr.

Die obige Zeichnung ist eine Vergrößerung
eines kleinen Exemplars, das auf einer
zweijährigen Fichte gefunden wurde.
Ist ein flach doppelt gewölbt.

nach einem verkröpften Exemplar, aus Tepeln.



Merulius tremellosus. Schrad.


An einem alten Baumstumpf, im Marzicke.
Im November.

247 64



Merulius tremellosus. Schrad.
var. *albida*.

Königbergwald




Merulius corium. Fr.

Leder- oder Schwamm.

n. Bull. T. 402.


248



Merulius fugax. Fr.

Pl. Dan. T. 2027. f. 2.


250



Merulius rufus. Pers.

Pers. m. E. T. 16. f. 1, 2.

257



Merulius lacrymans. Schum.

Weissenheim beobachtet, in einer
feuchten Wälder.



Diplosolenia

Solenia fasciculata. Pers.

Méth. allestita. Cat. n° 96.



Solenia fasciculata. Pers.

Diplosolenia

Part. Mag. Eur. T. 12



vergrößert

Solenia ochracea. Hoffm.

in einer hohlen Linde, Bern.