

Problemas 1

Problemas 1

Unidades e análise dimensional

1. O tempo típico de uma aula é de 50 min. O físico Enrico Fermi notou que esse valor é uma aproximação de um microséculo.

a) Quanto é um microséculo em minutos?

b) Usando a expressão:

$$\text{percentagem da diferença} = \left(\frac{\text{valor real} - \text{aproximação}}{\text{valor real}} \right) \times 100$$

determine a percentagem da diferença (ou desvio relativo) da aproximação de Fermi.

[Sol.: a) 52.6 min; b) 5%]

2. Uma unidade astronómica (AU, do inglês *Astronomic Unit*) é a distância média da Terra ao Sol, aproximadamente 1.50×10^8 km. A velocidade da luz no vácuo é de 3×10^8 m/s.

Exprima a velocidade da luz em termos de AU/minuto.

[Sol.: 0.12 AU/min]

3. Os padrões de tempo são neste momento baseados em relógios atómicos. Um promissor padrão para o segundo são os *pulsars*, que são estrelas de neutrões (estrelas altamente compactas consistindo apenas de neutrões) que rodam. Algumas rodam a um ritmo extremamente estável, enviando um feixe de ondas de rádio que passa brevemente pela Terra uma vez em cada rotação, como um farol. O Pulsar PSR 1937+21 é um exemplo: roda uma vez em cada 1:55780644887275(3) ms (o último algarismo, entre parêntesis, representa a incerteza na última casa decimal).

a) Quantas vezes o PSR 1937 + 21 roda em 7.00 dias?

b) Quanto tempo demora a rodar 1.0×10^6 vezes?

[Sol.: a) 3.88×10^8 ; b) 1558 s]

4. A Terra é aproximadamente uma esfera de 6.37×10^6 m de raio. Qual é:

a) o perímetro do equador, em km?

b) a área da sua superfície em km²?

c) o seu volume em km³?

[Sol.: a) 40000 km; b) 5.1×10^8 km²; c) 1.08×10^{12} km³]

Problemas 1

5. A Antártida é aproximadamente semicircular, com um raio de 2000 km. A espessura média do gelo é de 3000 m. Qual é o volume, em cm^3 , do gelo contido na Antártida? (Ignore a curvatura da Terra)

[Sol.: $1.88 \times 10^{22} \text{ cm}^3$]

6. A Terra tem uma massa de $5.98 \times 10^{24} \text{ kg}$. A massa média dos átomos que compõem a Terra é de 40 u (u é a unidade de massa atômica). Quantos átomos há na Terra?

[Sol.: 9×10^{49}]

7. Estime quanto lixo doméstico é produzido em cada ano em Portugal, em litros. Para isso comece por estimar:

- a quantidade de lixo que produz em sua casa numa semana (considere, por exemplo, o número de vezes que vai levar o lixo e o volume de um saco de lixo);

- quantas casas habitadas existem em Portugal

[Sol.: $\approx 2 \times 10^{10}$ litros]

8. Os grãos das praias de areia fina do Algarve são aproximadamente esféricos com um raio médio de 50 μm , e são feitos essencialmente de óxido de silício. Um cubo sólido de óxido de silício com 1.00 m^3 de volume tem uma massa de 2600 kg. Qual a massa dos grãos de areia cuja área total (a soma das áreas dos grãos individuais) seja igual à área de um cubo de 1 m de lado?

[Sol.: 0.26 kg]

9. Uma pessoa de dieta perde 2.3 kg por semana. Exprima a massa perdida em termos de miligrama por segundo.

[Sol.: 3.8 mg/s]

10. Um centímetro cúbico de uma nuvem cumulus típica contém 50 a 500 gotas de água, que têm um raio típico de 10 μm . Nota: cumulus é a designação atribuída às nuvens de contornos nítidos, formadas a baixas altitude.

a) Qual é o volume, em m^3 , de água contida numa nuvem cilíndrica de 3.0 km de altura e 1.0 km de raio (assuma 50 gotas/ cm^3)?

b) Quantas garrafas de um litro encheria?

c) A água tem uma massa por unidade de volume (ou densidade) de 1000 kg/m^3 . Qual é massa da nuvem?

[Sol.: a) 1968 m^3 ; b) 1.968×10^6 ; c) $1.968 \times 10^6 \text{ kg}$]

Problemas 1

11. Discuta a questão: 150 metros é muito ou pouco? Antes de o fazer, faça as seguintes estimativas:

- a) Está no topo de um edifício de 150 m de altura. Dá-se um incêndio e é necessário descer pelas escadas, porque o elevador deixa de funcionar. Estime quanto tempo demoraria a descer até ao rés-do-chão.
- b) Está a passear num magnífico trilho no Gerês, durante o dia. Está numa zona plana do trilho. Quanto tempo demora a percorrer 150 m?
- (c) Está a conduzir um automóvel numa autoestrada, a 120 km/h. Encontra um sinal que indica o fim, a 150 m, da via de trânsito da esquerda, por onde circula. Quanto tempo tem para mudar para a outra via de trânsito?

12. Na América mede-se a eficiência de um carro dizendo quantas milhas este consegue fazer com um galão de gasolina (miles/gallon). Na Europa, a mesma informação é dada em termos de quantos litros de gasolina gasta para percorrer 100 km (litros/100 km). Escreva uma equação que permita fazer uma conversão fácil de um sistema para o outro.

[Sol.: $y = 235.21506/x$]

13. Uma escultora fez um modelo de uma estátua, e para isso precisou de 2 kg de bronze. Chegou à conclusão que, para dar duas camadas de verniz, bastava uma pequena lata de verniz. É suposto que a estátua final seja cinco vezes maior que o modelo em cada uma das dimensões. Quanto bronze é que vai necessitar? Quanto verniz deveria comprar?

[Sol.: 250 kg; 25 latas]

14. Sabemos por análise dimensional que se um objeto mantém a sua forma mas varia o tamanho, a sua área varia com o quadrado do seu tamanho e o volume varia como cubo do seu tamanho. Suponha que tem de administrar um remédio a uma criança doente. Já tomou esse remédio antes e sabe qual a dose adequada para si. Você tem 1.80 m de altura e pesa 80 kg, e a criança tem 0.90 m e pesa 20 kg. Estime a dose adequada para a criança.

[Sol.: entre 0.125 e 0.25 da dose do adulto]

15. Por análise dimensional, determine as unidades da constante de gravitação universal ($F = GmM/r^2$).

[Sol.: $[G] = L^3T^{-2}M^{-1}$]

16. Se a energia potencial gravítica depende da massa, da aceleração da gravidade e da altura a que está o corpo, determine por análise dimensional a sua equação.

[Sol.: $E \propto mgh$]