

Cap. 2– Cálculo Integral

M. Elfrida Ralha (eralha@math.uminho.pt)

M.Isabel Caiado (icaiado@math.uminho.pt)

novembro de 2017

Integrais em intervalos ilimitados



Integrais de funções ilimitadas

[MIEInf] Cálculo-2017-18

1 / 12

Motivação

- Qual a área limitada pela curva definida por $y = \frac{1}{x^2}$, quando $x \geq 1$?



- Qual a área limitada pela curva definida por $y = \frac{1}{(x-2)^2}$, quando $1 \leq x \leq 3$?

[MIEInf] Cálculo-2017-18

3 / 12

Integrais impróprios

- [Tipo 1] Integrais em intervalos ilimitados: sendo $a, b \in \mathbb{R}$

$$]-\infty, a] \quad \text{ou} \quad [b, +\infty[\quad \text{ou} \quad]-\infty, +\infty[$$

- [Tipo 2] Integrais de funções ilimitadas em algum ponto do intervalo de integração. Por exemplo

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{x} dx.$$

[MIEInf] Cálculo-2017-18

4 / 12

[Tipo 1] Integrais em intervalos ilimitados

- ▶ Seja f definida em $[a, +\infty[$ e integrável em qualquer intervalo $[a, b]$ com $[a, b] \subset [a, +\infty[$.

Define-se o **integral impróprio de f em $[a, +\infty[$** por

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx.$$

- Se o limite não existir, diz-se que o integral impróprio é **divergente**.
- Se o limite existir, diz-se que o integral impróprio é **convergente** e/ou que f é integrável em sentido impróprio.

Exemplo

- ▶ É divergente o integral impróprio

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx.$$

De facto,

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_1^t \frac{1}{x} dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} [\ln x]_1^t = \lim_{t \rightarrow +\infty} (\ln t - \ln 1) = +\infty.$$

- ▶ É convergente o integral impróprio

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx.$$

De facto,

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_1^t \frac{1}{x^2} dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_1^t = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{t} + 1 \right) = 1.$$

- ▶ Seja f definida em $] -\infty, b]$ e integrável em qualquer intervalo $[a, b]$ com $[a, b] \subset] -\infty, b]$.

Define-se o **integral impróprio de f em $] -\infty, b]$** por

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx.$$

- Se o limite não existir, diz-se que o integral impróprio é **divergente**.
 - Se o limite existir (for finito), diz-se que o integral impróprio é **convergente** e/ou que f é integrável em sentido impróprio.
- ▶ Seja f definida em \mathbb{R} e integrável em qualquer intervalo $[a, b]$ de \mathbb{R} . Define-se o **integral impróprio de f em \mathbb{R}** por

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx$$

com $c \in \mathbb{R}$ arbitrário, desde que os integrais do 2.º membro sejam convergentes.

- ▶ [Critério de comparação]

Sejam f e g contínuas em $[a, +\infty[$

- Quando $|f(x)| \leq g(x)$ para todo o $x \geq a$ tem-se

$$\int_a^{+\infty} g(x) dx \text{ converge} \implies \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ converge}.$$

- Quando $0 \leq f(x) \leq g(x)$ para todo o $x \geq a$ tem-se

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ diverge} \implies \int_a^{+\infty} g(x) dx \text{ diverge}.$$

Nota: Existem resultados análogos para os integrais impróprios $\int_{-\infty}^a f(x) dx$.

Exemplos

- ▶ Os seguintes integrais são úteis na aplicação do critério de comparação:

$$\bullet \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^r} dx \quad \begin{cases} \text{converge} & \text{se } r > 1 \\ \text{diverge} & \text{se } r \leq 1. \end{cases}$$

$$\bullet \int_0^{+\infty} e^{-rx} dx \quad \begin{cases} \text{converge} & \text{se } r > 0 \\ \text{diverge} & \text{se } r \leq 0. \end{cases}$$

Exemplo

- ▶ Determine, se possível, o valor de

$$\int_0^2 \frac{1}{(1-x)^2} dx.$$

- A função integranda está definida em $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.
- Assim, há que escrever

$$\int_0^2 \frac{1}{(1-x)^2} dx = \int_0^1 \frac{1}{(1-x)^2} dx + \int_1^2 \frac{1}{(1-x)^2} dx$$

- e estudar separadamente cada um dos integrais impróprios do tipo 2.
- Mas

$$\int_0^1 \frac{1}{(1-x)^2} dx = \lim_{t \rightarrow 1^-} \int_0^t \frac{1}{(1-x)^2} dx = \lim_{t \rightarrow 1^-} \left[-\frac{1}{1-x} \right]_{x=0}^t = \lim_{t \rightarrow 1^-} \left[-1 + \frac{1}{1-t} \right]$$

Como o limite não existe, este integral é divergente.

- Uma vez que um dos integrais do 2.º membro é divergente, o integral dado é divergente.

[Tipo 2] Integrais de funções ilimitadas

- ▶ Seja $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ integrável em $[a, c]$ com $[a, c] \subset [a, b[$ e **ilimitada** quando $x \rightarrow b$. Define-se o **integral impróprio de f em $[a, b[$** por

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow b^-} \int_a^c f(x) dx.$$

- ▶ Seja $f :]a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrável em $[c, b]$ com $[c, b] \subset]a, b]$ **ilimitada** quando $x \rightarrow a$. Define-se o **integral impróprio de f em $]a, b]$** por

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f(x) dx.$$

- Se o limite não existir, diz-se que o integral impróprio é **divergente**.
- Se o limite existir (for finito), diz-se que o integral impróprio é **convergente**.

Observação

- ▶ Para os integrais impróprios mantêm-se válidas as propriedades de linearidade e aditividade.
- ▶ Para os integrais do tipo 2 tem lugar um “Critério de comparação” análogo ao critério para integrais do tipo 1.
- ▶ Pode-se falar em **integrais impróprios do tipo 3** quando são simultaneamente do tipo 1 e do tipo 2.

- É do tipo 3 o integral

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{1-x}.$$

Porquê?