











RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Fique atento ao contador de doses, para adquirir uma nova embalagem.
- No caso de a inalação não ter sido bem feita, a janela não muda de cor e não fica disponível outra dose.
- Não realize a expiração forçada com o inalador na boca.
- Não guarde o inalador na casa de banho.
- Não lave o inalador com água nem limpe com pano húmido.
- Após cada utilização, limpe o bocal com um lenço de papel.

Largo P aulo Orósio, 2º andar, Maximinos 4700-036 Braga Email: usf.mrpeixoto@arsnorte.min-saude.pt Blog: http://usfmanuelrochapeixoto.blogspot.pt/

Telefone: 253 209 240 |

Autor: Ana Vieira; Maria Augusta

Pereira; Maria João Botelho

Data: fevereiro / 2019

Rever em: fevereiro / 2021





GENUAIR®

INFORMAÇÕES ÚTEIS

O inalador *Genuair*® é um dispositivo que permite administrar fármacos diretamente nas vias aéreas inferiores, através da sua inalação.

A via inalatória é a via de eleição para a administração de fármacos no tratamento das doenças respiratórias, pois permite:

- ✓ Ação terapêutica mais rápida;
- ✓ Maior eficácia;
- ✓ Utilização de doses menores de fármaco;
- ✓ Menos efeitos adversos.

A eficácia do tratamento depende da correta utilização do dispositivo de inalação.

Traga o seu inalador sempre que vier à consulta, assim poderemos melhorar o seu uso e tratar melhor a sua doença.



ESCLAREÇA TODAS AS DÚVIDAS COM O SEU
MÉDICO / ENFERMEIRO DE FAMÍLIA!

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- 1. Deve estar de pé ou sentado. Retire a tampa.
- 2. Mantenha o dispositivo sempre na horizontal.
- 3. Carregue no botão superior e largue (vai ouvir um "clique"); o mostrador passa de vermelho a verde.
- 4. Expire lentamente, o máximo que conseguir, afastado do inalador.
- 5. Coloque o dispositivo em posição horizontal na boca, sem obstruir o bocal com a língua, e aperte bem os lábios de forma a selar e evitar saídas de ar.
- 6. Inspire de forma rápida e vigorosa pela boca. Deve ouvir um "clique" e o mostrador passa novamente para vermelho.
- 7. Retire o inalador da boca e suspenda a respiração durante 5 10 segundos.
- 8. Expire lentamente.
- 9. Volte a colocar a tampa.

NOTA: Se for prescrito mais do que 1 *puff* aguarde 1 min. para a nova inalação e repita os passos anteriores.







