

Introduction

Il y a deux domaines:

- Temporel: On observe les signaux.
- Fréquentiel: On traite les signaux.

Il nous faut donc un outil pour passer de l'un à l'autre.

Les outils sont différents en fonction des signaux. (Ex: continus..)

Nous allons étudier *la transformée de Laplace*.

Rappels

Résolution d'une équation différentielle linéaire et à coefficients constants

Exemple:

$$y''(t) + [y'(t)]^2 - 6y(t) = 12t + 20 \quad (1)$$

- inconnue: $y(t)$
- Equa diff du 2eme ordre

Méthode classique (2 étapes)

Première étape

ESSM (Equation Sans Second Membre)

On cherche la solution générale de:

$$y''(t) + [y'(t)]^2 - 6y(t) = 0 \quad (2)$$

On cherche la solution sous la forme:

$$y(t) = e^{rt} \text{ On cherche } r$$

$$y'(t) = r \cdot e^{rt}$$

$$y''(t) = r^2 e^{rt}$$

$$(r^2 + r - 6)e^{rt} = 0$$

$$r^2 + r - 6 = 0 \text{ équation caractéristique.}$$

$$\Delta = 1 + 24 = 25 \text{ Donc } r_1 = \frac{-1+\sqrt{25}}{2} = 2$$

$$r_2 = \frac{-1-\sqrt{25}}{2} = -3$$

Solution générale de l'ESSM:

$$y(t) = A.e^{2t} + B.e^{-3t} \quad (3)$$

Seconde étape

EASM éq avec second membre. On cherche une solution particulière.

$$y''(t) + u'(t) - 6y(t) = 12t + 20 \quad (4)$$

On peut trouver une solution particulière de la même forme que le second membre.

$y(t) = at + b$ On cherche a et b .

$$y''(t) = 0$$

$$y'(t) = a$$

$$a - 6at - 6b = 12t + 20$$

$$\left\{ \begin{array}{l} a - 6b = 20 \\ -6a = 12 \end{array} \right\} \Rightarrow a = -2 \Rightarrow 6b = a - 20 = -22$$

$$b = -11/3$$

- Solution générale de l'EASM =
- Solution générale de l'EASM +
- Solution particulière de l'EASM

$$y(t) = -2t - 11/3 + A.e^{2t} + B.e^{-3t} \quad (5)$$

A et B dépendent des 2 conditions initiales.

Produit de convolution

Soit $x(t)$ et $y(t)$

$$x(t) \times y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau).y(t - \tau).d\tau \quad (6)$$

Propriétés:

- commutativité: $x(t) \times y(t) = y(t) \times x(t)$

- associativité: $x(t) \times [y(t) \times z(t)] = [x(t) \times y(t)] \times z(t)$
- distributivité / addition: $x(t) \times [y(t) + z(t)] = [x(t) \times y(t)] + [x(t) \times z(t)]$
- existe-t-il une "unité de convolution"?

$$x(t) \times u(t) = x(t)$$

Existe t il u(t) unité de convolution:

$$x(t) \times u(t) = u(t) \times x(t) = x(t), \forall x(t) \quad (7)$$

Si oui c'est le PIC de DIRAC (théorème de distribution.

Transformation de Laplace

C'est une fonction complexe d'une variable complexe $p = \sigma + jw$

- w est la pulsation
- $w = 2\pi f$ ou f est la fréquence

$$f(t) \Rightarrow F(p)$$

$$F(p) \equiv \int_0^{+\infty} f(t).e^{-pt}.dt \quad (8)$$

Définition

Existence ? $F(p)$ existe pour tous les signaux $f(t)$ que l'on peut rencontrer.

On suppose généralement que $f(t)$ est CAUSAL.

Propriétés:

$$1. \text{ Linéaire: } L[\lambda.f(t) + \mu.g(t)] = \lambda.F(p) + \mu.G(p)$$

$$2. \text{ Retard: } G(t) = f(t - \tau) \text{ Il y a un retard de } \tau$$

$$L[f(t - \tau)] = e^{-\tau p}.F(p)$$

$$3. \text{ Convolution: (compliqué dans l'espace temporel)}$$

$$L[x(t) * y(t)] = X(p).Y(p)$$

Donc le produit de convolution est équivalent au produit ordinaire.

$$4. \text{ Dérivation / Intégration:}$$

$$L\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = p.F(p) - f(t=0)$$

On fait souvent l'hypothèse que les conditions initiales sont nulles $f(t=0) = 0$

Il est donc très facile de dériver dans l'espace p.

- Dérivé 3 fois $\Leftrightarrow p^3.F(p)$
- Intégration dans l'espace t \Leftrightarrow diviser par p dans l'espace p.

5. Th des valeurs INITIALE / Th de la valeur finale

Théoreme de la valeur initiale.

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{p \rightarrow +\infty} [p.F(p)] \quad (9)$$

Théoreme de la valeur finale.

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{p \rightarrow 0} [p.F(p)] \quad (10)$$

Tableau des transformées de laplace élémentaires.

t	p
S(t)	1
$u(t)$ Déclaration unitaire	$\frac{1}{p}$
$t.u(t)$ rampe unitaire	$\frac{1}{p^2}$
$e^{-at}.u(t)$	$\frac{1}{p+a}$