

Mecánica Estadística

Tarea 5: Teoría de Landau y Renormalización

Iván Mauricio Burbano Aldana

7 de abril de 2018

1. Teoría de Landau

1.1. Parámetro de orden

1. La derivada funcional de S es

$$\begin{aligned}\frac{\delta S}{\delta \phi(\mathbf{r})}[\phi] &= \frac{\delta H}{\delta \phi(\mathbf{r})}[\phi] - \frac{\delta}{\delta \phi(\mathbf{r})} \int d^d \mathbf{r}' h(\mathbf{r}') \phi(\mathbf{r}') \\ &= \frac{\delta}{\delta \phi(\mathbf{r}')} \int d^d \mathbf{r}' \left(\frac{1}{2} \|\nabla \phi(\mathbf{r}')\|^2 + A \phi(\mathbf{r}')^2 + B \phi(\mathbf{r}')^4 \right) \\ &\quad - \int d^d \mathbf{r}' h(\mathbf{r}') \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}) \\ &= \int d^d \mathbf{r}' \nabla \phi(\mathbf{r}') \cdot \nabla \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}) \\ &\quad + \int d^d \mathbf{r}' (2A \phi(\mathbf{r}') \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}) + 4B \phi(\mathbf{r}')^3 \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r})) - h(\mathbf{r}) \\ &= \int d^d \mathbf{r}' \nabla \phi(\mathbf{r}') \cdot \nabla \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}) + 2A \phi(\mathbf{r}) + 4B \phi(\mathbf{r})^3 - h(\mathbf{r}).\end{aligned}\tag{1}$$

Note que según la definición de derivada de una distribución se tiene

$$\begin{aligned}\nabla \phi(\mathbf{r}') \cdot \nabla \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}) &= \sum_{i=1}^d \partial_i \phi(\mathbf{r}') \partial_i \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}) = - \sum_{i=1}^d \partial_i^2 \phi(\mathbf{r}') \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}) \\ &= - \Delta \phi(\mathbf{r}') \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}).\end{aligned}\tag{2}$$

Se concluye entonces que

$$\begin{aligned}\frac{\delta S}{\delta \phi(\mathbf{r})}[\phi] &= \int d^d \mathbf{r}' \nabla \phi(\mathbf{r}') \cdot \nabla \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}) + 2A \phi(\mathbf{r}) + 4B \phi(\mathbf{r})^3 - h(\mathbf{r}) \\ &= - \int d^d \mathbf{r}' \Delta \phi(\mathbf{r}') \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}) + 2A \phi(\mathbf{r}) + 4B \phi(\mathbf{r})^3 - h(\mathbf{r}) \\ &= - \Delta \phi(\mathbf{r}) + 2A \phi(\mathbf{r}) + 4B \phi(\mathbf{r})^3 - h(\mathbf{r}).\end{aligned}\tag{3}$$

En efecto, la condición de minimización $0 = \frac{\delta S}{\delta \phi(\mathbf{r})}[\phi_0]$ toma la forma

$$h(\mathbf{r}) = 2A\phi_0(\mathbf{r}) + 4B\phi_0(\mathbf{r})^3 - \Delta\phi_0(\mathbf{r}). \quad (4)$$

2. En el caso $h = 0$ en el que ϕ_0 es constante, $\Delta\phi = 0$ y por lo tanto

$$0 = 2A\phi_0 + 4B\phi_0^3 = 2\phi_0(A + 2B\phi_0^2). \quad (5)$$

Se obtienen las soluciones $\phi_0 = 0$ y, si A y B tienen signos opuestos, $\phi_0 = \pm\sqrt{-\frac{A}{2B}}$.

3. En este caso, si $T > T_c$, se tiene $A > 0$. Por lo tanto, la única solución posible es $\phi_0 = 0$. Por el otro lado, si $T < T_c$, tanto la solución $\phi_0 = 0$ como las soluciones

$$\phi_0 = \pm\sqrt{\frac{A_1(T_c - T)}{B}} \quad (6)$$

son permitidas. Sin embargo, solo consideramos la solución (6) ya que esta minimiza la energía libre. En efecto, ya que $h = 0$, se tiene

$$\begin{aligned} F = H[\phi_0] &= \int d^d\mathbf{r} (A\phi^2 + B\phi^4) = \int d^d\mathbf{r} (A + B\phi^2)\phi^2 \\ &= \begin{cases} 0, & \phi_0 = 0 \\ -\int d^d\mathbf{r} (A - B\frac{A}{2B})\frac{A}{2B} = -\int d^d\mathbf{r} \frac{A^2}{4B} < 0, & \phi_0 = \pm\sqrt{-\frac{A}{2B}}. \end{cases} \end{aligned} \quad (7)$$

1.2. Correlaciones

1. Tomando la derivada funcional y utilizando la relación vista en clase $G(\mathbf{r}', \mathbf{r}) = \frac{\delta}{\delta h(\mathbf{r})}\phi_0(\mathbf{r}')$ se tiene

$$\begin{aligned} \delta(\mathbf{r}' - \mathbf{r}) &= \frac{\delta}{\delta h(\mathbf{r})}h(\mathbf{r}') = \frac{\delta}{\delta h(\mathbf{r})}(2A\phi_0(\mathbf{r}') + 4B\phi_0(\mathbf{r}')^3 - \Delta\phi_0(\mathbf{r}')) \\ &= 2A\frac{\delta}{\delta h(\mathbf{r})}\phi_0(\mathbf{r}') + 12B\phi_0(\mathbf{r}')^2\frac{\delta}{\delta h(\mathbf{r})}\phi_0(\mathbf{r}') - \Delta\frac{\delta}{\delta h(\mathbf{r})}\phi_0(\mathbf{r}') \quad (8) \\ &= 2AG(\mathbf{r}', \mathbf{r}) + 12B\phi_0(\mathbf{r}')^2G(\mathbf{r}', \mathbf{r}) - \Delta_{\mathbf{r}'}G(\mathbf{r}', \mathbf{r}). \end{aligned}$$

Si $h = 0$ y el sistema es homogéneo, ϕ_0 es constante y $G(\mathbf{r}', \mathbf{r}) = G(\mathbf{r}' - \mathbf{r})$. Es claro entonces por la regla de la cadena que

$$\Delta_{\mathbf{r}'}G(\mathbf{r}', \mathbf{r}) = \Delta_{\mathbf{r}'}G(\mathbf{r}' - \mathbf{r}) = \Delta G(\mathbf{r}' - \mathbf{r}). \quad (9)$$

Tomando

$$\xi^{-2} = 2A + 12B\phi_0^2 \quad (10)$$

y haciendo el cambio de variable $\mathbf{r}' - \mathbf{r} \mapsto \mathbf{r}$ se concluye

$$\delta(\mathbf{r}) = (-\Delta + \xi^{-2})G(\mathbf{r}). \quad (11)$$

Podemos determinar

$$\begin{aligned}\xi &= \frac{1}{\sqrt{2A + 12B\phi^2}} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2A - 12B\frac{A}{2B}}} = \frac{1}{2\sqrt{-A}} = \frac{1}{2\sqrt{A_1(T_c - T)}}, & T < T_c \\ \frac{1}{\sqrt{2A}} = \frac{1}{\sqrt{2A_1(T - T_c)}}, & T > T_c. \end{cases} \end{aligned} \quad (12)$$

2. Utilizando la forma integral de la distribución delta e insertando la transformada de Fourier en (11) se tiene

$$\begin{aligned}\int \frac{d^d \mathbf{k}}{(2\pi)^d} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \delta(\mathbf{r}) &= (-\Delta + \xi^{-2}) \int \frac{d^d \mathbf{k}}{(2\pi)^d} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \tilde{G}(\mathbf{k}) \\ &= \int \frac{d^d \mathbf{k}}{(2\pi)^d} (-\Delta + \xi^{-2}) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \tilde{G}(\mathbf{k}) \\ &= \int \frac{d^d \mathbf{k}}{(2\pi)^d} (\mathbf{k}^2 + \xi^{-2}) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \tilde{G}(\mathbf{k})\end{aligned} \quad (13)$$

en vista de que $\Delta e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} = i\mathbf{k} \cdot i\mathbf{k} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} = -\mathbf{k}^2 e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$. Comparando se obtiene que

$$\tilde{G}(\mathbf{k}) = \frac{1}{\mathbf{k}^2 + \xi^{-2}}. \quad (14)$$

3. Utilizando el resultado anterior y restringiendo a $d = 3$ tenemos

$$\begin{aligned}G(\mathbf{r}) &= \int \frac{d^3 \mathbf{k}}{(2\pi)^3} \frac{e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}}{\mathbf{k}^2 + \xi^{-2}} \\ &= \frac{1}{(2\pi)^3} \int_0^\infty du \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\pi} d\phi u^2 \sin(\theta) \frac{e^{iu\|\mathbf{r}\| \cos(\theta)}}{u^2 + \xi^{-2}} \\ &= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^\infty du \int_1^{-1} dv (-1)u^2 \frac{e^{iu\|\mathbf{r}\|v}}{u^2 + \xi^{-2}} \\ &= \frac{1}{i\|\mathbf{r}\|(2\pi)^2} \int_0^\infty du u \frac{e^{iu\|\mathbf{r}\|} - e^{-iu\|\mathbf{r}\|}}{u^2 + \xi^{-2}}\end{aligned} \quad (15)$$

Note que bajo un cambio de variable

$$\begin{aligned}\int_0^\infty du u \frac{e^{-iu\|\mathbf{r}\|}}{u^2 + \xi^{-2}} &= \int_0^\infty du (-1)(-u) \frac{e^{iu\|\mathbf{r}\|}}{(-u)^2 + \xi^{-2}} \\ &= - \int_{-\infty}^0 du u \frac{e^{iu\|\mathbf{r}\|}}{u^2 + \xi^{-2}}.\end{aligned} \quad (16)$$

Por lo tanto

$$G(\mathbf{r}) = \frac{1}{i\|\mathbf{r}\|(2\pi)^2} \int_{-\infty}^\infty du \frac{ue^{iu\|\mathbf{r}\|}}{u^2 + \xi^{-2}}. \quad (17)$$

Sea $R > i\xi^{-1}$. Considere bajo la orientación en contra de las manecillas del reloj los conjuntos

$$\begin{aligned} S_R^+ &:= \{Re^{i\theta} \in \mathbb{C} | \theta \in [0, \pi]\} \subseteq D_R := S_R^+ \cup [-R, R] \times \{0\} \\ &\subseteq \mathbb{C} \setminus \{i\xi^{-1}, -i\xi^{-1}\}, \end{aligned} \quad (18)$$

el dominio de definición de la función holomorfa

$$\begin{aligned} f : \mathbb{C} \setminus \{i\xi^{-1}, -i\xi^{-1}\} &\rightarrow \mathbb{C} \\ z &\mapsto \frac{ze^{iz\|\mathbf{r}\|}}{z^2 + \xi^{-2}} = \frac{ze^{iz\|\mathbf{r}\|}}{(z + i\xi^{-1})(z - i\xi^{-1})}. \end{aligned} \quad (19)$$

D_R solo encierra el polo $i\xi^{-1}$ y en este punto el residuo de f claramente es

$$\frac{i\xi^{-1}e^{ii\xi^{-1}\|\mathbf{r}\|}}{2i\xi^{-1}} = \frac{1}{2}e^{-\|\mathbf{r}\|/\xi}. \quad (20)$$

Por lo tanto por el teorema del residuo

$$\int_{D_R} dz f(z) = 2\pi i \frac{1}{2} e^{-\|\mathbf{r}\|/\xi} = i\pi e^{-\|\mathbf{r}\|/\xi}, \quad (21)$$

y

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} du f(u) &= \lim_{R \rightarrow \infty} \left(\int_{D_R} dz f(z) - \int_{S_R^+} dz f(z) \right) \\ &= i\pi e^{-\|\mathbf{r}\|/\xi} - \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{S_R^+} dz f(z) = i\pi e^{-\|\mathbf{r}\|/\xi}. \end{aligned} \quad (22)$$

Se concluye que

$$G(\mathbf{r}) = \frac{1}{i\|\mathbf{r}\|(2\pi)^2} i\pi e^{-\|\mathbf{r}\|/\xi} = \frac{e^{-\|\mathbf{r}\|/\xi}}{4\pi\|\mathbf{r}\|} \quad (23)$$

4. En el caso $d = 2$ tenemos tomando coordenadas polares con los ángulos medidos desde \mathbf{r}

$$\begin{aligned} G(\mathbf{r}) &= \int \frac{d^2\mathbf{k}}{(2\pi)^2} \frac{e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}}{\mathbf{k}^2 + \xi^{-2}} \\ &= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^{\infty} du \int_0^{2\pi} d\theta u \frac{e^{iu\|\mathbf{r}\|\cos(\theta)}}{u^2 + \xi^{-2}}. \end{aligned} \quad (24)$$

Recordando la expresión integral para la función de Bessel de orden 0

$$\begin{aligned} J_0(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} d\tau e^{-ix \sin(\tau)} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\tau e^{-ix(-\cos(\tau))} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\tau e^{ix \cos(\tau)}, \end{aligned} \quad (25)$$

se tiene

$$G(\mathbf{r}) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty du \frac{u J_0(u \|\mathbf{r}\|)}{u^2 + \xi^{-2}}. \quad (26)$$

Defina

$$\begin{aligned} g : \mathbb{R}_0^+ &:= \{x \in \mathbb{R} | x \geq 0\} \rightarrow \mathbb{C} \\ x &\mapsto \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^\infty du \frac{u J_0(x)}{u^2 + \xi^{-2}}. \end{aligned} \quad (27)$$

Entonces se tiene para todo $x \in \mathbb{R}^+ := \mathbb{R}_0^+ \setminus \{0\}$

$$g''(x) + \frac{1}{x} g'(x) - g(x) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^\infty du \frac{u}{u^2 + \xi^{-2}} \left(J_0''(x) + \frac{1}{x} J_0'(x) - J_0(x) \right) \quad (28)$$