## Formulaire de dérivées

## Dérivées des fonctions usuelles

Fonction	Dérivée	Domaine de définition	Domaine de dérivabilité
$\mathbf{x^n},\mathbf{n}\in\mathbb{N}^*$	$nx^{n-1}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{\chi^2}$	ℝ*	$\mathbb{R}^*$
$\frac{1}{x^n},n\in\mathbb{N}^*$	$-\frac{n}{x^{n+1}}$	$\mathbb{R}^*$	$\mathbb{R}^*$
$x^n, n \in \mathbb{Z}^*$	$nx^{n-1}$	$\mathbb{R} \text{ si } n \geq 1,  \mathbb{R}^* \text{ si } n \leq -1$	$\mathbb{R} \text{ si } n \geq 1,  \mathbb{R}^* \text{ si } n \leq -1$
$\sqrt{\chi}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$[0,+\infty[$	]0,+∞[
e <sup>x</sup>	e <sup>x</sup>	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$	]0, +∞[	]0,+∞[
$\sin(x)$	$\cos(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$
$\tan(x)$	$1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$	$\mathbb{R}\setminus\{\frac{\pi}{2}+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\}$	$\mathbb{R}\setminus \{\frac{\pi}{2}+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}\}$

## Dérivées et opérations

- Si f et g sont deux fonctions dérivables sur I, f + g est dérivable sur I et (f + g)' = f' + g'.
- Si f est dérivable sur I et si  $\lambda$  est un réel,  $\lambda f$  est dérivable sur I et  $(\lambda f)' = \lambda f'$ .
- ullet Si f et g sont deux fonctions dérivables sur I, f  $\times$  g est dérivable sur I et  $(f \times g)' = f'g + fg'$ .
- Si f et g sont deux fonctions dérivables sur I et si g ne s'annule pas sur I,  $\frac{f}{g}$  est dérivable sur I et  $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g fg'}{g^2}$ . Si f est dérivable sur I, si g est dérivable sur J et si pour tout x de I,  $f(x) \in J$ , gof est dérivable sur I et  $(g \circ f)' = f' \times g' \circ f$ .
- Cette dernière formule fournit en particulier le tableau suivant :

Fonction	Dérivée	Domaine de dérivabilité	
$f^{\mathfrak{n}},\mathfrak{n}\in\mathbb{N}^{*}$	nf′f <sup>n−1</sup>	en tout réel où f est dérivable	
1/f	$-\frac{f'}{f^2}$	en tout réel où f est dérivable et non nulle	
$\frac{1}{f^n},n\in\mathbb{N}^*$	$-\frac{nf'}{f^{n+1}}$	en tout réel où f est dérivable et non nulle	
$f^{\mathfrak{n}},\mathfrak{n}\in\mathbb{Z}^{*}$	nf'f <sup>n-1</sup>		
$\sqrt{f}$	$\frac{f'}{2\sqrt{f}}$	en tout réel où f est dérivable et strictement positive	
e <sup>f</sup>	f′e <sup>f</sup>	en tout réel où f est dérivable	
$\ln(f)$	$\frac{f'}{f}$	en tout réel où f est dérivable et strictement positive	
$\sin(f)$	f'cos(f)	en tout réel où f est dérivable	
$\cos(f)$	$-f'\sin(f)$	en tout réel où f est dérivable	