


# Benaderingsregels


Bron:

[https://hoezithet.nu/lessen/fysica/grootheden\\_eenheden/benaderingsregels/](https://hoezithet.nu/lessen/fysica/grootheden_eenheden/benaderingsregels/)

Als we berekeningen doen met metingen, moeten we altijd in ons achterhoofd houden dat **metingen nooit exact** zijn. Stel dat we bijvoorbeeld een meetlat naast een LEGO-blokje leggen, en we meten dat de zijde **1,6 cm** is.




Als we 100 zulke blokjes naast elkaar leggen, hoe lang zal die rij blokjes dan zijn?




Dat lijkt heel eenvoudig, gewoon

$100 \cdot 1,6 \text{ cm} = 160 \text{ cm}$ . We hebben het blokje echter gemeten met een meetlat die maar tot op **0,1 cm** nauwkeurig kan meten. Stel dat we het blokje nu meten met een schuifmaat die tot op **0,01 cm** nauwkeurig kan meten. Nu vinden we dat het blokje **1,58 cm** is.




Als we 100 blokjes naast elkaar zouden leggen, zullen we dus een rij van **158 cm** krijgen, niet **160 cm**.




Met **benaderingsregels** kunnen we de onzekerheid van een berekening uitdrukken. Als we de benaderingsregels toepassen die we straks zullen leren, krijgen we **1,6 m** voor de eerste berekening en **1,58 m** voor de tweede berekening. Het belangrijke hierbij is dat er **1,6** staat en **niet 1,60**.

Met **1,6 m** bedoelen we namelijk: “iets tussen **1,55 m** en **1,65 m**,” en inderdaad, **1,58 m** ligt binnen die foutenmarge.



Als we bij de eerste berekening **1,60** hadden geschreven, zou dat betekenen: “iets tussen **1,595 m** en **1,605 m**,” maar **dat is fout**, want **1,58 m** ligt **buiten die foutenmarge**.



Door na onze berekeningen benaderingsregels toe te passen, zorgen we dat de uitkomst de juiste foutenmarge heeft.

## Afronden na de komma

Voor we de benaderingsregels uit de doeken doen, frissen we nog snel even op hoe je getallen moet afronden.

- Rond af naar **boven** als het **volgende cijfer** **groter of gelijk aan 5** is;
- Rond of naar **beneden** als het **volgende cijfer**

kleiner dan 5 is.

Als voorbeeld ronden we **384,9503** af tot een bepaald aantal cijfers na de komma.

Voor afronding	Soort afronding	Na afronding	Uitleg
<b>384,9503</b>	Op de tienden	<b>385,0</b>	<b>5</b> $\geq$ <b>5</b> dus <b>9</b> wordt <b>10</b> , waardoor de <b>4</b> een <b>5</b> wordt
<b>384,9503</b>	Op de honderdsten	<b>384,95</b>	<b>0</b> $<$ <b>5</b> dus <b>5</b> blijft <b>5</b>
<b>384,9503</b>	Op de duizendsten	<b>384,950</b>	<b>3</b> $<$ <b>5</b> dus <b>0</b> blijft <b>0</b>

## Afronden vóór de komma

Soms moeten we ook vóór de komma afronden. Dat kunnen we met behulp van [machten van 10](#). We zullen weer **384,9503** gebruiken als voorbeeld.

Voor afronding	Soort afronding	Na afronding	Uitleg
<b>384,9503</b>	Op de eenheden	<b>385</b> · 10 <sup>0</sup> of gewoon <b>385</b>	<b>9</b> $\geq$ <b>5</b> dus <b>4</b> wordt <b>5</b> Vermenigvuldigen met 10 <sup>0</sup> = 1 omdat we afronden op de eenheden

Voor afronding	Soort afronding	Na afronding	Uitleg
384,9503	Op de tientallen	$38 \cdot 10^1$	$4 < 5$ dus 8 blijft 8 Vermenigvuldigen met $10^1 = 10$ omdat we afronden op de tientallen
384,9503	Op de honderdtallen	$4 \cdot 10^2$	$8 \geq 5$ dus 3 wordt 4 Vermenigvuldigen met $10^2 = 100$ omdat we afronden op de honderdtallen

## Optellingen en aftrekkingen

Nadat we berekeningen hebben gedaan, zullen we bijna altijd de benaderingsregels moeten toepassen. Welke regels we moeten toepassen, hangt af van de bewerkingen die we hebben gedaan tijdens de berekening.

Voor optellingen en aftrekkingen kijken we naar het aantal cijfers na de komma. We moeten de uitkomst afronden zodat die hetzelfde aantal cijfers na de komma heeft als het getal in de berekening met het minst aantal cijfers na de komma

Neem bijvoorbeeld de berekening

$$24,28 + 9,1 - 3,35$$

Deze berekening heeft drie termen:

Term	Aantal cijfers na de komma
24, <b>28</b>	2
9, <b>1</b>	1
−3, <b>35</b>	2

Het kleinste aantal cijfers na de komma is dus 1. Dat betekent dat we de uitkomst moeten afronden tot op **1 cijfer na de komma** (afronden op de tienden dus). De uitkomst van de berekening zelf is:

$$24,28 + 9,1 - 3,33 = 36,75$$

Als we dit vervolgens afronden op de tienden, krijgen we:

$$36,75 \approx 36,8$$

## Vermenigvuldigingen en delingen

Voor vermenigvuldigingen en delingen kijken we naar het [aantal buitende cijfers](#). We moeten de uitkomst afronden zodat die hetzelfde aantal beduidende cijfers heeft als het getal in de berekening met het **minst aantal beduidende cijfers**.

Bijvoorbeeld de berekening:

$$0,000247 \cdot 34,2 \cdot 9,1$$

Deze berekening heeft drie factoren:

Factor	Aantal beduidende cijfers
0,000 <b>247</b>	3
<b>34,2</b>	3
<b>9,1</b>	2

Het kleinste aantal beduidende cijfers is dus 2. Dat

betekent dat we de uitkomst moeten afronden tot 2 beduidende cijfers. De uitkomst is:

$$0,000247 \cdot 34,2 \cdot 9,1 = 0,07687134$$

Deze uitkomst moeten we afronden zodat enkel de eerste 2 beduidende cijfers overblijven (7 en 6). We moeten dus afronden op de duizendsten (3 plaatsen na de komma):

$$0,07687134 \approx 0,077$$

## Samengevat

### BENADERINGSREGELS

- De uitkomst van een optelling of aftrekking moet hetzelfde aantal cijfers na de komma hebben als het getal in de berekening met het kleinste aantal cijfers na de komma;
- De uitkomst van een vermenigvuldiging of deling moet hetzelfde aantal beduidende cijfers hebben als het getal in de berekening met het kleinste aantal beduidende cijfers.

Meer op <https://hoezithet.nu/>



| hoe zit het?

