
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL NA ATENÇÃO BÁSICA

Dra. Cássia Elena Soares

Fluxograma de Pré-Natal



Garanta o atendimento no ambulatório de pré-natal de alto risco. Mantenha acompanhamento da equipe da área de abrangência. Visitas domiliciares mensais pelos ACS e se necessários pela equipe.

Identifique e informe a gestante o hospital de referência de alto risco para o parto.

Agende consulta de puerpério para a primeira semana pósparto.

Atendimento pela equipe da área de abrangência. Consultas com médico e enfermeiro.

Inclua o companheiro da gestante nas consultas. Monitore os retornos. Visitas domiciliares mensais pelos ACS e se necessários pela equipe. Identifique e informe hospital de emergência de baixo risco para o parto. Agende consulta de puerpério (para a mãe e o RN) para a primeira semana pós-parto.

REDE CEGONHA – SANTA CATARINA

Critérios para encaminhamento para serviços Ambulatoriais de Gestação de Alto Risco

C) de 15 anos	1 IDADE.	5. AVALIAÇÃO NUTRICIONAL: Baixo	7 - PATOLOGIAS DE RISCO ATUAL: OBST. + GINEC.
De 15 a 34 anos	1 – IDADE:	- I	1. 1711 OLOGIMO DE MIGGO MI GAL. OBOT. 1. OINVEG.
pesu interculative (F) de 35 anos	• •		Ameaca de Aborto 5
2 - SITUAÇÃO FAMILIAR Situação Familiar Instável Não		1 ' '	Anom. do trato Genitourinario
2 - SITUAÇAO FAMILIAR Situação Familiar Instável Não	(+) de 35 anos 1	anemia 1	
Situação Famíliar Instável Não	0.0000000000000000000000000000000000000	4	Câncer Materno
Não		Peso Adequado (IMC 18, 5-24,	Doença Hemolítica1
Não		9kg/m2)0	Esterelidade Tratada
Aceitação de GRAVIDEZ: Aceita	Não 0		Isoimunização1
Aceita	Sim1	Sobrepeso(25-29, 9kg/m2) 1	Neoplasias Ginecológicas1
Não Aceita	Aceitação de GRAVIDEZ:	' ' ' '	Mal Formações Congénitas
Não Aceita 1 6 - ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS: Abortos até 2	Aceita 0	Ohesidade (IMC>30kg/m2) 5	Crescimento Uterino Retardado
Abortos até 2	Não Aceita 1	Sectional (IIIIe Song/III2)	Polihidramnio/Oligoidramnio
Abortos até 2			Citologia Cervical Anormal(Nicl-II-III)1
Abortos espontâneos + 2		6 - ANTECEDENTES OBSTETRICOS:	Doença Hipertensiva da Gestação 10
Natimorto Prematuro Sabe Ler e Escrever: Obito Fetal Sim O Não 1 Placenta Prévia Sim O Previa O Placenta Sim O Previa O Placenta O Doença Redilius O Doença Psiquiátrica O Doença Psiquiát		Abortos até 25	Diabetes Gestacional
Sabe Ler e Escrever: Sim		Abortos espontâneos + 2 10	Gemelar1
Sabe Ler e Escrever: Sim	2 - ESCOLADIDADE:	Natimorto	Incomp. Istmo Cervical1
Sim		Prematuro5	
Não	Sabe Ler e Escrever:		MÉDICAS + CIRURG.
Descol. Prem. de Placenta	Sim 0	· ·	Cardiopatias1
A - HÁBITOS:	Não 1	1	Varizes acentuadas
Tabagista: Sim		-	Pneumopatia Grave
Sim	4 – HÁBITOS:	I I	
Não	Tabagista:	Restrição de Cresc. Intrauterino	, , ,
VÍltimo Parto (-) de 12 meses	Sim 2	1	,
*Fatores sócio econômicos não são critérios isoladamente para encaminhamento ao Pré Natal de Alto Risco (PNAR). Merecem atendimento diferenciado na Atenção Básica. *PNAR: Deve conter obrigatoriamente itens dos quadros 5 e\ou 6 e\ou 7 da classificação acima (somando 10 ou mais pontos). Médio Risco: Somatório de 5 a 9 pontos deve receber atendimento de Pré Natal na Atenção Básica pelo médico intercalado com o enfermeiro. ### Fatores sócio econômicos não são critérios isoladamente para encaminhamento ao Pré Natal Infecção Urinária de repetição (pielonefrite ou infecções 3x ou +) Infecções Grave. AIDS/HIV. **Sfflis	Não 0	1 . '	
*Fatores sócio econômicos não são critérios isoladamente para encaminhamento ao Pré Natal de Alto Risco (PNAR). Merecem atendimento diferenciado na Atenção Básica. PNAR: Deve conter obrigatoriamente itens dos quadros 5 e\ou 6 e\ou 7 da classificação acima (somando 10 ou mais pontos). Médio Risco: Somatório de 5 a 9 pontos deve receber atendimento de Pré Natal na Atenção Básica pelo médico intercalado com o enfermeiro. Pre eclampsia		1 ''	
*Fatores sócio econômicos não são critérios isoladamente para encaminhamento ao Pré Natal de Alto Risco (PNAR). Merecem atendimento diferenciado na Atenção Básica. PNAR: Deve conter obrigatoriamente itens dos quadros 5 e\ou 6 e\ou 7 da classificação acima (somando 10 ou mais pontos). Médio Risco: Somatório de 5 a 9 pontos deve receber atendimento de Pré Natal na Atenção Básica pelo médico intercalado com o enfermeiro. Baixo Risco: Somatório de até 4 pontos deve receber atendimento intercalado de Pré Natal na Atenção Básica pelo enfermeiro e pelo médico. Infecção Urinária de repetição (pielonefrite ou infecções 3x ou +) Infecções Grave. AIDS/HIV			Tierriopatias
encaminhamento ao Pré Natal de Alto Risco (PNAR). Merecem atendimento diferenciado na Atenção Básica. PNAR: Deve conter obrigatoriamente itens dos quadros 5 e\ou 6 e\ou 7 da classificação acima (somando 10 ou mais pontos). Médio Risco: Somatório de 5 a 9 pontos deve receber atendimento de Pré Natal na Atenção Básica pelo médico intercalado com o enfermeiro. Baixo Risco: Somatório de até 4 pontos deve receber atendimento intercalado de Pré Natal na Atenção Básica pelo enfermeiro e pelo médico. (pielonefrite ou infecções 3x ou +) Infecções Grave			·
diferenciado na Atenção Básica. PNAR: Deve conter obrigatoriamente itens dos quadros 5 e\ou 6 e\ou 7 da classificação acima (somando 10 ou mais pontos). Médio Risco: Somatório de 5 a 9 pontos deve receber atendimento de Pré Natal na Atenção Básica pelo médico intercalado com o enfermeiro. Baixo Risco: Somatório de até 4 pontos deve receber atendimento intercalado de Pré Natal na Atenção Básica pelo enfermeiro e pelo médico. Infecções Grave AIDS/HIV Sifilis Tuberculose Toxoplasmose Dep. de Drogas Alcoolismo Trombofilia Endocrinopatias Alterações da Tireóide. Alterações da Tireóide	*Fatores sócio econômicos não são critérios isoladamente para		
PNAR: Deve conter obrigatoriamente itens dos quadros 5 e\ou 6 e\ou 7 da classificação acima (somando 10 ou mais pontos). Médio Risco: Somatório de 5 a 9 pontos deve receber atendimento de Pré Natal na Atenção Básica pelo médico intercalado com o enfermeiro. Baixo Risco: Somatório de até 4 pontos deve receber atendimento intercalado de Pré Natal na Atenção Básica pelo enfermeiro e pelo médico. AIDS/HIV	encaminhamento ao Pré Natal de Alto Risco (PNAR). Merecem atendimento		, , ,
PNAR: Deve conter obrigatoriamente itens dos quadros 5 e\ou 6 e\ou 7 da classificação acima (somando 10 ou mais pontos). Médio Risco: Somatório de 5 a 9 pontos deve receber atendimento de Pré Natal na Atenção Básica pelo médico intercalado com o enfermeiro. Baixo Risco: Somatório de até 4 pontos deve receber atendimento intercalado de Pré Natal na Atenção Básica pelo enfermeiro e pelo médico. Sífilis	diferenciado na Atenção Básica.		,
PNAR: Deve conter obrigatoriamente itens dos quadros 5 e\ou 6 e\ou 7 da classificação acima (somando 10 ou mais pontos). Médio Risco: Somatório de 5 a 9 pontos deve receber atendimento de Pré Natal na Atenção Básica pelo médico intercalado com o enfermeiro. Baixo Risco: Somatório de até 4 pontos deve receber atendimento intercalado de Pré Natal na Atenção Básica pelo enfermeiro e pelo médico. Tuberculose Toxoplasmose. Dep. de Drogas. Alcoolismo. Trombofilia			
acima (somando 10 ou mais pontos). Médio Risco: Somatório de 5 a 9 pontos deve receber atendimento de Pré Natal na Atenção Básica pelo médico intercalado com o enfermeiro. Baixo Risco: Somatório de até 4 pontos deve receber atendimento intercalado de Pré Natal na Atenção Básica pelo enfermeiro e pelo médico. Toxoplasmose Dep. de Drogas Trombofilia Endocrinopatias Alterações da Tireóide Alterações da Tireóide	PNAR: Deve conter obrigatoriamente itens dos quadros 5 e\ou 6 e\ou 7 da classificação		
Médio Risco: Somatório de 5 a 9 pontos deve receber atendimento de Pré Natal na Atenção Básica pelo médico intercalado com o enfermeiro. Baixo Risco: Somatório de até 4 pontos deve receber atendimento intercalado de Pré Natal na Atenção Básica pelo enfermeiro e pelo médico. Dep. de Drogas			
Médio Risco: Somatório de 5 a 9 pontos deve receber atendimento de Pré Natal na Atenção Básica pelo médico intercalado com o enfermeiro. Baixo Risco: Somatório de até 4 pontos deve receber atendimento intercalado de Pré Natal na Atenção Básica pelo enfermeiro e pelo médico. Alcoolismo			Dep. de Drogas1
Atenção Básica pelo médico intercalado com o enfermeiro. Baixo Risco: Somatório de até 4 pontos deve receber atendimento intercalado de Pré Natal na Atenção Básica pelo enfermeiro e pelo médico. Trombofilia	Médio Risco: Somatório de 5 a 9 pontos deve receber atendimento de Pré Natal na		-
Baixo Risco: Somatório de até 4 pontos deve receber atendimento intercalado de Pré Natal na Atenção Básica pelo enfermeiro e pelo médico. Endocrinopatias	· ·		
Natal na Atenção Básica pelo enfermeiro e pelo médico.			Endocrinopatias1
Natal na Atenção Básica pelo enfermeiro e pelo médico.	Baixo Risco: Somatório de até 4 pontos deve receber atendimento intercalado de Pré		Alterações da Tireóide1
	·		
Seguir fluxograma de pré natal.			

Baseado nas publicações do MS: Manual Técnico Gestação de Alto Risco e Caderno de Atenção Básica № 32- Atenção ao Pré Natal de Baixo Risco e Material Fundação SESP.

