


POL 2024

Donnerstag, 12. Dezember 2024

Plötzlicher Leistungsabfall im Alter

PD Dr. med. Ardan M. Saguner
Leitender Arzt Rhythmologie
Klinik für Kardiologie
Universitäres Herzzentrum
UniversitätsSpital Zürich
ardan.saguner@usz.ch

Mindmap



UZH Medizinische Fakultät (CC BY-NC)

Lernziele

1. Sie kennen die typischen Symptome und Präsentation eines Patienten mit Vorhofflimmern
2. Sie können die Pathophysiologie und Stadien des Vorhofflimmerns erklären
3. Sie können die akuten und Langzeittherapiekonzepte (ohne Details) beim Vorhofflimmern erklären

Anamnese

- 68 jähriger Patient
- Erstkonsultation
- Vorgeschichte
 - Arterielle Hypertonie seit 10 Jahren
 - Therapie mit Lisinopril/Hydrochlorothiazid 5/12.5 mg 1-0-0
- Vater mit 53J Herzinfarkt

ACE-Hemmer



Thiaziddiuretika



Jetziges Leiden

- In den letzten Wochen
 - rasche Ermüdbarkeit
 - Belastungsdyspnoe NYHA III
 - Palpitationen

Klinischer Status

- 68-jähriger Patient in gutem AZ Nachmal nachmessen, wenn im Sinusrhythmus
- BMI 31 kg/m² Bei Vorhofflimmern versuchen wir unter 27 zu kommen
- BD 151/83 mmHg, Puls 120 /min, unregelmässig, afebril, allseits orientiert, GCS 15
- Unauffällige Herztöne, unregelmässig, peripheres Pulsdefizit
- diskrete Halsvenenstauung, HJR positiv Rechts-Herz-Insuffizienz
- Diskrete periphere Ödeme Rechts-Herz-Insuffizienz
- Eupnoe, Vesikuläratmen über allen Lungenfeldern
- Übriger Status unauffällig

Labor


Hämatologie	Unauffällig	
PTZ (Quick)	100 %	16 - 33
INR	1.0	3.5 - 2.0
Natrium	136 mmol/l	132 - 146
Kalium	3.6 mmol/l	3.6 - 4.5
Kreatinin	78 µmol/l	44 - 80
GFR nach MDRD	60 ml/min	
Bilirubin, total	16 µmol/l	< 17
LDH	439 U/l	150 - 420
ALT(GPT)	33 U/l	10 - 35
AST	47 U/l	10 - 50
GGT	79 U/l	8 - 61
Alk. Phosphatase	134 U/l	< 129
CRP (C-reakt.Prot.)	<5 mg/l	< 5
CK total	65 U/l	< 167
Myoglobin	42 µg/l	28 - 72
Troponin T	0.03 µg/l	< 0.10
NT-proBNP	481 ng/l	< 227
Glucose, Hep.Plasma	6.0 mmol/l	3.9 - 6.1

12- Kanal EKG

Tachykardes Vorhofflimmern

Einzigste Rhythmusstörung mit
totalem Chaos --> R-R Abstände
random

135/min.




--> Antikoagulation für Thromboseprophylaxe (wenn Risikofaktoren vorhanden sind)

Wichtig

12- Kanal EKG – tc Vorhofflimmern

135/min.



Transthorakale Echokardiographie

- Normal grosser linker Ventrikel, schwergradig reduzierte systolische Auswurffraktion (LVEF 25 % bei diffuser Hypokinesie)
- Leicht dilatierter linker Vorhof (LAVI 43ml/m²)

DD Herzinsuffizienz

- Myokardinfarkt mit Narbenbildung
- Klappenpathologien/Stenose
- Hypertension
- Krebsmedikamente (Doxorubicin)



Diagnosen

1. Hypertensive und rhythmogene Kardiopathie

Neu: persistierendes symptomatisches
Vorhofflimmern (EHRA III) mit
Herzinsuffizienz (HFrEF)

Heartfailure with reduced ejection fraction

2. Arterielle Hypertonie

Medikamente:

- ACE-Hemmer
- Angiotensin-Rezeptor-Neprilysin-Inhibitor (ARNI)
- Mineralkortikoid-Rezeptorantagonisten (MRA) --> Spironolacton
- Beta-Blocker
- SGLT 2 Inhibitoren


Wichtig

Flecainid nur bei jungen Patienten
sonst Amiodaron (Dauert aber lange bis angereichert)

Kardioversion --> aber vorher Gerinnsel ausschliessen (Mit trans-Öso-echo oder CT)


Symptome des Vorhofflimmerns

ALFA-Studie: paroxysmal n=167; permanent/chronisch n=389



Levy S, et al. *Circulation* (1999) 99: 3028

Folgen des Vorhofflimmerns



Symptomklassifikation des AF

Score	Symptoms	Description
1	None	AF does not cause any symptoms
2a	Mild	Normal daily activity not affected by symptoms related to AF
2b	Moderate	Normal daily activity not affected by symptoms related to AF, but patient troubled by symptoms
3	Severe	Normal daily activity affected by symptoms related to AF
4	Disabling	Normal daily activity discontinued

© ESC 2024

Definition von Vorhofflimmern

Vorhofflimmern ist definiert als:

- die häufigste anhaltende Arrhythmie
- **supraventrikuläre** Arrhythmie
- absolut arrhythmisch
- **chaotische atriale Aktivierung** mit
- dadurch bedingter **Verschlechterung** der
mechanischen Vorhoffunktion
- Häufig tachykard und daher zusätzliche Symptome

Prädisponierende Faktoren



Equality in healthcare provision (gender, ethnicity, socioeconomic) (Class I)

Education for patients, families and healthcare professionals (Class I)

Patient-centred AF management with a multidisciplinary approach (Class IIa)



Comorbidity and risk factor management

Hypertension

Blood pressure lowering treatment (Class I)

Diabetes mellitus

Effective glycaemic control^a (Class I)

Heart failure

Diuretics for congestion (Class I)

Appropriate HFrEF medical therapy (Class I)

SGLT2 inhibitors (Class I)

Overweight or obese

Weight loss (target 10%)^a (Class I)

Bariatric surgery if rhythm control^a (Class IIb)

BMI Ziel <27kg/m²

Obstructive sleep apnoea

Management of OSA^a (Class IIb)

Exercise capacity

Tailored exercise programme (Class I)

Alcohol


Reduce to ≤3 drinks per week (Class I)

Other risk factors/ comorbidities


Identify and manage aggressively^a (Class I)

Ziel RR <130/80mmHg

Stadien des Vorhofflimmerns



Krankheitsprogression (AF begets AF)...



Merz-MRI vom linken Vorhof

Blau: gesundes Myokard

Grün: Fibrose

Utah-Stadien: Ausmass der LA Fibrose

Weitere Schritte bei unserem Patienten

- Tachykardes symptomatisches Vorhofflimmern
- HFrEF -> **Koronarographie** → **KEINE** signifikanten Stenosen
- Ziel: Rhythmuskontrolle (Sinusrhythmus)

Vorteile der frühen Rhythmuskontrolle

The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE

ESTABLISHED IN 1812

OCTOBER 1, 2020

VOL. 383 NO. 14

Early Rhythm-Control Therapy in Patients with Atrial Fibrillation

P. Kirchhof, A.J. Camm, A. Goette, A. Brandes, L. Eckardt, A. Elyan, T. Fetsch, I.C. van Gelder, D. Haase, L.M. Haegeli, F. Hamann, H. Heidbüchel, G. Hindricks, J. Kautzner, K.-H. Kuck, L. Moni, G.A. Ng, J. Rekosz, N. Schoen, U. Schotten, A. Sillig, J. Taggeselle, S. Themistoclakis, E. Vettorazzi, P. Vardas, K. Wegscheider, S. Willems, H.J.G.M. Crijns, and G. Breithardt, for the EAST-AFNET 4 Trial Investigators^{1,2}

BACKGROUND

Despite improvements in the management of atrial fibrillation, patients with this condition remain at increased risk for cardiovascular complications. It is unclear whether early rhythm-control therapy can reduce this risk.

METHODS

In this international, investigator-initiated, parallel-group, open, blinded-outcome-assessment trial, we randomly assigned patients who had early atrial fibrillation (diagnosed ≤ 1 year before enrollment) and cardiovascular conditions to receive either early rhythm control or usual care. Early rhythm control included treatment with antiarrhythmic drugs or atrial fibrillation ablation after randomization. Usual care limited rhythm control to the management of atrial fibrillation-related symptoms. The first primary outcome was a composite of death from cardiovascular causes, stroke, or hospitalization with worsening of heart failure or acute coronary syndrome; the second primary outcome was the number of nights spent in the hospital per year. The primary safety outcome was a composite of death, stroke, or serious adverse events related to rhythm-control therapy. Secondary outcomes, including symptoms and left ventricular function, were also evaluated.

RESULTS

In 135 centers, 2789 patients with early atrial fibrillation (median time since diagnosis, 36 days) underwent randomization. The trial was stopped for efficacy at the third interim analysis after a median of 5.1 years of follow-up per patient. A first-primary-outcome event occurred in 249 of the patients assigned to early rhythm control (3.9 per 100 person-years) and in 316 patients assigned to usual care (5.0 per 100 person-years) (hazard ratio, 0.79; 95% confidence interval, 0.66 to 0.94; $P=0.005$). The mean (\pm SD) number of nights spent in the hospital did not differ significantly between the groups (5.8 ± 21.9 and 5.1 ± 15.5 days per year, respectively; $P=0.23$). The percentage of patients with a primary safety outcome event did not differ significantly between the groups; serious adverse events related to rhythm-control therapy occurred in 4.9% of the patients assigned to early rhythm control and 1.4% of the patients assigned to usual care. Symptoms and left ventricular function at 2 years did not differ significantly between the groups.

CONCLUSIONS

Early rhythm-control therapy was associated with a lower risk of adverse cardiovascular outcomes than usual care among patients with early atrial fibrillation and cardiovascular conditions. (Funded by the German Ministry of Education and Research and others; EAST-AFNET 4 ISRCTN number, ISRCTN04708680; ClinicalTrials.gov number, NCT01289352; EudraCT number, 2010-021258-20.)



No. at Risk

Usual care	1394	1169	888	405	34
Early rhythm control	1395	1193	913	404	26

Figure 2. Aalen-Johansen Cumulative-Incidence Curves for the First Primary Outcome.

The first primary outcome was a composite of death from cardiovascular causes, stroke, or hospitalization with worsening of heart failure or acute coronary syndrome.

Therapie des Vorhofflimmerns

Primäre Ziele

- Verminderung des Auftretens von thrombembolischen Ereignissen (Antikoagulation)
- Reduktion der Symptome (Rhythmuskontrolle oder Frequenzkontrolle)

Sekundäre Ziele

- Erhaltung des Sinusrhythmus (Rhythmuskontrolle)
- Verbesserung der Herzleistung
 - z.B. bei Tachykardiomyopathie-komponente
- Verbesserung des Überlebens?
 - CASTLE-AF NEJM 2018
 - EAST-AF Net4 NEJM 2020
 - CASTLE-HTX NEJM 2023
 - SELECT Trial NEJM 2023

Therapie-Optionen («Tools»)

Kardioversion

- Medikamentös \leftrightarrow Elektrisch (EKV)

Prävention eines erneuten Auftretens von AF (Rhythmuskontrolle)

- Antiarrhythmika (z.B., Amiodaron, Flecainid, Sotalol)
- Katheter-Ablation (Pulmonalvenenisolation)
- Lifestylemassnahmen (v.a. Gewichtsreduktion, Blutdruckeinstellung, CPAP etc.)

Kontrolle der ventrikulären Frequenz (Frequenzkontrolle)

- Medikamente (Betablocker, Calciumantagonisten, Digitalis)
- Last resort: Chirurgische Ablation oder Schrittmacher-Implantation und AV-Knoten-Ablation („Pace and Ablate“)


Reduzierung des Thromboembolischen-Risikos

- Orale Antikoagulantien
- Vorhofsohr-Verschluss nur bei absoluter Kontraindikation für NOAK

2024 AF Guidelines – What's New?

Antikoagulation

Direkte orale Anticoagulantien



Weibliches Geschlecht abgeschafft!

HAS-BLED abgeschafft!

Problem bei Marcoumar --> INR kann zu hoch sein und muss immer überprüft werden

Marcoumar kann mehr Hirnblutungen auslösen

Antikoagulation – CHA₂DS₂ VA Score

Table 10 Updated definitions for the CHA₂DS₂-VA score


CHA ₂ DS ₂ -VA component		Definition and comments	Points awarded ^a
C	Chronic heart failure	Symptoms and signs of heart failure (irrespective of LVEF, thus including HFpEF, HFmrEF, and HFrEF), or the presence of asymptomatic LVEF ≤40%. ^{261–263}	1
H	Hypertension	Resting blood pressure >140/90 mmHg on at least two occasions, or current antihypertensive treatment. The optimal BP target associated with lowest risk of major cardiovascular events is 120–129/70–79 mmHg (or keep as low as reasonably achievable). ^{162,264}	1
A	Age 75 years or above	Age is an independent determinant of ischaemic stroke risk. ²⁶⁵ Age-related risk is a continuum, but for reasons of practicality, two points are given for age ≥75 years.	2
D	Diabetes mellitus	Diabetes mellitus (type 1 or type 2), as defined by currently accepted criteria, ²⁶⁶ or treatment with glucose lowering therapy.	1
S	Prior stroke, TIA, or arterial thromboembolism	Previous thromboembolism is associated with highly elevated risk of recurrence and therefore weighted 2 points.	2
V	Vascular disease	Coronary artery disease, including prior myocardial infarction, angina, history of coronary revascularization (surgical or percutaneous), and significant CAD on angiography or cardiac imaging. ²⁶⁷ OR Peripheral vascular disease, including: intermittent claudication, previous revascularization for PVD, percutaneous or surgical intervention on the abdominal aorta, and complex aortic plaque on imaging (defined as features of mobility, ulceration, pedunculation, or thickness ≥4 mm). ^{268,269}	1
A	Age 65–74 years	1 point is given for age between 65 and 74 years.	1

© ESC 2024

Akute Rhythmuskontrolle bei unserem Patienten

- Dauer des Vorhofflimmerns unklar-> TEE/CT: Ausschluss Thrombus
- Elektrokardioversion (EKV) in einen Sinusrhythmus
- **Anschliessende Medikation:**
 - ACE-I ausbauen, neu Bisoprolol, SGLT2 Inhibitor und Mineralocorticoidantagonist (antihypertensive Behandlung, Herzinsuffizienz)
 - CHA₂DS₂-VA Score 2 Punkte (Alter, AHT): Apixaban 5mg 2xd

Langfristige Rhythmuskontrolle



Class I indication if tachycardiomyopathy is considered

VHF mit HFrEF

Rhythmuskontrolle mittels Ablation ist AAD und Frequenzkontrolle überlegen

Table 6 Continued

	PABA-CHF ³⁰¹	MacDonald et al. ³⁰²	ARC-HF ³⁰³	CAMTAF ²⁵¹	AATAC ²⁵⁵	CAMERA-MRI ²⁵⁰	AMICA ³⁰⁴	CASTLE-AF ²⁵⁶	CABANA subanalysis ²⁵⁷	RAFT-AF ²⁵³	CASTLE HTx ²⁶⁰
Main findings	Improved composite endpoint	No LVEF improvement	Significant increase in peak O ₂ consumption	LVEF improvement	Reduction in AF recurrence, unplanned hospitalizations, and mortality	LVEF improvement	No LVEF improvement	Reduction in all-cause death or HF hospitalization	Reduction in the primary composite, reduction in all-cause mortality, and improvement in QoL	Similar primary outcome (P = 0.066) Increase in LVEF	Reduction in the primary composite endpoint


LVEF Verbesserung durch Ablation: 13-16%

Evt. Mortalitätsbenefit durch Ablation

Tachycardiomyopathiekomponente – Prädiktoren der LVEF Verbesserung nach Ablation

- VHF vor HF oder simultan
- Persistierendes (rasches) VHF
- Keine ischämische Cardiomyopathie
- Kein LGE im MRI (weder Ventrikel noch Vorhöfe)
- “*Antwerp Score*” (schlanker QRS, unbekannte Ursache der HFrEF, LAVI <50ml/m², persistierendes VHF)



AF - auslösende ektope Trigger




Trigger sind oft in den Lungenvenen --> man ablatiert diese

Haïssaguerre M, et al. *N Engl J Med* (1998) 339: 659

Pulmonalvenenisolation



12-Kanal EKG nach Ablation: Sinusrhythmus



Follow-Up unseres Patienten:

Erfolgreiche Pulmonalvenenisolation mit PFA

Nachkontrolle 12 Monate nach Ablation

Klinisch: kardiopulmonal kompensiert. BD 138/92mmHg, HF 62/min,. Regelmässig.

EKG und Holter: durchgehender Sinusrhythmus. Kein Vorhofflimmern.

Deutliche Besserung der Leistungsfähigkeit und Lebensqualität.

DOAK weiter bei erhöhtem CHADS-VA Score

TTE: **Normalisierung** der systolischen LV Funktion auf 50%, allerdings weiterhin diastolische Dysfunktion Grad I bei hypertensiver Kardiopathie

Blutverdünnung trotzdem noch weitergeben, da es trotzdem protektiv ist gegen andere Auslöser eines Schlaganfalls und da man nicht ausschliessen kann, dass er nicht wieder ein Vorhofflimmern hat



Follow-Up unseres Patienten:

Prozedere:

- Optimierung der Blutdruckeinstellung (Ziel $<130/80\text{mmHg}$; ACE-I ausbauen, SGLT2-Inhibitor bei HFpEF) und Gewichtsreduktion (Ziel BMI $<27\text{kg/m}^2$)
- Regelmässige (jährliche) Kontrollen