

# 5. Modelos de Distribución

1. Distribución Binomial
2. Distribución de Poisson
3. Distribución Normal
4. Combinación lineal de normales
5. Teorema Central del Límite
6. Aproximaciones por la normal

# Distribución de probabilidad

- Una distribución de probabilidad define el comportamiento de una variable aleatoria.
  - Ejemplo: en el caso discreto especifica todos los valores posibles de la v.a. y la probabilidad de que ocurra cada uno de ellos.
- Toda v.a. tiene una distribución de probabilidad (conocida o desconocida).
- Distribuciones teóricas (se dan en realidad):
  - Discretas: Binomial, Poisson, Hipergeométrica, Uniforme, ...
  - Continuas: Normal, Exponencial, Uniforme, Gamma, Beta, ...
- Distribuciones en el muestreo:
  - $t$  de Student,  $\chi^2$ ,  $F$  de Snedecor, ...

# Distribución de Bernoulli

- Una v.a.  $X$  tiene una distribución de Bernoulli de parámetro  $p$  si su función de cuantía es

$X$	0	1
$f$	$q$	$p$

- Se trata de una prueba básica, donde la probabilidad de 1 (éxito) es  $p$  y la de 0 (fracaso) es  $q$ .
- $p + q = 1$
- Ejemplo: en el lanzamiento de un dado precisamos un 6 para ganar.

$X$	0	1
$f$	$5/6$	$1/6$

- Parámetros:

- $E(X) = p; \quad \text{Var}(X) = pq$  (demo)
- $\psi(t) = E(e^{tX}) = p \cdot e^t + q, -\infty < t < \infty$

# Distribución Binomial

- Una v.a. tiene una distribución Binomial con parámetros  $(n, p)$  si está formada por la suma de  $n$  pruebas de Bernoulli de parámetro  $p$ .
  - Si tenemos una muestra  $\{X_i\}_1^n$  consistente en  $n$  pruebas de Bernoulli, entonces la v.a.  $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$  tiene una distribución Binomial  $X \sim B(n, p)$
- Ejemplo: en un colegio la probabilidad de que un niño contraiga la gripe en un año es de 0'3. Considerar un aula con 20 niños.
  - El nº  $X$  de niños con gripe viene dado por:  $X \sim B(20, 0'3)$
  - $X$  mide el número de “éxitos” (contraer gripe), por lo que  $Y$  medirá el número de “fracasos” (no contraer gripe), por tanto:

$$X + Y = 20$$

# Distribución Binomial

- Parámetros:

- Función de cuantía

$$f(x) = \begin{cases} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, & x \in \{0, 1, 2, \dots, n\} \\ 0, & \text{resto} \end{cases}$$

- $E(X) = np$ ;  $\text{Var}(X) = npq$

- $\psi(t) = \prod_1^n E(e^{tX_i}) = (p \cdot e^t + q)^n, -\infty < t < \infty$

- T<sup>ma</sup>: Sean  $k$  v.a.  $X_1, X_2, \dots, X_k$  independientes cada una con distribución binomial  $X_i \sim B(n_i, p)$ , entonces

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_k \sim B(n_1 + n_2 + \dots + n_k, p)$$

- Ejemplo:  $n^\circ$  de caras en el lanzamiento de 4 monedas +  $n^\circ$  de caras en el lanzamiento de 6 monedas: binomial del lanzamiento de 10 monedas

# Tabla Binomial

$$\text{Binomial } B(n, p) : F(k) = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} p^i q^{n-i}$$

n	k	0.01	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	1/3	0.35	0.40	0.45	0.50
1	0	0.9990	.9500	.9000	.8500	.8000	.7500	.7000	.6667	.6500	.6000	.5500	.5000
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	0	.9801	.9025	.8100	.7225	.6400	.5625	.4900	.4444	.4225	.3600	.3025	.2500
	1	.9999	.9975	.9900	.9775	.9600	.9375	.9100	.8889	.8775	.8400	.7975	.7500
	2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	0	.9703	.8574	.7290	.6141	.5120	.4219	.3430	.2963	.2746	.2160	.1664	.1250
	1	.9997	.9928	.9720	.9393	.8960	.8438	.7840	.7407	.7183	.6480	.5748	.5000
	2	1	.9999	.9990	.9966	.9920	.9844	.9730	.9630	.9571	.9360	.9089	.8750
	3		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	0	.9606	.8145	.6561	.5220	.4096	.3164	.2401	.1975	.1785	.1296	.0915	.0625
	1	.9994	.9860	.9477	.8905	.8192	.7383	.6517	.5926	.5630	.4752	.3910	.3125
	2	1	.9995	.9963	.9880	.9728	.9492	.9163	.8889	.8735	.8208	.7585	.6875
	3		1	.9999	.9995	.9984	.9961	.9919	.9877	.9850	.9744	.9590	.9375
	4			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

# Tabla Binomial

- La tabla representa la función de distribución  $F(k) = P(X \leq k)$  de una v.a. binomial  $X \sim B(n, p)$
- Alcanza valores hasta  $n = 30$ . Para valores mayores aproximar por Poisson, la Normal o, si es posible, hacer el cálculo directo.
- La prob.  $p$  aparece desde 0'01 hasta 0'50. Si  $p > 0'50$  (no aparece en la tabla), entonces cambiar por  $Y$  ya que  $X + Y = n$  y  $p + q = 1$ . Por tanto:  $Y \sim B(n, q)$ , donde  $q < 0'50$ .
- Para  $P(X \leq k) = F(k) \rightarrow$  [tablas]
- Para  $P(X > k) = 1 - P(X \leq k) = 1 - F(k) \rightarrow$  [tablas]
- Para  $P(X = k) = P(X \leq k) - P(X \leq k - 1) = F(k) - F(k - 1) \rightarrow$  [tablas]
  - En este caso es fácil también usar  $f(x)$  directamente.

# Problema 5.1

- Sea  $X \sim B(3, 0.2)$ .
  - a) Calcular  $P(X \leq 2)$ .
  - b) Calcular  $P(X > 2)$ .
  - c) Calcular  $P(X = 2)$ .



# Problema 5.2

- La probabilidad de que una persona adulta no sea hipertensa es de 0'7. Si tomamos 4 personas, calcular la probabilidad de que menos de 2 no sean hipertensas.

# Problema 5.3

- Se lanzan 20 monedas; calcular:
  - a) Probabilidad de obtener 14 caras.
    - Resolver mediante tablas.
    - Resolver usando la función de cuantía.
    - Resolver con Laplace.
  - b) Probabilidad de obtener al menos 14 caras.

# Distribución de Poisson

- La distribución de Poisson mide el número de ocurrencias por unidad de medida.
  - La v.a. es discreta y toma valores enteros 0, 1, 2, ...
  - Ejemplos: número de clientes que entran en un establecimiento por hora; defectos por metro en un rollo de tela; despegues de aviones por día; etc.
- El número de ocurrencias es proporcional a la unidad de medida.
- Las ocurrencias deben ser independientes.

# Distribución de Poisson

- Una v.a.  $X$  tiene una distribución de Poisson  $X \sim P(\lambda)$  con media  $\lambda > 0$  si es una v.a. discreta con función de cuantía:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^x}{x!}, & x \in \{0, 1, 2, \dots\} \\ 0, & \text{resto} \end{cases}$$

- Ejemplo: el número de descargas por hora de un archivo en un servidor sigue una distribución de Poisson de media 20 por hora.
  - $X \sim P(20)$  en una hora
  - $X \sim P(40)$  en dos horas
  - Las descargas son independientes.

# Distribución de Poisson

- Parámetros:
  - f.g.m.:  $\psi(t) = e^{\lambda(e^t - 1)}$
  - Media:  $E(X) = \psi'(0) = \lambda$
  - Varianza:  $\text{Var}(X) = \psi''(0) - \psi'(0)^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$
- T<sup>ma</sup>: Sean  $k$  v.a.  $X_1, X_2, \dots, X_k$  independientes cada una con distribución de Poisson  $X_i \sim P(\lambda_i)$ , entonces
$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_k \sim P(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_k)$$
  - Ejemplo: el número de hombres que entran en una gasolinera por hora es  $X \sim P(25)$  y el número de mujeres es  $Y \sim P(30)$ , luego el número de personas que entran en una gasolinera es  $X + Y \sim P(55)$

# Tabla de Poisson

$$\text{Poisson } P(\lambda) : F(k) = \sum_{i=0}^k e^{-\lambda} \frac{\lambda^i}{i!}$$

<b>k / λ</b>	<b>0.1</b>	<b>0.2</b>	<b>0.3</b>	<b>0.4</b>	<b>0.5</b>	<b>0.6</b>	<b>0.7</b>	<b>0.8</b>	<b>0.9</b>	<b>1</b>
0	.9048	.8187	.7408	.6703	.6065	.5488	.4966	.4493	.4066	.3679
1	.9953	.9825	.9631	.9384	.9098	.8781	.8442	.8088	.7725	.7358
2	.9998	.9989	.9964	.9921	.9856	.9769	.9659	.9526	.9371	.9197
3	1	.9999	.9997	.9992	.9982	.9966	.9942	.9909	.9865	.9810
4		1	1	.9999	.9998	.9996	.9992	.9986	.9977	.9963
5				1	1	1	.9999	.9998	.9997	.9994
6							1	1	1	.9999
7										1
<b>k / λ</b>	<b>1.1</b>	<b>1.2</b>	<b>1.3</b>	<b>1.4</b>	<b>1.5</b>	<b>1.6</b>	<b>1.7</b>	<b>1.8</b>	<b>1.9</b>	<b>2</b>
0	.3329	.3012	.2725	.2466	.2231	.2019	.1827	.1653	.1496	.1353
1	.6990	.6626	.6268	.5918	.5578	.5249	.4932	.4628	.4337	.4060
2	.9004	.8795	.8571	.8335	.8088	.7834	.7572	.7306	.7037	.6767
3	.9743	.9662	.9569	.9463	.9344	.9212	.9068	.8913	.8747	.8571
4	.9946	.9923	.9893	.9857	.9814	.9763	.9704	.9636	.9559	.9473
5	.9990	.9985	.9978	.9968	.9955	.9940	.9920	.9896	.9868	.9834
6	.9999	.9997	.9996	.9994	.9991	.9987	.9981	.9974	.9966	.9955
7	1	1	.9999	.9999	.9998	.9997	.9996	.9994	.9992	.9989
8			1	1	1	1	.9999	.9999	.9998	.9998
9							1	1	1	1

# Tabla de Poisson

- La tabla representa la función de distribución  $F(k) = P(X \leq k)$  de una v.a. de Poisson  $X \sim P(\lambda)$
- Alcanza valores de  $n = 21$ . Para valores mayores aproximar por la Normal o, si es posible, hacer el cálculo directo.
- Para  $P(X \leq k) = F(k) \rightarrow$  [tablas]
- Para  $P(X > k) = 1 - P(X \leq k) = 1 - F(k) \rightarrow$  [tablas]
- Para  $P(X = k) = P(X \leq k) - P(X \leq k - 1) = F(k) - F(k - 1) \rightarrow$  [tablas]
  - En este caso también es rápido usar  $f(x)$  directamente.

# Problema 5.4

- Sea  $X \sim P(1'5)$ .
  - a) Calcular  $P(X \leq 3)$ .
  - b) Calcular  $P(X > 2)$ .
  - c) Calcular  $P(X = 2)$ .



# Problema 5.5

- El número de identificaciones con certificado en un servidor web sigue una distribución de Poisson de media 10 por minuto. Calcular:
  - a) Probabilidad de que en un minuto no se identifiquen más de 20 usuarios.
  - b) Probabilidad de que en dos minutos se identifiquen 8 usuarios.
  - c) Probabilidad de que en 15 segundos no acceda nadie.

# Aproximación de la Binomial por Poisson

- Relación entre la Binomial y la de Poisson:
  - Dada una v.a. con distribución de Poisson, se toman  $n$  intervalos sobre la medida de manera que en cada intervalo sólo tengamos como máximo una ocurrencia.
    - ⇒ Cada ocurrencia tendrá la misma probabilidad  $p$ , y como son independientes la probabilidad de un intervalo será  $n \cdot p = \lambda$ .
  - $X \sim B(n, p) \rightarrow X \sim P(np)$
  - Se utiliza para Binomiales con  $n$  grande ( $>30$ ).
  - La aproximación es buena para  $p < 0'5$  y  $np < 5$  ( $p$  pequeña).

# Problema 5.6

- La probabilidad de éxito de un correo electrónico malicioso (con virus) es de 0'02. Si se envía a 100 personas, calcular la probabilidad de que se infecten exactamente 5 incautos.