Lezione 21

Punti a tenerne verticale

Punti a tangente verticale

Definizione Si dice che f ha in x_0 un pt a Tg verticale se in x_0 il limite del rapp incrementale è $\pm\infty$, ovvero:

$$\boxed{\lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = \begin{matrix} +\infty \\ \text{oppure} \\ -\infty \end{matrix}} \quad \text{Quindi} \quad \boxed{\frac{d}{dx} f(x) = \pm\infty}$$

Osservazione Se $f'(x_0)=+\infty$, poiché $f'(x_0) = \mathrm{tg}\,\alpha$ dove α è l'angolo formato dalla tg alla curva rispetto all'asse x.



Se la tangente, quindi la derivata è zero, vuol dire che la tg è parallela ad x; questo accade quando $\alpha = \frac{\pi}{2}$:

$$\alpha = \frac{\pi}{2} \iff \text{la tg } (f(x)) \text{ è parallela a } y$$

di conseguenza la tg avrà eq: $x = x_0$.

In questo punto non sappiamo come si comporta la funzione, ma sappiamo che è un punto di non derivabilità; infatti, per essere derivabile in x_0, $f(x)$ deve avere il lim Rapp incr ($h\to 0$) esistente e FINITO.

Se $\frac{d}{dx} f(x_0) = +\infty \iff \begin{cases} f'_+(x_0) = +\infty \to \\ f'_-(x_0) = +\infty \end{cases}$

se considero un punto $x > x_0$ (a dx di x_0) si ha che $f'(x)$ è positiva $\iff$ l'angolo formato dalla tg in x alla curva forma angolo compreso tra 0 e $\pi/2$.





Caso in cui $f'(x)<0$

Se in x la deriv <0, significa che $x > \frac{\pi}{2}$





Inoltre $f'(x_0) = +\infty \iff tg(\alpha) = +\infty \iff \alpha = \frac{\pi}{2}$

Se considero $x < x_0$ si ha che $f'(x) > 0 \iff tg(\theta) > 0 \iff \theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$



Che vuol dire? Anche da Sx la tg deve essere $0 < tg < \frac{\pi}{2}$

Allora se $f'(x_0) = +\infty$ il grafico di $y = f(x)$ vicino a x_0, sarà del tipo:

α e $\alpha' < \frac{\pi}{2}$



Se $f'(x_0) = -\infty$, il comportamento di f vicino a x_0 sarà del tipo:



θ e $\theta > \frac{\pi}{2}$

ES: $y = \sqrt[3]{x}$ in $x_0 = 0$

$$f'(x) = \frac{d}{dx}\left(x^{\frac{1}{3}}\right) = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$$

Dove Non è def la $f'(x)$?
$D = \forall x \in \mathbb{R} - \{x = 0\}$

Calcoliamo il lim in $x_0 = 0$

$$\lim_{x \to 0} f'(x) = \lim_{x \to 0^{\pm}} \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

Punto a tangente Verticale



Il punto della funzione $y = \sqrt[3]{x}$ in corrispondenza di $x = 0$ è $O\,(0,0)$

🚩 00:31

Cuspidi

f ha in x_0 una cuspide se $f'_+(x_0) = \pm\infty$ e $f'_-(x_0) = \mp\infty$ — Segno opposto

Ad esempio, se $f'_+(x_0) = +\infty$ e $f'_-(x_0) = -\infty \Rightarrow$ l'angolo formato dalla tangente (verticale) in un punto a Dx di x_0 è tale che $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$; in questo caso a Sx l'angolo θ della tg in un pto a Sx di x_0 e tale che $\theta \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$:



❗ Le cuspidi sono molto frequenti quando abbiamo i valori assoluti o radici.

ES: $y = \sqrt{|x|} = \begin{cases} \sqrt{x} = x^{1/2} & \text{se } x \geq 0 \\ \sqrt{-x} = -x^{1/2} & \text{se } x < 0 \end{cases}$

$f'(x^{1/2}) = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow \lim\limits_{x \to 0^+} \frac{1}{2\sqrt{x}} = +\infty$ A DX

$f'(-x^{1/2}) = -\frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} = -\frac{1}{2\sqrt{-x}} \quad \lim\limits_{x \to 0^-} -\frac{1}{2\sqrt{-x}} = -\infty$ A SX



Come disegnamo il grafico?

1) Calcoliamo l'ordinata nel punto 0:

Se $x = 0$, quanto vale $f(0)$? $\Rightarrow f(0) = \sqrt{|0|} = 0 \qquad P = (0, 0)$

00:50

Estremi Relativi — Max e min Relativi

f e' definita in un Intervallo I
x_0 e' un pto di massimo assoluto $\Leftrightarrow$ $f(x) \le f(x_0)$ $\forall x \in I$



$x = a$ e' un punto di Max Assoluto perche' $f(x) \le f(a)$ $\forall x \in [a,b]$ (I)

Stessa cosa per il minimo assoluto. $f(x) \ge f(x_1)$ $\forall x \in [a,b]$

Possiamo avere un Massimo/min Relativo, se in x_0 abbiamo un punto di Max/min relativa al suo intorno. Ad esempio, in $x = x_2$ abbiamo un Max relativo.

Def Si dice che x_0 e' un pto di Max/min relativo per f $\Leftrightarrow$ $\exists\, I(x_0)$ / $f(x) \underset{\geq}{\leq} (x_0)$, $\forall x \in I(x_0)$

Osservazione I Max e min Assoluti sono da ricercare tra i punti di max o min relativo, ed agli estremi dell'intervallo, che non possono essere estremi relativi.

Quindi non possiamo avere Max/min relativi agli estremi perchè dobbiamo avere un INTORNO, e non solo Dx o Sx.