

Znajdowanie zer wielomianu w postaci Beziiera za
pomocą przycinania sześciennego

Maciej Pacut

Wrocław 2010

0.1 Wstęp

!!!!!!! Wstęp napisz na końcu, powinien on opisywać, co zostanie zawarte w pracy.

Jakie zastosowania ma znajdowanie zer? Szukanie przecięcia krzywej z prostą. Szukanie najbliższych punktów na prostej. Niniejsza praca daje pogląd na to, czym jest szukanie zer wielomianu i jak napisać metodę szukania zer.

0.2 Numeryczne znajdowanie zer

0.2.1 Znajdowanie jednego zera

Metoda znajdowania jednego zera funkcji dostaje argumenty:

1. pewien opis funkcji f , który umożliwia obliczenie wartości tej funkcji dla dowolnego argumentu
2. przedział początkowy P_0 , czyli przedział w którym szukamy zera funkcji f ; metoda nie znajdzie żadnego zera spoza tego przedziału
3. żądana dokładność ε znalezienia zera funkcji f

Metoda numerycznego znajdowania jednego zera funkcji f generuje ciąg przedziałów $\langle P_0, P_1, \dots, P_n \rangle$ o własnościach:

1. każdy przedział jest podprzedziałem poprzedniego przedziału:

$$P_k \subset P_{k-1} \quad (1 \leq k \leq n)$$

2. każdy przedział zawiera zero funkcji f z przedziału P_0

Adnotacja na dole strony: odnośnie zbioru pustego. Jeśli w przedziale P_0 nie ma zera funkcji f to stwierdzenie, że przedział pusty (porażka) zawiera zero funkcji f z przedziału P_0 jest prawdziwe.

3. ostatni przedział P_n jest pierwszym przedziałem krótszym niż 2ε

Jeśli w przedziale P_0 metoda nie znalazła zera, to ostatnim przedziałem w ciągu jest przedział pusty; wtedy wynikiem jest brak zer. W przeciwnym przypadku wynikiem jest środek przedziału P_n , który jest odległy od zera funkcji f o co najwyżej ε . W przypadku istnienia zera w przedziale P_0 , udało się znaleźć zero funkcji f z dokładnością ε .

Przedstawiony został w powyższym schemacie pewien zbiór metod znajdowania jednego zera funkcji f . Metody w tym zbiorze różnią się realizacją funkcji generującej ciąg $\langle P_0, P_1, \dots, P_n \rangle$. Generowanie ciągu można opisać w postaci szukania podprzedziału P_{k+1} dla danego przedziału P_k .

Przykładem metody znajdowania jednego zera funkcji jest bisekcja. W bisekcji przedział P_{k+1} otrzymuje się dzieląc P_k na pół i jako P_{k+1} wybierając

tę połowę, w której jest możliwość wystąpienia zera. W przypadku, gdy w żadnej połowie nie ma możliwości wystąpienia zera, P_{k+1} jest przedziałem pustym i metoda kończy działanie. W przypadku, gdy w obu połowach jest możliwość wystąpienia zera, jako P_{k+1} wybierana jest dowolna z połów. W bisekcji należy określić realizację operacji określającej możliwość wystąpienia zera w danym przedziale (w danej połowie przedziału P_k). Przykładową taką operacją jest sprawdzenie, czy funkcja f ma w końcach sprawdzanego przedziału różne znaki.

! rysunek bisekcji

W niniejszej pracy zajmujemy się inną metodą z wyżej przedstawionego zbioru metod szukania zer funkcji. Przykładem metody nie należącej do wyżej opisanego zbioru metod jest metoda Newtona. Znaczącą różnicą między metodą Newtona a metodami opisanymi wyżej jest generowanie ciągu przybliżeń zera funkcji zamiast generowania ciągu przedziałów zawierających zero.

0.2.2 Znajdowanie wielu zer

Zmodyfikujmy powyższy schemat znajdowania jednego zera. Zamiast generowania ciągu przedziałów, metoda szukania wielu zer generuje drzewo przedziałów. Drzewo przedziałów ma własności:

1. w korzeniu znajduje się przedział początkowy P_0
2. każdy potomek jest podprzedziałem swojego rodzica
3. przedział z każdego węzła zawiera zero funkcji f !! to niekoniecznie jest prawda
4. każdy liść L jest pierwszym przedziałem na ścieżce od korzenia do L , który ma długość mniejszą niż 2ε

Wynikiem jest zbiór środków niepustych przedziałów znajdujących się w liściach drzewa przedziałów.

!! Rysunek drzewa przedziałów w bisekcji przy dwóch podprzedziałach, rysunek drzewa przedziałów zdegenerowanego do listy !! Podpis do rysunku: W wypadku 1 zera drzewo może się degenerować do listy, którą można traktować jako ciąg z poprzedniego schematu.

Przedstawiony został w powyższym schemacie pewien zbiór metod znajdowania jednego zera funkcji f . Metody w tym zbiorze różnią się realizacją funkcji generującej drzewo przedziałów. Generowanie drzewa można opisać w postaci operacji znajdowania zbioru podprzedziałów (potomków) dla danego przedziału (rodzica).

Przykładem metody szukania wielu zer funkcji jest modyfikacja opisanej w poprzednim podrozdziale metody bisekcji. W przypadku gdy w obu połowach dzielonego przedziału jest możliwość wystąpienia zera, obie połowy są określane jako potomkowie przedziału.

!! Zdanie wielokrotnie złożone

Inną realizacją może być np. w przypadku wielomianów: izolacja zer. Zwykła metoda znajdowania zera ignoruje dodatkowe zera.

0.2.3 Szybkość metody znajdowania zer

!! big mess:

Należy odróżnić dwa sposoby porównywania szybkości metody. Pierwsza to zaimplementowanie metody w konkretnym języku programowania, za pomocą konkretnego kompilatora i uruchomienie jej na konkretnym procesorze z konkretną ilością cache'u, na konkretnym systemie operacyjnym, na którym pracują równolegle konkretne programy i zmierzenie czasu działania. Podobna metoda jest zliczenie operacji zmiennoprzecinkowych. Druga to matematyczne określenie szybkości metody.

W niniejszym rozdziale zajmiemy się drugim sposobem. Użycie notacji duże O jest bez sensu, gdyż stosunek liczby operacji do wielkości danych wejściowych może być bardzo różny. Przede wszystkim zależy od funkcji. Przykładowo, funkcje sklejane są opisywane b. dużą liczbą danych, jednak szukanie zer może pominąć wiele przedziałów. Dlatego dla pomiaru szybkości metod znajdowania zer używamy rzędu zbieżności, czyli jak z każdym krokiem kurczą się przedziały. Bierzymy pod uwagę tylko niektóre operacje, tj. obliczenie wartości funkcji w punkcie czy obliczenie pochodnej, resztę operacji traktując jako tanie. Krok jest liczony w zależności od liczby operacji znaczących.

0.3 Znajdowanie zer wielomianów

0.3.1 Zera wielomianów stopnia niższego niż 5

Istnieją wzory analityczne na zera wielomianów niskiego stopnia

Wzory na zera 2 i 3 napisać, 4 wspomnieć ze są.

Poprawianie wzorów. Wzory Viete'a. Dodatkowy krok metody Newtona.

0.3.2 Zera wielomianów dowolnego stopnia

* Wyższego stopnia należy szukać numerycznie ** <http://mathworld.wolfram.com/AbelsImpossibility>

Znajdowanie zer wielomianów nie jest jednak tak ogólnym zadaniem jak znajdowanie zer funkcji ciągłych. Możemy skorzystać z wielu własności wielomianów.

Gdy mamy informację, że funkcja, której zer szukamy jest wielomianem, możemy skorzystać z własności wielomianów do: * przyspieszenia metody * upewnienia się, że znajdujemy wszystkie zera ** ograniczenie na liczbę zer rzeczywistych - stopień ** ustalenie pewnego przybliżenia początkowego ** ciągłość 0..stopień-1 pochodnych

0.4 Wielomiany w formie Beziera

!! wiadomosci z ponizszego paragrafu powinnyenes potwierdzic źródłami albo chociaż sprawdzic ich poprawnosc w jakimś podręczniku.

Zbiór wielomianów stopnia nie większego niż n jest przestrzenią wektorową o wymiarze n . Każda przestrzeń liniowa ma nieskończoną liczbę baz. Jedną z baz wielomianów jest baza potęgowa $1, x, x^2, x^3, \dots, x^n$

Baza Bernsteina. Również jest bazą wielomianów, co oznacza, że każdy wielomian w bazie potęgowej ma odpowiadające przedstawienie w bazie Bernsteina.

Zastosowanie: krzywe i powierzchnie w programach CAD (także miejsce wymyslenia). Rysunek krzywej, rysunek powierzchni. W formie potęgowej nie ma wyraźnego powiązania geometrii wielomianu z jego współczynnikami.

Postać Beziera ma wiele ciekawych własności: * Otoczka wypukła. Krótki dowód jako kombinacja wypukła * Dzielenie przedziału. Algorytm de Casteljau. Poddziedzina. Rozszerzona definicja wielomianu Beziera ze względu na dziedzinę.

Znjdowanie wielu zer. Dzielenie przedziału na więcej części, gdy może wystąpić więcej niż 1 zero w przedziale (np. gdy jest zbyt długi, czyli przedział nie kurczy się tak szybko jak by to wynikało z szybkości zbieżności metody). Tutaj, rząd zbieżności metody to 2, więc dzielimy na dwie części w przypadku, gdy przedział się nie skurczył o połowę.

Metoda bezclip. Szybkość metody bezclip. Wykorzystujemy właściwości wielomianu: poddziedzina (do nowej otoczki wypukłej) Metoda pasuje do schematu w/w.

0.5 Aproksymacja wielomianu wielomianem

Bez wgłębiania się w samą aproksymację? Można przedstawić aproksymację jako zagadnienie geometryczne.

Przybliżenie wielomianu wysokiego stopnia wielomianem niskiego stopnia. "Redukcja stopnia".

Aproksymując wielomian upraszczamy go, tracąc informacje (punkty krańcowe,) ale jednocześnie zyskując możliwość łatwiejszego przetwarzania go.


Macierz redukcji. Obliczanie macierzy redukcji metodą Lewanowicza-Woźnego.

0.6 n-clip

Maksymalna różnica między wielomianami.

Podnoszenie stopnia.

Dwa wielomiany ograniczające.



Modyfikacja n-clip jest modyfikacją bisekcji. Wykorzystuje fakt, że funkcja, której zero szukamy jest wielomianem. Wykorzystujemy także pewne własności wielomianów Beziera tj. podział wielomianu w punkcie czy poddziedzina. (Potrzebne jest to przy wielokrotnym wykorzystaniu tej samej macierzy redukcji, zauważmy również, że po znalezieniu pierwszego zera nie warto szukać zera wielomianu $P(x)/(x-r_0)$, gdyż nie można wykorzystać tej samej macierzy redukcji)

0.6.1 cubicclipping

0.6.2 podsumowanie

!! na koncu

0.7 Dodatek 1: Operacje na przedziałach

- odejmowanie przedziałów od siebie