

Лабораторная работа № 3 «Приближенное вычисление интегралов»

Задание 1

Вычислить интеграл $\int_a^b f(x)dx$ с точностью $\varepsilon = 10^{-7}$, используя составные квадратурные формулы (КФ), указанные в варианте задания, и правило Рунге оценки погрешности. Сравнить полученные приближенные значения интеграла с точным значением I .

По результатам лабораторной работы оформляется отчет. В содержание отчета должна быть включена следующая информация:

- Применяемые составные квадратурные формулы.
- Правило Рунге оценки погрешности.
- Результаты вычислительного эксперимента, оформленные в виде таблицы 1.

Структура таблицы 1:

Квадратурная формула	Число разбиений	Шаг	Приближенное значение интеграла	Оценка погрешности	Абсолютная погрешность
КФ 1	$N = 2$ $2N = 4$ \vdots	$h = (b - a) / 2 =$ $h / 2 =$ \vdots	$Q_h =$ $Q_{h/2} =$ \vdots	$-$ $R_{h/2} =$ \vdots	$ I - Q_{h/2^{k+1}} =$
КФ 2	$N = 2$ $2N = 4$ \vdots	$h = (b - a) / 2 =$ $h / 2 =$ \vdots	$Q_h =$ $Q_{h/2} =$ \vdots	$-$ $R_{h/2} =$ \vdots	$ I - Q_{h/2^{k+1}} =$

- Выводы.
- Листинг программы с комментариями.

Задание 2

Вычислить приближенное значение интеграла из задания 1, используя квадратурную формулу наивысшей алгебраической степени точности (НАСТ) с k узлами.

В содержание отчета должна быть включена следующая информация:

- КФ НАСТ с k узлами.
- Приближенное значение интеграла, вычисленное с помощью КФ НАСТ. Сравнение с точным значением I .
- Выводы.
- Листинг программы с комментариями.

Варианты заданий

Номер варианта	Определенный интеграл	Составные квадратурные формулы	k	Точное значение I
1	$\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$	КФ трапеций, КФ Симпсона.	4	$\frac{\pi}{8} \ln 2$
2	$\int_0^{\pi/2} e^{-x} \cos^5 x dx$	КФ средних прямоугольников, КФ Симпсона.	5	$\frac{9}{26} \left(1 + \frac{2}{3} e^{-\pi/2} \right)$
3	$\int_0^{\pi/2} \frac{x + \sin^2 x}{1 + \cos x} dx$	КФ средних прямоугольников, КФ Симпсона.	4	$\pi - \ln 2 - 1$

4	$\int_0^{\pi/4} \frac{dx}{1+2\sin^2 x}$	КФ трапеций, КФ Симпсона.	5	$\frac{\pi}{3\sqrt{3}}$
5	$\int_0^7 \frac{dx}{\sqrt[3]{x+1}+1}$	КФ трапеций, КФ Симпсона.	4	$\frac{3}{2} - 3\ln \frac{2}{3}$
6	$\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{(3x+2)^2} dx$	КФ средних прямоугольников, КФ Симпсона.	5	$\frac{1}{15}(5\ln 5 - 11\ln 2)$
7	$\int_6^9 \sqrt{\frac{9-2x}{2x-21}} dx$	КФ средних прямоугольников, КФ Симпсона.	4	π
8	$\int_0^2 \frac{(x-1)^2}{x^2 + e^x + 1} dx$	КФ трапеций, КФ Симпсона.	5	$2 + \ln\left(\frac{2}{5+e^2}\right)$
9	$\int_0^{\pi/4} \left(\frac{\sin x - \cos x}{\sin x + \cos x}\right)^3 dx$	КФ трапеций, КФ Симпсона.	4	$\ln \sqrt{2} - \frac{1}{2}$
10	$\int_0^1 \frac{e^{\operatorname{arctg} x}}{(1+x^2)^{3/2}} dx$	КФ средних прямоугольников, КФ Симпсона.	5	$\frac{e^{\pi/4}}{\sqrt{2}} - \frac{1}{2}$