

بسم الله الرحمن الرحيم

برنامه‌ریزی نیمه‌معین برای طراحی الگوریتم‌های تقریبی

جلسه هفتم: دوگانی



مرور

قضیه نهایی دوگانی (برای برنامه نویسی نیمه معین)

$$\begin{array}{ll}\text{maximize} & C \bullet X \\ \text{subject to} & A_i \bullet X = b_i, \quad i = 1, 2, \dots, m \\ & X \succeq 0.\end{array}$$

4.1.1 Theorem. *If the semidefinite program (4.1) is feasible and has a finite value γ , and if there is a positive definite matrix \tilde{X} such that $A(\tilde{X}) = \mathbf{b}$, then the dual program*

$$\begin{array}{ll}\text{minimize} & \mathbf{b}^T \mathbf{y} \\ \text{subject to} & \sum_{i=1}^m y_i A_i - C \succeq 0\end{array} \tag{4.2}$$

is feasible and has finite value $\beta = \gamma$.

4.2.1 Definition. Let $K \subseteq V$ be a nonempty closed set.¹ K is called a *closed convex cone* if the following two conditions hold.

- (i) For all $\mathbf{x} \in K$ and all nonnegative real numbers λ , we have $\lambda\mathbf{x} \in K$.
- (ii) For all $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in K$, we have $\mathbf{x} + \mathbf{y} \in K$.

4.2.1 Definition. Let $K \subseteq V$ be a nonempty closed set.¹ K is called a *closed convex cone* if the following two conditions hold.

- (i) For all $\mathbf{x} \in K$ and all nonnegative real numbers λ , we have $\lambda\mathbf{x} \in K$.
- (ii) For all $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in K$, we have $\mathbf{x} + \mathbf{y} \in K$.

$$\langle \rangle = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, xy \geq z^2\}$$


(کنج بستنی وازگون) کنج محدب بسته است

4.2.1 Definition. Let $K \subseteq V$ be a nonempty closed set.¹ K is called a *closed convex cone* if the following two conditions hold.

- (i) For all $\mathbf{x} \in K$ and all nonnegative real numbers λ , we have $\lambda \mathbf{x} \in K$.
- (ii) For all $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in K$, we have $\mathbf{x} + \mathbf{y} \in K$.

$$\langle \rangle = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, xy \geq z^2\}$$

(کنج بستنی واژگون) کنج محدب بسته است




4.2.1 Definition. Let $K \subseteq V$ be a nonempty closed set.¹ K is called a *closed convex cone* if the following two conditions hold.

- (i) For all $\mathbf{x} \in K$ and all nonnegative real numbers λ , we have $\lambda \mathbf{x} \in K$.
- (ii) For all $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in K$, we have $\mathbf{x} + \mathbf{y} \in K$.

$$\triangleleft = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, xy \geq z^2\}$$

(کنج بستنی وازگون) کنج محدب بسته است

• الف) بسته




4.2.1 Definition. Let $K \subseteq V$ be a nonempty closed set.¹ K is called a *closed convex cone* if the following two conditions hold.

- (i) For all $\mathbf{x} \in K$ and all nonnegative real numbers λ , we have $\lambda \mathbf{x} \in K$.
- (ii) For all $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in K$, we have $\mathbf{x} + \mathbf{y} \in K$.

$$\langle \rangle = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, xy \geq z^2\}$$

(کنج بستنی وازگون) کنج محدب بسته است



• الف) بسته


• ب) ضرب

4.2.1 Definition. Let $K \subseteq V$ be a nonempty closed set.¹ K is called a *closed convex cone* if the following two conditions hold.

- (i) For all $\mathbf{x} \in K$ and all nonnegative real numbers λ , we have $\lambda \mathbf{x} \in K$.
- (ii) For all $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in K$, we have $\mathbf{x} + \mathbf{y} \in K$.

$$\triangleleft = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, xy \geq z^2\}$$

(کنج بستنی وازگون) کنج محدب بسته است



- الف) بسته
- ب) ضرب
- ج) جمع

مثبت نیمه معین

$$\begin{pmatrix} x & z \\ z & y \end{pmatrix}$$

معادلا •

SEPARATION:

Separating a closed convex cone
from a point by a hyperplane
[argument: closest point]

CONE PROGRAMS:

(P)

$$\max\{\langle \mathbf{c}, \mathbf{x} \rangle : \mathbf{b} - A(\mathbf{x}) \in L, \mathbf{x} \in K\}$$

(D)

$$\min\{\langle \mathbf{b}, \mathbf{y} \rangle : A^T(\mathbf{y}) - \mathbf{c} \in K^*, \mathbf{y} \in L^*\}$$

FARKAS LEMMA:

the system $A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \in K$
limit-feasible

XOR

$$\exists \mathbf{y} : A^T(\mathbf{y}) \in K^*, \langle \mathbf{b}, \mathbf{y} \rangle < 0$$

WEAK DUALITY

for cone programs:

$$\text{limit value of (P)} \leq \text{value (D)}$$

[easy]

REGULAR DUALITY

for cone programs:

$$\text{limit value of (P)} = \text{value of (D)}$$

$$\exists \text{ interior point}$$

$$\Rightarrow \text{limit value} = \text{value}$$

STRONG DUALITY

for cone programs:

(P) feasible, finite value,

interior point \Rightarrow

(D) feasible, same value

(also a version for
equational form)

$$(\text{PSD}_n)^* = \text{PSD}_n$$

SDP DUALITY:

$$\max\{C \bullet X : A_1 \bullet X = b_1, \dots, A_m \bullet X = b_m, X \succeq 0\}$$

feasible, finite value, interior point

 \Rightarrow

$$\min\{\mathbf{b}^T \mathbf{y} : y_1 A_1 + \dots + y_m A_m - C \succeq 0\} \text{ feasible, same value}$$

مسیر
پیش رو



دوگان کنج

4.3.1 Definition. *Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone. The set*

$$K^* := \{\mathbf{y} \in V : \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K\}$$

is called the dual cone of K .

4.3.1 Definition. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone. The set

$$K^* := \{\mathbf{y} \in V : \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K\}$$

is called the dual cone of K .

نکته: K^* یک کنج محدب بسته است.

4.3.1 Definition. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone. The set

$$K^* := \{\mathbf{y} \in V : \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K\}$$

is called the dual cone of K .

نکته: K^* یک کنج محدب بسته است.

• الف) بسته:

• \mathbf{y} خارج از K^* است که $\mathbf{y}^T \mathbf{x} < 0$.

• $\mathbf{y} + \mathbf{y}'$ برای $||\mathbf{y}'|| < 1$:

4.3.1 Definition. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone. The set

$$K^* := \{\mathbf{y} \in V : \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K\}$$

is called the dual cone of K .

نکته: K^* یک کنج محدب بسته است.

- الف) بسته:
- y خارج از K^* است که $y^T x < 0$.
- $y + y'$ برای $||y'|| < 1$:
- ب) ضرب

4.3.1 Definition. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone. The set

$$K^* := \{\mathbf{y} \in V : \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K\}$$

is called the dual cone of K .

نکته: K^* یک کنج محدب بسته است.

- الف) بسته:
- y خارج از K^* است که $x^T y < 0$.
- $y + y'$ برای $||y'|| < 1$:
- ب) ضرب
- ج) جمع
- $\langle y + y', x \rangle = \langle y, x \rangle + \langle y', x \rangle$

4.3.1 Definition. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone. The set

$$K^* := \{\mathbf{y} \in V : \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K\}$$

is called the dual cone of K .

4.3.1 Definition. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone. The set

$$K^* := \{\mathbf{y} \in V : \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K\}$$

is called the dual cone of K .

(\mathbb{R}_+^n) دوگان ربع اول

4.3.1 Definition. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone. The set

$$K^* := \{\mathbf{y} \in V : \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K\}$$

is called the *dual cone* of K .

(\mathbb{R}_+^n) دوگان ربع اول

$\{0\}$ دوگان

4.3.1 Definition. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone. The set

$$K^* := \{\mathbf{y} \in V : \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K\}$$

is called the dual cone of K .

دوگان ربع اول (\mathbb{R}_+^n)

دوگان $\{0\}$

دوگان \mathbb{R}^n

4.3.1 Definition. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone. The set

$$K^* := \{\mathbf{y} \in V : \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K\}$$

is called the dual cone of K .

4.2.3 Fact. Let $K \subseteq V$, $L \subseteq W$ be closed convex cones. Then

$$K \oplus L := \{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in V \oplus W : \mathbf{x} \in K, \mathbf{y} \in L\}$$

is again a closed convex cone, the direct sum of K and L .

$$(K \oplus L)^* = K^* \oplus L^*.$$

4.3.1 Definition. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone. The set

$$K^* := \{\mathbf{y} \in V : \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K\}$$

is called the dual cone of K .

4.2.3 Fact. Let $K \subseteq V$, $L \subseteq W$ be closed convex cones. Then

$$K \oplus L := \{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in V \oplus W : \mathbf{x} \in K, \mathbf{y} \in L\}$$

is again a closed convex cone, the direct sum of K and L .

$$(K \oplus L)^* = K^* \oplus L^*.$$

4.3.1 Definition. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone. The set

$$K^* := \{\mathbf{y} \in V : \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K\}$$

is called the dual cone of K .

دوگان کنج بستنی واژگون

$$\langle \rangle = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, xy \geq z^2\}$$

4.3.1 Definition. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone. The set

$$K^* := \{\mathbf{y} \in V : \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K\}$$

is called the dual cone of K .

دوگان کنج بستنی واژگون

$$\langle \rangle = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, xy \geq z^2\}$$

$$\langle \rangle^* = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, xy \geq \frac{z^2}{4}\} \subseteq \mathbb{R}^3.$$

4.3.1 Definition. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone. The set

$$K^* := \{\mathbf{y} \in V : \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K\}$$

is called the dual cone of K .

دوگان کنج بستنی واژگون

$$\triangleleft = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, xy \geq z^2\}$$

$$\triangleleft^* = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, xy \geq \frac{z^2}{4}\} \subseteq \mathbb{R}^3.$$

• الف) برای هر $\tilde{\mathbf{y}} = (\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z})$ که $\tilde{x} \geq 0, \tilde{y} \geq 0, \tilde{x}\tilde{y} \geq \tilde{z}^2/4$ و هر

$$\tilde{\mathbf{y}}^T \mathbf{x} \geq 0 \text{ داریم: } \mathbf{x} = (x, y, z) \in \triangleleft$$

دوگان کنج بستنی واژگون

$$\triangleleft = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, xy \geq z^2\}$$

$$\triangleleft^* = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, xy \geq \frac{z^2}{4}\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

• الف) برای هر $\tilde{\mathbf{y}} = (\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z})$ که $\tilde{x} \geq 0, \tilde{y} \geq 0, \tilde{x}\tilde{y} \geq \tilde{z}^2/4$ و هر

$$\tilde{\mathbf{y}}^T \mathbf{x} \geq 0 \text{ داریم: } \mathbf{x} = (x, y, z) \in \triangleleft$$

دوگان کنج بستنی واژگون

$$\triangleleft = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, xy \geq z^2\}$$

$$\triangleleft^* = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, xy \geq \frac{z^2}{4}\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

• الف) برای هر $\tilde{\mathbf{y}} = (\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z})$ که $\tilde{x} \geq 0, \tilde{y} \geq 0, \tilde{x}\tilde{y} \geq \tilde{z}^2/4$ و هر

$$\tilde{\mathbf{y}}^T \mathbf{x} \geq 0 \text{ داریم: } \mathbf{x} = (x, y, z) \in \triangleleft$$

$$\tilde{\mathbf{y}}^T \mathbf{x} = \tilde{x}x + \tilde{y}y + \tilde{z}z$$

دوگان کنج بستنی واژگون

$$\triangleleft = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, xy \geq z^2\}$$

$$\triangleleft^* = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, xy \geq \frac{z^2}{4}\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

• الف) برای هر $\tilde{\mathbf{y}} = (\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z})$ که $\tilde{x} \geq 0, \tilde{y} \geq 0, \tilde{x}\tilde{y} \geq \tilde{z}^2/4$ و هر

$$\tilde{\mathbf{y}}^T \mathbf{x} \geq 0 \text{ داریم: } \mathbf{x} = (x, y, z) \in \triangleleft$$

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{y}}^T \mathbf{x} &= \tilde{x}x + \tilde{y}y + \tilde{z}z \\ &= 2\frac{\tilde{x}x + \tilde{y}y}{2} + \tilde{z}z\end{aligned}$$

دوگان کنج بستنی واژگون

$$\triangleleft = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, xy \geq z^2\}$$

$$\triangleleft^* = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, xy \geq \frac{z^2}{4}\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

• الف) برای هر $\tilde{\mathbf{y}} = (\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z})$ که $\tilde{x} \geq 0, \tilde{y} \geq 0, \tilde{x}\tilde{y} \geq \tilde{z}^2/4$ و هر

$$\tilde{\mathbf{y}}^T \mathbf{x} \geq 0 \text{ داریم: } \mathbf{x} = (x, y, z) \in \triangleleft$$

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{y}}^T \mathbf{x} &= \tilde{x}x + \tilde{y}y + \tilde{z}z \\ &= 2\frac{\tilde{x}x + \tilde{y}y}{2} + \tilde{z}z \\ &\geq 2\sqrt{\tilde{x}x\tilde{y}y} + \tilde{z}z\end{aligned}$$

دوگان کنج بستنی واژگون

$$\triangleleft = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, xy \geq z^2\}$$

$$\triangleleft^* = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, xy \geq \frac{z^2}{4}\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

• الف) برای هر $\tilde{\mathbf{y}} = (\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z})$ که $\tilde{x} \geq 0, \tilde{y} \geq 0, \tilde{x}\tilde{y} \geq \tilde{z}^2/4$ و هر

$$\tilde{\mathbf{y}}^T \mathbf{x} \geq 0: \text{ داریم } \mathbf{x} = (x, y, z) \in \triangleleft$$

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{y}}^T \mathbf{x} &= \tilde{x}x + \tilde{y}y + \tilde{z}z \\&= 2\frac{\tilde{x}x + \tilde{y}y}{2} + \tilde{z}z \\&\geq 2\sqrt{\tilde{x}x\tilde{y}y} + \tilde{z}z \\&\geq 2\frac{|\tilde{z}|}{2}|z| + \tilde{z}z\end{aligned}$$

دوگان کنج بستنی واژگون

$$\triangleleft = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, xy \geq z^2\}$$

$$\triangleleft^* = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, xy \geq \frac{z^2}{4}\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

• الف) برای هر $\tilde{\mathbf{y}} = (\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z})$ که $\tilde{x} \geq 0, \tilde{y} \geq 0, \tilde{x}\tilde{y} \geq \tilde{z}^2/4$ و هر

$$\tilde{\mathbf{y}}^T \mathbf{x} \geq 0 \text{ داریم: } \mathbf{x} = (x, y, z) \in \triangleleft$$

• ب) برای $\tilde{\mathbf{y}} = (\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z})$ که $\tilde{x}\tilde{y} < \tilde{z}^2/4$ یا $\tilde{x} < 0$ یا $\tilde{y} < 0$ ، یک بردار (x, y, z) هست

که

$$\tilde{\mathbf{y}}^T \mathbf{x} < 0$$

$$\mathbf{x} = (\tilde{y}, \tilde{x}, \sqrt{\tilde{x}\tilde{y}}) \in \triangleleft \text{ یا } \mathbf{x} = (\tilde{y}, \tilde{x}, -\sqrt{\tilde{x}\tilde{y}}) \in \triangleleft.$$

دوگان کنج بستنی واژگون

$$\triangleleft = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, xy \geq z^2\}$$

$$\triangleleft^* = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, xy \geq \frac{z^2}{4}\} \subseteq \mathbb{R}^3.$$

• الف) برای هر $\tilde{\mathbf{y}} = (\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z})$ که $\tilde{x} \geq 0, \tilde{y} \geq 0, \tilde{x}\tilde{y} \geq \tilde{z}^2/4$ و هر

$$\tilde{\mathbf{y}}^T \mathbf{x} \geq 0 \text{ داریم: } \mathbf{x} = (x, y, z) \in \triangleleft$$

• ب) برای $\tilde{\mathbf{y}} = (\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z})$ که $\tilde{x}\tilde{y} < \tilde{z}^2/4$ یا $\tilde{x} < 0$ یا $\tilde{y} < 0$ ، یک بردار (x, y, z) هست

که

$$\tilde{\mathbf{y}}^T \mathbf{x} < 0$$

$$\mathbf{x} = (\tilde{y}, \tilde{x}, \sqrt{\tilde{x}\tilde{y}}) \in \triangleleft \text{ یا } \mathbf{x} = (\tilde{y}, \tilde{x}, -\sqrt{\tilde{x}\tilde{y}}) \in \triangleleft. \quad \bullet$$


$$\tilde{\mathbf{y}}^T \mathbf{x} = 2\tilde{x}\tilde{y} - \tilde{z}\sqrt{\tilde{x}\tilde{y}} < 2\tilde{x}\tilde{y} - 2\tilde{x}\tilde{y} = 0.$$



جداسازی


4.4.2 Theorem. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone, and let $\mathbf{b} \in V \setminus K$. Then there exists a vector $\mathbf{y} \in V$ such that

$$\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K, \text{ and } \langle \mathbf{y}, \mathbf{b} \rangle < 0.$$



4.4.2 Theorem. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone, and let $\mathbf{b} \in V \setminus K$. Then there exists a vector $\mathbf{y} \in V$ such that


$$\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K, \text{ and } \langle \mathbf{y}, \mathbf{b} \rangle < 0.$$



• z نزدیکترین نقطه به b در K

4.4.2 Theorem. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone, and let $\mathbf{b} \in V \setminus K$. Then there exists a vector $\mathbf{y} \in V$ such that


$$\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K, \text{ and } \langle \mathbf{y}, \mathbf{b} \rangle < 0.$$



- z نزدیکترین نقطه به b در K
- وجود دارد:

4.4.2 Theorem. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone, and let $\mathbf{b} \in V \setminus K$. Then there exists a vector $\mathbf{y} \in V$ such that


$$\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K, \text{ and } \langle \mathbf{y}, \mathbf{b} \rangle < 0.$$



- z نزدیکترین نقطه به b در K
- وجود دارد:
- $C = \text{اشتراک } K \text{ با یک گوی بزرگ، فشرده است}$

4.4.2 Theorem. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone, and let $\mathbf{b} \in V \setminus K$. Then there exists a vector $\mathbf{y} \in V$ such that


$$\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K, \text{ and } \langle \mathbf{y}, \mathbf{b} \rangle < 0.$$



- z نزدیک‌ترین نقطه به b در K
- وجود دارد:
- $C =$ اشتراک K با یک گوی بزرگ، فشرده است
- فاصله، روی C کمینه دارد.

4.4.2 Theorem. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone, and let $\mathbf{b} \in V \setminus K$. Then there exists a vector $\mathbf{y} \in V$ such that


$$\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K, \text{ and } \langle \mathbf{y}, \mathbf{b} \rangle < 0.$$



- z نزدیک‌ترین نقطه به b در K
- وجود دارد:
- $C =$ اشتراک K با یک گوی بزرگ، فشرده است
- فاصله، روی C کمینه دارد.
- فقط یک کمینه دارد

4.4.2 Theorem. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone, and let $\mathbf{b} \in V \setminus K$. Then there exists a vector $\mathbf{y} \in V$ such that


$$\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K, \text{ and } \langle \mathbf{y}, \mathbf{b} \rangle < 0.$$



- z نزدیک‌ترین نقطه به b در K
- وجود دارد:
- $C =$ اشتراک K با یک گوی بزرگ، فشرده است
- فاصله، روی C کمینه دارد.
- فقط یک کمینه دارد

4.4.2 Theorem. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone, and let $\mathbf{b} \in V \setminus K$. Then there exists a vector $\mathbf{y} \in V$ such that

$$\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K, \text{ and } \langle \mathbf{y}, \mathbf{b} \rangle < 0.$$



• z نزدیک‌ترین نقطه به b در K

• وجود دارد:

• $C =$ اشتراک K با یک گوی بزرگ، فشرده است


• فاصله، روی C کمینه دارد.

• فقط یک کمینه دارد

• C محدب است:

4.4.2 Theorem. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone, and let $\mathbf{b} \in V \setminus K$. Then there exists a vector $\mathbf{y} \in V$ such that

$$\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K, \text{ and } \langle \mathbf{y}, \mathbf{b} \rangle < 0.$$



• z نزدیک‌ترین نقطه به b در K

• وجود دارد:

• $C = K$ اشتراک K با یک گوی بزرگ، فشرده است

• فاصله، روی C کمینه دارد.


• فقط یک کمینه دارد

• C محدب است:

$$\|b - z - \alpha(y - z)\|^2$$

4.4.2 Theorem. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone, and let $\mathbf{b} \in V \setminus K$. Then there exists a vector $\mathbf{y} \in V$ such that

$$\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K, \text{ and } \langle \mathbf{y}, \mathbf{b} \rangle < 0.$$



• z نزدیک‌ترین نقطه به b در K

• وجود دارد:

• $C = \text{اشتراک } K \text{ با یک گوی بزرگ، فشرده است}$

• فاصله، روی C کمینه دارد.


• فقط یک کمینه دارد

• C محدب است:

$$\|b - z - \alpha(y - z)\|^2 = \|b - z\|^2 + \alpha^2\|y - z\|^2 - \alpha(b - z)^\top(y - z)$$

4.4.2 Theorem. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone, and let $\mathbf{b} \in V \setminus K$. Then there exists a vector $\mathbf{y} \in V$ such that

$$\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K, \text{ and } \langle \mathbf{y}, \mathbf{b} \rangle < 0.$$




• z نزدیک‌ترین نقطه به b در K

• $y = z - b$

4.4.2 Theorem. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone, and let $\mathbf{b} \in V \setminus K$. Then there exists a vector $\mathbf{y} \in V$ such that

$$\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K, \text{ and } \langle \mathbf{y}, \mathbf{b} \rangle < 0.$$



• z نزدیک‌ترین نقطه به b در K

• $y = z - b$

• نشان می‌دهیم:


• الف) $\langle y, z \rangle = 0$

• ب) $\langle y, b \rangle < 0$

• ج) $\langle y, x \rangle \geq 0$ برای x در K

4.4.2 Theorem. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone, and let $\mathbf{b} \in V \setminus K$. Then there exists a vector $\mathbf{y} \in V$ such that

$$\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K, \text{ and } \langle \mathbf{y}, \mathbf{b} \rangle < 0.$$



• z نزدیک‌ترین نقطه به b در K

• $y = z - b$

• نشان می‌دهیم:


• الف) $\langle y, z \rangle = 0$

• ب) $\langle y, b \rangle < 0$

$$\langle y, b \rangle = \langle y, z - y \rangle = \langle y, z \rangle - \langle y, y \rangle$$

4.4.2 Theorem. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone, and let $\mathbf{b} \in V \setminus K$. Then there exists a vector $\mathbf{y} \in V$ such that

$$\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K, \text{ and } \langle \mathbf{y}, \mathbf{b} \rangle < 0.$$



• z نزدیک‌ترین نقطه به b در K


• $y = z - b$

• نشان می‌دهیم:

• الف) $\langle y, z \rangle = 0$

4.4.2 Theorem. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone, and let $\mathbf{b} \in V \setminus K$. Then there exists a vector $\mathbf{y} \in V$ such that

$$\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K, \text{ and } \langle \mathbf{y}, \mathbf{b} \rangle < 0.$$



• z نزدیک‌ترین نقطه به b در K

• $y = z - b$


• نشان می‌دهیم:

• الف) $\langle y, z \rangle = 0$

$$\|b - z - \alpha z\|^2$$

4.4.2 Theorem. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone, and let $\mathbf{b} \in V \setminus K$. Then there exists a vector $\mathbf{y} \in V$ such that

$$\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K, \text{ and } \langle \mathbf{y}, \mathbf{b} \rangle < 0.$$



• z نزدیک‌ترین نقطه به b در K

• $y = z - b$


• نشان می‌دهیم:

• الف) $\langle y, z \rangle = 0$

$$\|b - z - \alpha z\|^2 = \|b - z\|^2 + \alpha^2 \|z\|^2 - 2\alpha(b - z)^\top z$$

4.4.2 Theorem. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone, and let $\mathbf{b} \in V \setminus K$. Then there exists a vector $\mathbf{y} \in V$ such that

$$\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K, \text{ and } \langle \mathbf{y}, \mathbf{b} \rangle < 0.$$



• z نزدیک‌ترین نقطه به b در K

• $y = z - b$

• نشان می‌دهیم:

• الف) $\langle y, z \rangle = 0$

• برای α کمی کوچکتر


از صفر یا کمی

بزرگ‌تر از صفر

$$\|b - z - \alpha z\|^2 = \|b - z\|^2 + \alpha^2 \|z\|^2 - 2\alpha(b - z)^T z$$

4.4.2 Theorem. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone, and let $\mathbf{b} \in V \setminus K$. Then there exists a vector $\mathbf{y} \in V$ such that

$$\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K, \text{ and } \langle \mathbf{y}, \mathbf{b} \rangle < 0.$$



• z نزدیک‌ترین نقطه به b در K

• $y = z - b$

• نشان می‌دهیم:


• الف) $\langle y, z \rangle = 0$

• ب) $\langle y, b \rangle < 0$

• ج) $\langle y, x \rangle \geq 0$ برای x در K

4.4.2 Theorem. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone, and let $\mathbf{b} \in V \setminus K$. Then there exists a vector $\mathbf{y} \in V$ such that

$$\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K, \text{ and } \langle \mathbf{y}, \mathbf{b} \rangle < 0.$$



• z نزدیک‌ترین نقطه به b در K

• $y = z - b$

• نشان می‌دهیم:


• الف) $\langle y, z \rangle = 0$

• ب) $\langle y, b \rangle < 0$

• ج) $\langle y, x \rangle \geq 0$ برای x در K

4.4.2 Theorem. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone, and let $\mathbf{b} \in V \setminus K$. Then there exists a vector $\mathbf{y} \in V$ such that

$$\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K, \text{ and } \langle \mathbf{y}, \mathbf{b} \rangle < 0.$$



$$\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle = \langle \mathbf{y}, \mathbf{z} + (\mathbf{x} - \mathbf{z}) \rangle$$

• z نزدیک‌ترین نقطه به b در K

• $\mathbf{y} = \mathbf{z} - \mathbf{b}$

• نشان می‌دهیم:


• الف) $\langle \mathbf{y}, \mathbf{z} \rangle = 0$

• ب) $\langle \mathbf{y}, \mathbf{b} \rangle < 0$

• ج) $\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0$ برای \mathbf{x} در K

4.4.2 Theorem. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone, and let $\mathbf{b} \in V \setminus K$. Then there exists a vector $\mathbf{y} \in V$ such that

$$\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K, \text{ and } \langle \mathbf{y}, \mathbf{b} \rangle < 0.$$



$$\begin{aligned} \langle y, x \rangle &= \langle y, z + (x - z) \rangle \\ &= \langle y, x - z \rangle \end{aligned}$$

• z نزدیک‌ترین نقطه به b در K

• $y = z - b$

• نشان می‌دهیم:


• الف) $\langle y, z \rangle = 0$

• ب) $\langle y, b \rangle < 0$

• ج) $\langle y, x \rangle \geq 0$ برای x در K

4.4.2 Theorem. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone, and let $\mathbf{b} \in V \setminus K$. Then there exists a vector $\mathbf{y} \in V$ such that

$$\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K, \text{ and } \langle \mathbf{y}, \mathbf{b} \rangle < 0.$$



• z نزدیک‌ترین نقطه به b در K

• $y = z - b$

• نشان می‌دهیم:

• الف) $\langle y, z \rangle = 0$

• ب) $\langle y, b \rangle < 0$

• ج) $\langle y, x \rangle \geq 0$ برای x در K


$$\langle y, x \rangle = \langle y, z + (x - z) \rangle$$

$$= \langle y, x - z \rangle$$

$$= \|b - z\|^2 + \alpha^2 \|x - z\|^2 - \alpha(b - z)^T(x - z)$$

4.4.2 Theorem. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone, and let $\mathbf{b} \in V \setminus K$. Then there exists a vector $\mathbf{y} \in V$ such that

$$\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K, \text{ and } \langle \mathbf{y}, \mathbf{b} \rangle < 0.$$



• z نزدیک‌ترین نقطه به b در K

• $y = z - b$

• نشان می‌دهیم:

• الف) $\langle y, z \rangle = 0$

• ب) $\langle y, b \rangle < 0$

• ج) $\langle y, x \rangle \geq 0$ برای x در K


$$\langle y, x \rangle = \langle y, z + (x - z) \rangle$$

$$= \langle y, x - z \rangle$$

$$\|b - (z + \alpha(x - z))\|^2 = \|b - z\|^2 + \alpha^2 \|x - z\|^2 - \alpha(b - z)^T(x - z)$$

4.4.2 Theorem. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone, and let $\mathbf{b} \in V \setminus K$. Then there exists a vector $\mathbf{y} \in V$ such that

$$\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K, \text{ and } \langle \mathbf{y}, \mathbf{b} \rangle < 0.$$



• z نزدیک‌ترین نقطه به b در K

• $y = z - b$

• نشان می‌دهیم:

• الف) $\langle y, z \rangle = 0$

• ب) $\langle y, b \rangle < 0$

• ج) $\langle y, x \rangle \geq 0$ برای x در K

$$\langle y, x \rangle = \langle y, z + (x - z) \rangle$$

$$= \langle y, x - z \rangle \geq 0$$

$$\|b - (z + \alpha(x - z))\|^2 = \|b - z\|^2 + \alpha^2 \|x - z\|^2 - \alpha(b - z)^T(x - z)$$

4.3.1 Definition. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone. The set

$$K^* := \{\mathbf{y} \in V : \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K\}$$

is called the *dual cone* of K .

4.4.1 Lemma. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone. Then $(K^*)^* = K$.

4.3.1 Definition. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone. The set

$$K^* := \{\mathbf{y} \in V : \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0 \text{ for all } \mathbf{x} \in K\}$$

is called the dual cone of K .

4.4.1 Lemma. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone. Then $(K^*)^* = K$.

- الف) $b \in K \Rightarrow b \in K^{**}$
- (معادلا) به ازای هر $\mathbf{y} \in K^*$ $\langle \mathbf{y}, \mathbf{b} \rangle \geq 0$
- ب) $b \notin K \Rightarrow b \notin K^{**}$
- (قضیه جداسازی): \mathbf{y} هست که $\langle \mathbf{y}, \mathbf{b} \rangle < 0$ و $\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle \geq 0$ برای هر $\mathbf{x} \in K$



لم فارکاش

4.5.1 Lemma (Farkas). *Let $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ be an $m \times n$ matrix, and let $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$. Then*

- *Either the system $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$ has a solution $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.*
- *Or the system $A^T\mathbf{y} \geq \mathbf{0}$, $\mathbf{b}^T\mathbf{y} < 0$ has a solution $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$.*

but not both.


4.5.1 Lemma (Farkas). *Let $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ be an $m \times n$ matrix, and let $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$. Then*

- *Either the system $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, $\mathbf{x} \geq \mathbf{0}$ has a solution $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.*
- *Or the system $A^T \mathbf{y} \geq \mathbf{0}$, $\mathbf{b}^T \mathbf{y} < 0$ has a solution $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$.*

but not both.

$$A(\mathbf{x}) = \mathbf{b}, \mathbf{x} \in K,$$

؟؟؟


$$\begin{array}{ll}\text{maximize} & C \bullet X \\ \text{subject to} & A_i \bullet X = b_i, \quad i = 1, 2, \dots, m \\ & X \succeq 0.\end{array}$$

$$A : \text{SYM}_n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

$$\begin{array}{ll}\text{maximize} & C \bullet X \\ \text{subject to} & A_i \bullet X = b_i, \quad i = 1, 2, \dots, m \\ & X \succeq 0.\end{array}$$

$$A : \text{SYM}_n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

4.5.2 Definition. Let $A: V \rightarrow W$ be a linear operator. A linear operator $A^T: W \rightarrow V$ is called an *adjoint* of A if

$$\langle \mathbf{y}, A(\mathbf{x}) \rangle = \langle A^T(\mathbf{y}), \mathbf{x} \rangle \text{ for all } \mathbf{x} \in V \text{ and } \mathbf{y} \in W.$$

4.5.3 Lemma. *Let $V = \text{SYM}_n$, $W = \mathbb{R}^m$, and $A: V \rightarrow W$ defined by $A(X) = (A_1 \bullet X, A_2 \bullet X, \dots, A_m \bullet X)$. Then*

$$A^T(\mathbf{y}) = \sum_{i=1}^m y_i A_i.$$

4.5.3 Lemma. Let $V = \text{SYM}_n$, $W = \mathbb{R}^m$, and $A: V \rightarrow W$ defined by $A(X) = (A_1 \bullet X, A_2 \bullet X, \dots, A_m \bullet X)$. Then

$$A^T(\mathbf{y}) = \sum_{i=1}^m y_i A_i.$$

$$\langle \mathbf{y}, A(X) \rangle := \mathbf{y}^T A(X)$$

4.5.3 Lemma. Let $V = \text{SYM}_n$, $W = \mathbb{R}^m$, and $A: V \rightarrow W$ defined by $A(X) = (A_1 \bullet X, A_2 \bullet X, \dots, A_m \bullet X)$. Then

$$A^T(\mathbf{y}) = \sum_{i=1}^m y_i A_i.$$

$$\langle \mathbf{y}, A(X) \rangle := \mathbf{y}^T A(X) = \sum_{i=1}^m y_i (A_i \bullet X)$$

4.5.3 Lemma. Let $V = \text{SYM}_n, W = \mathbb{R}^m$, and $A: V \rightarrow W$ defined by $A(X) = (A_1 \bullet X, A_2 \bullet X, \dots, A_m \bullet X)$. Then

$$A^T(\mathbf{y}) = \sum_{i=1}^m y_i A_i.$$

$$\langle \mathbf{y}, A(X) \rangle := \mathbf{y}^T A(X) = \sum_{i=1}^m y_i (A_i \bullet X)$$

$$= \left(\sum_{i=1}^m y_i A_i \right) \bullet X$$

4.5.3 Lemma. Let $V = \text{SYM}_n, W = \mathbb{R}^m$, and $A: V \rightarrow W$ defined by $A(X) = (A_1 \bullet X, A_2 \bullet X, \dots, A_m \bullet X)$. Then

$$A^T(\mathbf{y}) = \sum_{i=1}^m y_i A_i.$$

$$\langle \mathbf{y}, A(X) \rangle := \mathbf{y}^T A(X) = \sum_{i=1}^m y_i (A_i \bullet X)$$

$$= \left(\sum_{i=1}^m y_i A_i \right) \bullet X = A^T(\mathbf{y}) \bullet X$$

4.5.3 Lemma. Let $V = \text{SYM}_n, W = \mathbb{R}^m$, and $A: V \rightarrow W$ defined by $A(X) = (A_1 \bullet X, A_2 \bullet X, \dots, A_m \bullet X)$. Then

$$A^T(\mathbf{y}) = \sum_{i=1}^m y_i A_i.$$

$$\langle \mathbf{y}, A(X) \rangle := \mathbf{y}^T A(X) = \sum_{i=1}^m y_i (A_i \bullet X)$$

$$= \left(\sum_{i=1}^m y_i A_i \right) \bullet X = A^T(\mathbf{y}) \bullet X =: \langle A^T(\mathbf{y}), X \rangle$$

4.5.4 Lemma. *Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone, and $C = \{A(\mathbf{x}) : \mathbf{x} \in K\}$. Then \overline{C} , the closure of C , is a closed convex cone.*

4.5.4 Lemma. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone, and $C = \{A(\mathbf{x}) : \mathbf{x} \in K\}$. Then \overline{C} , the closure of C , is a closed convex cone.

• الف) بسته:

4.5.4 Lemma. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone, and $C = \{A(\mathbf{x}) : \mathbf{x} \in K\}$. Then \overline{C} , the closure of C , is a closed convex cone.

• الف) بسته:

• ب) ضرب

4.5.4 Lemma. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone, and $C = \{A(\mathbf{x}) : \mathbf{x} \in K\}$. Then \overline{C} , the closure of C , is a closed convex cone.

- الف) بسته:
- ب) ضرب
- ج) جمع

4.5.5 Definition. Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone. The system

$$A(\mathbf{x}) = \mathbf{b}, \mathbf{x} \in K$$

is called *limit-feasible* if there exists a sequence $(\mathbf{x}_k)_{k \in \mathbb{N}}$ such that $\mathbf{x}_k \in K$ for all $k \in \mathbb{N}$ and

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A(\mathbf{x}_k) = \mathbf{b}.$$

4.5.6 Lemma (Farkas lemma for cones). *Let $K \subseteq V$ be a closed convex cone, and $\mathbf{b} \in W$. Either the system*

$$A(\mathbf{x}) = \mathbf{b}, \mathbf{x} \in K$$

is limit-feasible, or the system

$$A^T(\mathbf{y}) \in K^*, \langle \mathbf{b}, \mathbf{y} \rangle < 0$$

has a solution, but not both.