


بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه دهم

خلاصه سازی برای مهداده

خلاصه سازی JL



- ماتریس $n \times k$ در R
- $N(0, 1)$ نرمال R_{ij}
- الگوریتم خلاصه سازی:
- جواب: $\|Rx\|_2^2 / k$

تحليل الـJL: الـJL

$$\mathbb{E}(\|Rx\|_2^2/k) = \|x\|_2^2 \quad \text{اميد:} \quad \circ$$

اثبات: \circ

$$\mathbb{E}(\|Rx\|_2^2/k) = \frac{1}{k} \mathbb{E}(x^T R^T Rx) = \frac{1}{k} x^T \mathbb{E}(R^T R)x = \|x\|_2^2$$

واريانس: \circ

$$\mathbb{P}(|\|Rx\|_2^2 - k\|x\|_2^2| \geq \varepsilon k\|x\|_2^2) \leq \exp(-C\varepsilon^2 k) \quad \text{حكم:} \quad \circ$$

$$\mathbb{P}(|\|Z\|_2^2 - k| \geq \varepsilon k) \leq \exp(-C\varepsilon^2 k) \quad \text{حكم جديد:} \quad \circ$$

$Rx = Z$

| | x | |

$$\mathbb{P}(|\|Z\|_2^2-k|\geq \varepsilon k)\leq \exp(-C\varepsilon^2k)$$

$$\mathbb{P}(\|Z\|_2^2\geq (1+\varepsilon)k)\leq \exp(-\varepsilon^2\frac{k}{6}+O(k\varepsilon^3))$$

$$1 + \epsilon \geq (1 + \epsilon')^2 \quad \leftarrow \epsilon' := \epsilon / 3$$

$$P[Y > k(1 + \epsilon)] \leq P[Y > k(1 + \epsilon')^2]$$

$$\scriptstyle{\leq}$$

$$\mathbb{P}(|\|Z\|_2^2-k|\geq \varepsilon k)\leq \exp(-C\varepsilon^2k)$$

$$\mathbb{P}(\|Z\|_2^2\geq (1+\varepsilon)k)\leq \exp(-\varepsilon^2\frac{k}{6}+O(k\varepsilon^3))$$

$$Y = \|Z\|_2^2$$

$$1 + \epsilon \geq (1 + \epsilon')^2 \quad \leftarrow \epsilon' := \epsilon / 3$$

$$P[Y > k(1 + \epsilon)] \leq P[Y > k(1 + \epsilon')^2]$$

$$\scriptstyle{\leq}$$

$$\mathbb{P}(|\|Z\|_2^2-k|\geq \varepsilon k)\leq \exp(-C\varepsilon^2k)$$

$$\mathbb{P}(\|Z\|_2^2\geq (1+\varepsilon)k)\leq \exp(-\varepsilon^2\frac{k}{6}+O(k\varepsilon^3))$$

$$Y = \|Z\|_2^2 \quad 1 + \epsilon \geq (1 + \epsilon')^2 \quad \epsilon' := \epsilon / 3$$

$$P[Y > k(1 + \epsilon)] \leq P[Y > k(1 + \epsilon')^2]$$

$$\mathbb{P}(Y>\alpha)=\mathbb{P}(\exp(sY)>\exp(s\alpha))$$

$$\scriptstyle{\leq}$$

$$\mathbb{P}(|\|Z\|_2^2 - k| \geq \varepsilon k) \leq \exp(-C\varepsilon^2 k)$$

$$\mathbb{P}(\|Z\|_2^2 \geq (1 + \varepsilon)k) \leq \exp(-\varepsilon^2 \frac{k}{6} + O(k\varepsilon^3))$$

$$Y = \|Z\|_2^2$$

$$1+\epsilon \geq (1+\epsilon')^2 \quad \leftarrow \epsilon' := \epsilon/3$$

$$P[Y > k(1+\epsilon)] \leq P[Y > k(1+\epsilon')^2]$$

$$\mathbb{P}(Y>\alpha)=\mathbb{P}(\exp(sY)>\exp(s\alpha))$$

$$\alpha:=k(1+\dot{\epsilon})^2$$

$$\scriptstyle \leq$$

$$\mathbb{P}(|\|Z\|_2^2 - k| \geq \varepsilon k) \leq \exp(-C\varepsilon^2 k)$$

$$\mathbb{P}(\|Z\|_2^2 \geq (1 + \varepsilon)k) \leq \exp(-\varepsilon^2 \frac{k}{6} + O(k\varepsilon^3))$$

$$Y = \|Z\|_2^2$$

$$1+\epsilon \geq (1+\epsilon')^2 \quad \leftarrow \epsilon' := \epsilon/3$$

$$P[Y > k(1+\epsilon)] \leq P[Y > k(1+\epsilon')^2]$$

$$\mathbb{P}(Y>\alpha)=\mathbb{P}(\exp(sY)>\exp(s\alpha))\leq \exp(-s\alpha)\,\mathbb{E}(\exp(sY))$$

$$\alpha:=k(1+\dot{\epsilon})^2$$

$$\scriptstyle \leq$$

$$\mathbb{P}(|\|Z\|_2^2 - k| \geq \varepsilon k) \leq \exp(-C\varepsilon^2 k)$$

$$\mathbb{P}(\|Z\|_2^2 \geq (1 + \varepsilon)k) \leq \exp(-\varepsilon^2 \frac{k}{6} + O(k\varepsilon^3))$$

$$Y = \|Z\|_2^2$$

$$1 + \epsilon \geq (1 + \epsilon')^2$$

$$\epsilon' := \epsilon/3$$

$$P[Y > k(1 + \epsilon)] \leq P[Y > k(1 + \epsilon')^2]$$

$$\mathbb{P}(Y > \alpha) = \mathbb{P}(\exp(sY) > \exp(s\alpha)) \leq \exp(-s\alpha) \mathbb{E}(\exp(sY))$$

$$\alpha := k(1 + \epsilon)^2$$

مارکوف

<

$$\mathbb{P}(|\|Z\|_2^2 - k| \geq \varepsilon k) \leq \exp(-C\varepsilon^2 k)$$

$$\mathbb{P}(\|Z\|_2^2 \geq (1 + \varepsilon)k) \leq \exp(-\varepsilon^2 \frac{k}{6} + O(k\varepsilon^3))$$

$$Y = \|Z\|_2^2$$

$$1 + \epsilon \geq (1 + \epsilon')^2$$

$$\epsilon' := \epsilon/3$$

$$P[Y > k(1 + \epsilon)] \leq P[Y > k(1 + \epsilon')^2]$$

$$\mathbb{P}(Y > \alpha) = \mathbb{P}(\exp(sY) > \exp(s\alpha)) \leq \exp(-s\alpha) \mathbb{E}(\exp(sY))$$

$$\alpha := k(1 + \dot{\epsilon})^2$$

مارکوف

$$Y = \sum_i Z_i^2$$

\leq

$$\mathbb{P}(|\|Z\|_2^2 - k| \geq \varepsilon k) \leq \exp(-C\varepsilon^2 k)$$

$$\mathbb{P}(\|Z\|_2^2 \geq (1 + \varepsilon)k) \leq \exp(-\varepsilon^2 \frac{k}{6} + O(k\varepsilon^3))$$

$$Y = \|Z\|_2^2$$

$$1 + \epsilon \geq (1 + \epsilon')^2$$

$$\epsilon' := \epsilon/3$$

$$P[Y > k(1 + \epsilon)] \leq P[Y > k(1 + \epsilon')^2]$$

$$\mathbb{P}(Y > \alpha) = \mathbb{P}(\exp(sY) > \exp(s\alpha)) \leq \exp(-s\alpha) \mathbb{E}(\exp(sY))$$

$$\alpha := k(1 + \epsilon)^2$$

مارکوف

$$= \prod_i E(\exp(sZ_i^2))$$

$$Y = \sum_i Z_i^2$$

\leq

$$\mathbb{P}(|\|Z\|_2^2 - k| \geq \varepsilon k) \leq \exp(-C\varepsilon^2 k)$$

$$\mathbb{P}(\|Z\|_2^2 \geq (1 + \varepsilon)k) \leq \exp(-\varepsilon^2 \frac{k}{6} + O(k\varepsilon^3))$$

$$Y = \|Z\|_2^2$$

$$1 + \epsilon \geq (1 + \epsilon')^2$$

$$\epsilon' := \epsilon/3$$

$$P[Y > k(1 + \epsilon)] \leq P[Y > k(1 + \epsilon')^2]$$

$$\mathbb{P}(Y > \alpha) = \mathbb{P}(\exp(sY) > \exp(s\alpha)) \leq \exp(-s\alpha) \mathbb{E}(\exp(sY))$$

$$\alpha := k(1 + \dot{\epsilon})^2$$

مارکوف

$$= \prod_i E(\exp(sZ_i^2))$$

$$Y = \sum_i Z_i^2$$

نرمال : Zi

$$\mathbb{E}(Z_i) = \sum_j \mathbb{E}(r_{ij}x_j) = 0$$

$$\text{var}(Z_i) = \mathbb{E}(Z_i^2) = \sum_j \mathbb{E}(r_{ij}^2 x_j^2) = \|x\|_2^2 = 1$$

<

$$\mathbb{P}(|\|Z\|_2^2 - k| \geq \varepsilon k) \leq \exp(-C\varepsilon^2 k)$$

$$\mathbb{P}(\|Z\|_2^2 \geq (1 + \varepsilon)k) \leq \exp(-\varepsilon^2 \frac{k}{6} + O(k\varepsilon^3))$$

$$Y = \|Z\|_2^2$$

$$1 + \epsilon \geq (1 + \epsilon')^2$$

$$\epsilon' := \epsilon/3$$

$$P[Y > k(1 + \epsilon)] \leq P[Y > k(1 + \epsilon')^2]$$

$$\mathbb{P}(Y > \alpha) = \mathbb{P}(\exp(sY) > \exp(s\alpha)) \leq \exp(-s\alpha) \mathbb{E}(\exp(sY))$$

$$\alpha := k(1 + \epsilon)^2$$

مارکوف

$$= \prod_i E(\exp(sZ_i^2))$$

$$Y = \sum_i Z_i^2$$

نرمال : Z_i

$$\mathbb{E}(Z_i) = \sum_j \mathbb{E}(r_{ij}x_j) = 0$$

$$\text{var}(Z_i) = \mathbb{E}(Z_i^2) = \sum_j \mathbb{E}(r_{ij}^2 x_j^2) = \|x\|_2^2 = 1$$

$$\mathbb{E}(\exp(sZ_i^2)) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \exp(st^2) \exp(-t^2/2) dt = \frac{1}{\sqrt{1-2s}}$$

\leq

$$\mathbb{P}(|\|Z\|_2^2 - k| \geq \varepsilon k) \leq \exp(-C\varepsilon^2 k)$$

$$\mathbb{P}(\|Z\|_2^2 \geq (1 + \varepsilon)k) \leq \exp(-\varepsilon^2 \frac{k}{6} + O(k\varepsilon^3))$$

$$Y = \|Z\|_2^2$$

$$1 + \epsilon \geq (1 + \epsilon')^2$$

$$\epsilon' := \epsilon/3$$

$$P[Y > k(1 + \epsilon)] \leq P[Y > k(1 + \epsilon')^2]$$

$$\mathbb{P}(Y > \alpha) = \mathbb{P}(\exp(sY) > \exp(s\alpha)) \leq \exp(-s\alpha) \mathbb{E}(\exp(sY))$$

$$\alpha := k(1 + \dot{\epsilon})^2$$

مارکوف

$$= \prod_i E(\exp(sZ_i^2))$$

$$Y = \sum_i Z_i^2$$

نرمال : Z_i

$$\mathbb{E}(Z_i) = \sum_j \mathbb{E}(r_{ij}x_j) = 0$$

$$\text{var}(Z_i) = \mathbb{E}(Z_i^2) = \sum_j \mathbb{E}(r_{ij}^2 x_j^2) = \|x\|_2^2 = 1$$

$$\mathbb{E}(\exp(sZ_i^2)) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int \exp(st^2) \exp(-t^2/2) dt = \frac{1}{\sqrt{1-2s}}$$

$$\leq \exp(-s\alpha)(1 - 2s)^{-k/2}$$

نیمه اول اثبات:

$$\mathbb{P}(\|Z\|_2^2 \geq (1 + \varepsilon)k) \leq \exp(-\varepsilon^2 \frac{k}{6} + O(k\varepsilon^3))$$

$$s := \frac{1}{2} - \frac{k}{2\alpha} \quad 1 - 2s = \frac{k}{\alpha}$$

$$\ln(k/\alpha) = \ln(1/(1 + \epsilon')^2) = -2 \ln(1 + \epsilon')$$

$$\ln(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + O(x^3)$$

نیمه اول اثبات:

$$\mathbb{P}(\|Z\|_2^2 \geq (1 + \varepsilon)k) \leq \exp(-\varepsilon^2 \frac{k}{6} + O(k\varepsilon^3))$$

$$\mathbb{P}(Y \geq \alpha) = \exp(-s\alpha)(1 - 2s)^{-k/2}$$

$$\alpha := k(1 + \epsilon')^2$$

$$s := \frac{1}{2} - \frac{k}{2\alpha}$$

$$1 - 2s = \frac{k}{\alpha}$$

$$\ln(k/\alpha) = \ln(1/(1 + \epsilon')^2) = -2 \ln(1 + \epsilon')$$

$$\ln(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + O(x^3)$$

نیمه اول اثبات:

$$\mathbb{P}(\|Z\|_2^2 \geq (1 + \varepsilon)k) \leq \exp(-\varepsilon^2 \frac{k}{6} + O(k\varepsilon^3))$$

$$\mathbb{P}(Y \geq \alpha) = \exp(-s\alpha)(1 - 2s)^{-k/2}$$

$$\alpha := k(1 + \epsilon')^2$$

$$s := \frac{1}{2} - \frac{k}{2\alpha}$$

$$1 - 2s = \frac{k}{\alpha}$$

$$= \exp\left(-\left(\frac{1}{2} - \frac{k}{2\alpha}\right)\alpha\right) \left(\frac{k}{\alpha}\right)^{-k/2}$$

$$\ln(k/\alpha) = \ln(1/(1 + \epsilon')^2) = -2 \ln(1 + \epsilon')$$

$$\ln(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + O(x^3)$$

نیمه اول اثبات:

$$\mathbb{P}(\|Z\|_2^2 \geq (1 + \varepsilon)k) \leq \exp(-\varepsilon^2 \frac{k}{6} + O(k\varepsilon^3))$$

$$\mathbb{P}(Y \geq \alpha) = \exp(-s\alpha)(1 - 2s)^{-k/2}$$

$$\alpha := k(1 + \epsilon')^2$$

$$s := \frac{1}{2} - \frac{k}{2\alpha}$$

$$1 - 2s = \frac{k}{\alpha}$$

$$= \exp\left(-\left(\frac{1}{2} - \frac{k}{2\alpha}\right)\alpha\right) \left(\frac{k}{\alpha}\right)^{-k/2}$$

$$= \exp\left(-\frac{1}{2}(\alpha - k) - \frac{k}{2} \ln(k/\alpha)\right)$$

$$\ln(k/\alpha) = \ln(1/(1 + \epsilon')^2) = -2 \ln(1 + \epsilon')$$

$$\ln(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + O(x^3)$$

نیمه اول اثبات:

$$\mathbb{P}(\|Z\|_2^2 \geq (1 + \varepsilon)k) \leq \exp(-\varepsilon^2 \frac{k}{6} + O(k\varepsilon^3))$$

$$\mathbb{P}(Y \geq \alpha) = \exp(-s\alpha)(1 - 2s)^{-k/2}$$

$$\alpha := k(1 + \epsilon')^2$$

$$s := \frac{1}{2} - \frac{k}{2\alpha}$$

$$1 - 2s = \frac{k}{\alpha}$$

$$= \exp\left(-\left(\frac{1}{2} - \frac{k}{2\alpha}\right)\alpha\right) \left(\frac{k}{\alpha}\right)^{-k/2}$$

$$= \exp\left(-\frac{1}{2}(\alpha - k) - \frac{k}{2} \ln(k/\alpha)\right)$$

$$\ln(k/\alpha) = \ln(1/(1 + \epsilon')^2) = -2 \ln(1 + \epsilon')$$

$$= \exp\left(-\frac{1}{2}(k(1 + \epsilon')^2 - k) + k \ln(1 + \epsilon')\right)$$

$$\ln(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + O(x^3)$$

نیمه اول اثبات:

$$\mathbb{P}(\|Z\|_2^2 \geq (1 + \varepsilon)k) \leq \exp(-\varepsilon^2 \frac{k}{6} + O(k\varepsilon^3))$$

$$\mathbb{P}(Y \geq \alpha) = \exp(-s\alpha)(1 - 2s)^{-k/2}$$

$$\alpha := k(1 + \epsilon')^2$$

$$s := \frac{1}{2} - \frac{k}{2\alpha}$$

$$1 - 2s = \frac{k}{\alpha}$$

$$= \exp\left(-\left(\frac{1}{2} - \frac{k}{2\alpha}\right)\alpha\right) \left(\frac{k}{\alpha}\right)^{-k/2}$$

$$= \exp\left(-\frac{1}{2}(\alpha - k) - \frac{k}{2} \ln(k/\alpha)\right)$$

$$\ln(k/\alpha) = \ln(1/(1 + \epsilon')^2) = -2 \ln(1 + \epsilon')$$

$$= \exp\left(-\frac{1}{2}(k(1 + \epsilon')^2 - k) + k \ln(1 + \epsilon')\right)$$

$$\ln(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + O(x^3)$$

$$= \exp\left(-\frac{k}{2}(2\epsilon' + \epsilon'^2) + k(\epsilon' - \epsilon'^2/2 + O(\epsilon'^3))\right)$$

نیمه اول اثبات:

$$\mathbb{P}(\|Z\|_2^2 \geq (1 + \varepsilon)k) \leq \exp(-\varepsilon^2 \frac{k}{6} + O(k\varepsilon^3))$$

$$\mathbb{P}(Y \geq \alpha) = \exp(-s\alpha)(1 - 2s)^{-k/2}$$

$$\alpha := k(1 + \epsilon')^2$$

$$s := \frac{1}{2} - \frac{k}{2\alpha}$$

$$1 - 2s = \frac{k}{\alpha}$$

$$= \exp\left(-\left(\frac{1}{2} - \frac{k}{2\alpha}\right)\alpha\right) \left(\frac{k}{\alpha}\right)^{-k/2}$$

$$= \exp\left(-\frac{1}{2}(\alpha - k) - \frac{k}{2} \ln(k/\alpha)\right)$$

$$\ln(k/\alpha) = \ln(1/(1 + \epsilon')^2) = -2 \ln(1 + \epsilon')$$

$$= \exp\left(-\frac{1}{2}(k(1 + \epsilon')^2 - k) + k \ln(1 + \epsilon')\right)$$

$$\ln(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + O(x^3)$$

$$= \exp\left(-\frac{k}{2}(2\epsilon' + \epsilon'^2) + k(\epsilon' - \epsilon'^2/2 + O(\epsilon'^3))\right)$$

$$= \exp\left(-k\frac{3}{2}\epsilon'^2 + kO(\epsilon'^3)\right)$$

نیمه اول اثبات:

$$\mathbb{P}(\|Z\|_2^2 \geq (1 + \varepsilon)k) \leq \exp(-\varepsilon^2 \frac{k}{6} + O(k\varepsilon^3))$$

$$\mathbb{P}(Y \geq \alpha) = \exp(-s\alpha)(1 - 2s)^{-k/2}$$

$$\alpha := k(1 + \epsilon')^2$$

$$s := \frac{1}{2} - \frac{k}{2\alpha}$$

$$1 - 2s = \frac{k}{\alpha}$$

$$= \exp\left(-\left(\frac{1}{2} - \frac{k}{2\alpha}\right)\alpha\right) \left(\frac{k}{\alpha}\right)^{-k/2}$$

$$= \exp\left(-\frac{1}{2}(\alpha - k) - \frac{k}{2} \ln(k/\alpha)\right)$$

$$\ln(k/\alpha) = \ln(1/(1 + \epsilon')^2) = -2 \ln(1 + \epsilon')$$

$$= \exp\left(-\frac{1}{2}(k(1 + \epsilon')^2 - k) + k \ln(1 + \epsilon')\right)$$

$$\ln(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + O(x^3)$$

$$= \exp\left(-\frac{k}{2}(2\epsilon' + \epsilon'^2) + k(\epsilon' - \epsilon'^2/2 + O(\epsilon'^3))\right)$$

$$= \exp\left(-k\frac{3}{2}\epsilon'^2 + kO(\epsilon'^3)\right) = \exp\left(-\frac{k}{6}\epsilon'^2 + O(k\epsilon'^3)\right)$$

خلاصه سازی JL: جمع‌بندی

$$k = O\left(\frac{1}{\varepsilon^2} \log \frac{1}{\delta}\right) \quad \exp(-C\varepsilon^2 k) = \delta$$

خلاصه سازی JL: جمع‌بندی

تقریب نرم ۲ (روش JL)
حافظه: $\epsilon^{-2} \log 1/\delta$ تا عدد

$$k = O\left(\frac{1}{\varepsilon^2} \log \frac{1}{\delta}\right) \quad \exp(-C\varepsilon^2 k) = \delta$$

خلاصه سازی مشابه، جمع‌بندی متفاوت

• ماتریس $R \in \mathbb{R}^{k \times n}$

• $N(0, 1)$: نرمال

• $R_X = [Z_1 \cdots Z_k]$

• Z_i : توزیع نرمال، میانگین: μ ، واریانس: σ^2

• $Z_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ که $\|x\|_2^2$ نرمال

خلاصه سازی مشابه، جمع بندی متفاوت

• ماتریس $R \in \mathbb{R}^{k \times n}$

• $N(0, 1)$: نرمال R_{ij}

• $R_X = [Z_1 \cdots Z_k]$

• Z_i : توزیع نرمال، میانگین: μ ، واریانس: σ^2

• $Z_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ که $G_i = |x|_2$

• روش JL: میانگین Z_i^2 ها

$$Y = \frac{\text{median}[|Z_1|, \dots, |Z_k|]}{\text{median}[|G_i|]}$$

• روش ما: میانه Z_i ها؟

Lemma 1: Let $U_1 \cdots U_k$ be i.i.d. real random variables chosen from any distribution having continuous c.d.f. F and median M , i.e., $F(t) = \Pr[U_i < t]$ and $F(M) = 1/2$. Define $U = \text{median}[U_1, \dots, U_k]$. Then, for some absolute constant $C > 0$,

$$\Pr[F(U) \in (\frac{1}{2} - \epsilon, \frac{1}{2} + \epsilon)] \geq 1 - e^{-C\epsilon^2 k}$$

Lemma 1: Let $U_1 \cdots U_k$ be i.i.d. real random variables chosen from any distribution having continuous c.d.f. F and median M , i.e., $F(t) = \Pr[U_i < t]$ and $F(M) = 1/2$. Define $U = \text{median}[U_1, \dots, U_k]$. Then, for some absolute constant $C > 0$,

$$\Pr[F(U) \in (\frac{1}{2} - \epsilon, \frac{1}{2} + \epsilon)] \geq 1 - e^{-C\epsilon^2 k}$$

$$E_i : F(U_i) < \frac{1}{2} - \epsilon$$

Lemma 1: Let $U_1 \cdots U_k$ be i.i.d. real random variables chosen from any distribution having continuous c.d.f. F and median M , i.e., $F(t) = \Pr[U_i < t]$ and $F(M) = 1/2$. Define $U = \text{median}[U_1, \dots, U_k]$. Then, for some absolute constant $C > 0$,

$$\Pr[F(U) \in (\frac{1}{2} - \epsilon, \frac{1}{2} + \epsilon)] \geq 1 - e^{-C\epsilon^2 k}$$

$$E_i : F(U_i) < \frac{1}{2} - \epsilon$$

$$p = \Pr[E_i] = \frac{1}{2} - \epsilon$$

Lemma 1: Let $U_1 \cdots U_k$ be i.i.d. real random variables chosen from any distribution having continuous c.d.f. F and **median** M , i.e., $F(t) = \Pr[U_i < t]$ and $F(M) = 1/2$. Define $U = \text{median}[U_1, \dots, U_k]$. Then, for some absolute constant $C > 0$,

$$\Pr[F(U) \in (\frac{1}{2} - \epsilon, \frac{1}{2} + \epsilon)] \geq 1 - e^{-C\epsilon^2 k}$$

$$E_i : F(U_i) < \frac{1}{2} - \epsilon$$

$$p = \Pr[E_i] = \frac{1}{2} - \epsilon$$

$$F(U) < \frac{1}{2} - \epsilon \implies \text{با}ر_{k/2} \text{رخداده} \rightarrow E_i$$

Lemma 1: Let $U_1 \cdots U_k$ be i.i.d. real random variables chosen from any distribution having continuous c.d.f. F and **median** M , i.e., $F(t) = \Pr[U_i < t]$ and $F(M) = 1/2$. Define $U = \text{median}[U_1, \dots, U_k]$. Then, for some absolute constant $C > 0$,

$$\Pr[F(U) \in (\frac{1}{2} - \epsilon, \frac{1}{2} + \epsilon)] \geq 1 - e^{-C\epsilon^2 k}$$

$$E_i : F(U_i) < \frac{1}{2} - \epsilon$$

$$p = \Pr[E_i] = \frac{1}{2} - \epsilon$$

$$F(U) < \frac{1}{2} - \epsilon \implies \text{با} \rightarrow \text{رخداده} \text{ با} \rightarrow \text{Ei} \rightarrow k/2$$

$$\Pr[F(u) < \frac{1}{2} - \epsilon] \leq e^{-C\epsilon^2 k}$$

Lemma 1: Let $U_1 \cdots U_k$ be i.i.d. real random variables chosen from any distribution having continuous c.d.f. F and median M , i.e., $F(t) = \Pr[U_i < t]$ and $F(M) = 1/2$. Define $U = \text{median}[U_1, \dots, U_k]$. Then, for some absolute constant $C > 0$,

$$\Pr[F(U) \in (\frac{1}{2} - \epsilon, \frac{1}{2} + \epsilon)] \geq 1 - e^{-C\epsilon^2 k}$$

$$E_i : F(U_i) < \frac{1}{2} - \epsilon$$

$$p = \Pr[E_i] = \frac{1}{2} - \epsilon$$

$$F(U) < \frac{1}{2} - \epsilon \implies \text{با رخداده } E_i \text{ ها} \text{ با } k/2$$

$$\Pr[F(u) < \frac{1}{2} - \epsilon] \leq e^{-C\epsilon^2 k}$$

هو فدینگ:

$$\mathbb{P} \left(\sum_{i=1}^n X_i > (p + \epsilon)n \right) < e^{-2\epsilon^2 n}$$

Lemma 2: Let F be the CDF of a random variable $|G|$, where G drawn from $N(0, 1)$. There exists a $C' > 0$ such that if for some z we have

$$F(z) \in \left(\frac{1}{2} - \epsilon, \frac{1}{2} + \epsilon\right),$$

then

$$z = \text{median}(g) \pm C'\epsilon$$

برای
کوچک

Theorem: If we use median estimator

$$Y = \frac{\text{median}[|Z_1|, \dots, |Z_k|]}{\text{median}[|g|]}$$

where $Z_j = \sum_i r_{ij} x_i$, r_{ij} is chosen i.i.d. from $N(0, 1)$, then we have

$$Y = \|x\|_2 \frac{[\text{median}(g) \pm C'\epsilon]}{\text{median}[|g|]} = \|x\|_2 (1 \pm C''\epsilon)$$

with probability

$$1 - e^{-C\epsilon^2 k}.$$

Theorem: If we use median estimator

$$Y = \frac{\text{median}[|Z_1|, \dots, |Z_k|]}{\text{median}[|g|]}$$

where $Z_j = \sum_i r_{ij} x_i$, r_{ij} is chosen i.i.d. from $N(0, 1)$, then we have

$$Y = \|x\|_2 \frac{[\text{median}(g) \pm C'\epsilon]}{\text{median}[|g|]} = \|x\|_2 (1 \pm C''\epsilon)$$

with probability

$$1 - e^{-C\epsilon^2 k}.$$

$$\text{median}[|Z_1|, \dots, |Z_k|] = \text{U} \cdot \|x\|_2$$

Theorem: If we use median estimator

$$Y = \frac{\text{median}[|Z_1|, \dots, |Z_k|]}{\text{median}[|g|]}$$

where $Z_j = \sum_i r_{ij} x_i$, r_{ij} is chosen i.i.d. from $N(0, 1)$, then we have

$$Y = \|x\|_2 \frac{[\text{median}(g) \pm C'\epsilon]}{\text{median}[|g|]} = \|x\|_2 (1 \pm C''\epsilon)$$

with probability

$$1 - e^{-C\epsilon^2 k}.$$

$$\text{median}[|Z_1|, \dots, |Z_k|] = \mathbb{U} \cdot \|x\|_2$$

$$\Pr[F(U) \in (\frac{1}{2} - \epsilon, \frac{1}{2} + \epsilon)] \geq 1 - e^{-C\epsilon^2 k}$$

Theorem: If we use median estimator

$$Y = \frac{\text{median}[|Z_1|, \dots, |Z_k|]}{\text{median}[|g|]}$$

where $Z_j = \sum_i r_{ij} x_i$, r_{ij} is chosen i.i.d. from $N(0, 1)$, then we have

$$Y = \|x\|_2 \frac{[\text{median}(g) \pm C'\epsilon]}{\text{median}[|g|]} = \|x\|_2 (1 \pm C''\epsilon)$$

with probability

$$1 - e^{-C\epsilon^2 k}.$$

$$\text{median}[|Z_1|, \dots, |Z_k|] = U \cdot \|x\|_2$$

$$\Pr[F(U) \in (\frac{1}{2} - \epsilon, \frac{1}{2} + \epsilon)] \geq 1 - e^{-C\epsilon^2 k}$$

$$U = \text{median}(g) \pm C'\epsilon$$

تعمیم به LP برای $P < 2$

برای $P = 2$ ◎

نرمال $x_1U_1 + \dots + x_mU_m \leftarrow U$ ◎

$$(|x_1|^p + \dots + |x_m|^p)^{\frac{1}{p}} U$$

برای $P = 1$ ◎

توزیع کوشی ◎

برای $P = \frac{1}{2}$: توزیع لوی ◎

تعمیم به LP برای $P > 2$

برای $P = 2$ ◎

نرمال $x_1U_1 + \dots + x_mU_m \leftarrow U$ ◎

$$(|x_1|^p + \dots + |x_m|^p)^{\frac{1}{p}} U$$

برای $P = 1$ ◎

توزیع کوشی ◎

برای $P = \frac{1}{2}$: توزیع لوی ◎

روش ۱: دو مرحله‌ای

Pass 1: Pick a stream element $i = i_j$ uniformly at random

Pass 2: Compute x_i

Return $Y = nx_i^{k-1}$

روش ۱: دو مرحله‌ای

Pass 1: Pick a stream element $i = i_j$ uniformly at random

Pass 2: Compute x_i

Return $Y = nx_i^{k-1}$

$$E[Y] = \sum_i \frac{x_i}{n} nx_i^{k-1} = \sum_i x_i^k = F_k$$

روش ۱: دو مرحله‌ای

Pass 1: Pick a stream element $i = i_j$ uniformly at random

Pass 2: Compute x_i

Return $Y = nx_i^{k-1}$

$$E[Y] = \sum_i \frac{x_i}{n} nx_i^{k-1} = \sum_i x_i^k = F_k$$

$$E[Y^2] = \sum_i \frac{x_i}{n} n^2 x_i^{2k-2} = n \sum_i x_i^{2k-1} = nF_{2k-1}$$

روش ۱: دو مرحله‌ای

Pass 1: Pick a stream element $i = i_j$ uniformly at random

Pass 2: Compute x_i

Return $Y = nx_i^{k-1}$

$$E[Y] = \sum_i \frac{x_i}{n} nx_i^{k-1} = \sum_i x_i^k = F_k$$

$$E[Y^2] = \sum_i \frac{x_i}{n} n^2 x_i^{2k-2} = n \sum_i x_i^{2k-1} = nF_{2k-1}$$

چبیشف

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E} X| > \lambda) < \frac{\mathbb{E}(X - \mathbb{E} X)^2}{\lambda^2}$$

$$P[|X - EX| > \epsilon EX] < \text{Var}[X] / (EX)^2 \epsilon^2$$

روش ۱: دو مرحله‌ای

Pass 1: Pick a stream element $i = i_j$ uniformly at random

Pass 2: Compute x_i

Return $Y = nx_i^{k-1}$

$$E[Y] = \sum_i \frac{x_i}{n} nx_i^{k-1} = \sum_i x_i^k = F_k$$

$$E[Y^2] = \sum_i \frac{x_i}{n} n^2 x_i^{2k-2} = n \sum_i x_i^{2k-1} = nF_{2k-1}$$

چبیشف

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E} X| > \lambda) < \frac{\mathbb{E}(X - \mathbb{E} X)^2}{\lambda^2}$$

با k بار
تکرار

$$\mathbb{P}[|X - \mathbb{E} X| > \epsilon \mathbb{E} X] < \text{Var}[X] / (\mathbb{E} X)^2 \epsilon^2$$

$$\mathbb{P}[|X - \mathbb{E} X| > \epsilon \mathbb{E} X] < 1/k \cdot \text{Var}[X] / (\mathbb{E} X)^2 \epsilon^2$$

روش ۱: دو مرحله‌ای

Pass 1: Pick a stream element $i = i_j$ uniformly at random

Pass 2: Compute x_i


Return $Y = nx_i^{k-1}$

$$E[Y] = \sum_i \frac{x_i}{n} nx_i^{k-1} = \sum_i x_i^k = F_k$$

$$E[Y^2] = \sum_i \frac{x_i}{n} n^2 x_i^{2k-2} = n \sum_i x_i^{2k-1} = nF_{2k-1} \leq m^{1-\frac{1}{k}} (F_k)^2.$$

چبیشف

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E} X| > \lambda) < \frac{\mathbb{E}(X - \mathbb{E} X)^2}{\lambda^2}$$



$$\mathbb{P}[|X - \mathbb{E} X| > \epsilon \mathbb{E} X] < \text{Var}[X] / (\mathbb{E} X)^2 \epsilon^2$$
$$\mathbb{P}[|X - \mathbb{E} X| > \epsilon \mathbb{E} X] < 1/k \cdot \text{Var}[X] / (\mathbb{E} X)^2 \epsilon^2$$

روش ۱: دو مرحله‌ای

Pass 1: Pick a stream element $i = i_j$ uniformly at random

Pass 2: Compute x_i

Return $Y = nx_i^{k-1}$

$$E[Y] = \sum_i \frac{x_i}{n} nx_i^{k-1} = \sum_i x_i^k = F_k$$

قسمت
باقي‌مانده

$$E[Y^2] = \sum_i \frac{x_i}{n} n^2 x_i^{2k-2} = n \sum_i x_i^{2k-1} = nF_{2k-1} \leq m^{1-\frac{1}{k}} (F_k)^2.$$

چبیشف

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E} X| > \lambda) < \frac{\mathbb{E}(X - \mathbb{E} X)^2}{\lambda^2}$$

$$\mathbb{P}[|X - \mathbb{E} X| > \epsilon \mathbb{E} X] < \text{Var}[X] / (\mathbb{E} X)^2 \epsilon^2$$

$$k = O\left(\frac{m^{1-\frac{1}{k}}}{\epsilon^2}\right)$$

با k بار
تکرار

$$\mathbb{P}[|X - \mathbb{E} X| > \epsilon \mathbb{E} X] < 1/k \cdot \text{Var}[X] / (\mathbb{E} X)^2 \epsilon^2$$

روش ۱:

$$\begin{aligned} nF_{2k-1} &= n\|x\|_{2k-1}^{2k-1} \leq n\|x\|_k^{2k-1} = \|x\|_1\|x\|_k^{2k-1} \\ &\leq m^{1-\frac{1}{k}}\|x\|_k\|x\|_k^{2k-1} \\ &= m^{1-\frac{1}{k}}F_k^2 \end{aligned}$$

روش ۱:

$$nF_{2k-1}$$

$$nF_{2k-1} = n\|x\|_{2k-1}^{2k-1} \leq n\|x\|_k^{2k-1} = \|x\|_1\|x\|_k^{2k-1}$$

$$\leq m^{1-\frac{1}{k}}\|x\|_k\|x\|_k^{2k-1}$$

$$= m^{1-\frac{1}{k}} F_k^2$$

روش ۱:

$$nF_{2k-1} \leq m^{1-\frac{1}{k}} (F_k)^2.$$

$$\begin{aligned} nF_{2k-1} &= n\|x\|_{2k-1}^{2k-1} \leq n\|x\|_k^{2k-1} = \|x\|_1\|x\|_k^{2k-1} \\ &\leq m^{1-\frac{1}{k}}\|x\|_k\|x\|_k^{2k-1} \\ &= m^{1-\frac{1}{k}} F_k^2 \end{aligned}$$

روش ۱:

قسمت
باقي مانده

$$nF_{2k-1} \leq m^{1-\frac{1}{k}} (F_k)^2.$$

$$nF_{2k-1} = n\|x\|_{2k-1}^{2k-1} \leq n\|x\|_k^{2k-1} = \|x\|_1\|x\|_k^{2k-1}$$

$$\leq m^{1-\frac{1}{k}}\|x\|_k\|x\|_k^{2k-1}$$

$$= m^{1-\frac{1}{k}} F_k^2$$

روش ۱:

قسمت
باقی‌مانده

$$nF_{2k-1} \leq m^{1-\frac{1}{k}} (F_k)^2.$$

به ازای هر جمله در $\|x\|_{2k-1}^{2k-1}$ یک جمله در $\|x\|_k^{2k-1}$ داریم

$$nF_{2k-1} = n\|x\|_{2k-1}^{2k-1} \leq n\|x\|_k^{2k-1} = \|x\|_1\|x\|_k^{2k-1}$$

$$\leq m^{1-\frac{1}{k}}\|x\|_k\|x\|_k^{2k-1}$$

$$= m^{1-\frac{1}{k}} F_k^2$$

روش ۱:

قسمت
باقیمانده

$$nF_{2k-1} \leq m^{1-\frac{1}{k}} (F_k)^2.$$

به ازای هر جمله در $\|x\|_{2k-1}^{2k-1}$ یک جمله در $\|x\|_k^{2k-1}$ داریم

$$nF_{2k-1} = n\|x\|_{2k-1}^{2k-1} \leq n\|x\|_k^{2k-1} = \|x\|_1\|x\|_k^{2k-1}$$

$$\leq m^{1-\frac{1}{k}}\|x\|_k\|x\|_k^{2k-1}$$

n همان نرم ۱ است.

$$= m^{1-\frac{1}{k}} F_k^2$$

روش ۲: یک مرحله‌ای

Pass 1: Pick a stream element $i = i_j$ uniformly at random

Pass 2: Compute x_i

Return $Y = nx_i^{k-1}$

از آنجا به بعد

$$Y' = n(r^k - (r-1)^k)$$

$$E[r] = \frac{x_i+1}{2} \leq r$$

بهتر

تحلیل:

$$E[Y'] = nE[(r^k - (r-1)^k)]$$

$$= n \frac{1}{n} \sum_i \sum_{j=1}^{x_i} [j^k - (j-1)^k]$$

$$= \sum_i x_i^k$$

ادامه تحلیل:

$$Y' = n(r^k - (r-1)^k) \leq nkr^{k-1} \leq kY$$

$$E[Y'^2] \leq k^2 E[Y^2] \leq k^2 m^{1-\frac{1}{k}} F_k^2$$

جمع‌بندی: الگوریتم برای همه k ‌های صحیح

تقریب $\epsilon \pm 1$

حافظه: $O\left(\frac{k^2 m^{1-\frac{1}{k}}}{\epsilon^2}\right)$ عدد

بعد نرم =
 k