

Couplage maximum dans un graphe biparti

Quentin Fortier

April 12, 2023

Couplage

Dans ce cours, $G = (V, E)$ est un graphe non orienté et non pondéré.

Définition

Un **couplage** de G est un ensemble d'arêtes $M \subseteq E$ tel qu'aucun sommet ne soit adjacent à 2 arêtes de M , c'est-à-dire :

$$\forall e_1, e_2 \in M, e_1 \neq e_2 \implies e_1 \cap e_2 = \emptyset$$

Couplage

Dans ce cours, $G = (V, E)$ est un graphe non orienté et non pondéré.

Définition

Un **couplage** de G est un ensemble d'arêtes $M \subseteq E$ tel qu'aucun sommet ne soit adjacent à 2 arêtes de M , c'est-à-dire :

$$\forall e_1, e_2 \in M, e_1 \neq e_2 \implies e_1 \cap e_2 = \emptyset$$

Définition

Un sommet $v \in V$ est **couvert** par M s'il appartient à une arête de M . Sinon, v est **libre** pour M .

Couplage

Dans ce cours, $G = (V, E)$ est un graphe non orienté et non pondéré.

Définition

Un **couplage** de G est un ensemble d'arêtes $M \subseteq E$ tel qu'aucun sommet ne soit adjacent à 2 arêtes de M , c'est-à-dire :

$$\forall e_1, e_2 \in M, e_1 \neq e_2 \implies e_1 \cap e_2 = \emptyset$$


Définition

Un sommet $v \in V$ est **couvert** par M s'il appartient à une arête de M . Sinon, v est **libre** pour M .


Applications :

- Mariage : chaque personne est mariée à au plus une autre personne
- Rech. de logement : couplage entre étudiants et logements


Couplage



Un graphe G



Un couplage de G (en rouge)



Pas un couplage

Exercice

Écrire une fonction

`est_couplage : int array array -> (int*int) list -> bool`
déterminant si un ensemble d'arêtes forme un couplage d'un graphe.

Soit M un couplage d'un graphe G .

Définitions

- La **taille** de M , notée $|M|$, est son nombre d'arêtes.
- M est un couplage **maximum** s'il n'existe pas d'autre couplage de taille strictement supérieure.
- M est un couplage **maximal** s'il n'existe pas de couplage M' tel que $M \subsetneq M'$.
- M est un couplage **parfait** si tout sommet de G appartient à une arête de M .

Couplage

Soit M un couplage d'un graphe G .

Définitions


- La **taille** de M , notée $|M|$, est son nombre d'arêtes.
- M est un couplage **maximum** s'il n'existe pas d'autre couplage de taille strictement supérieure.
- M est un couplage **maximal** s'il n'existe pas de couplage M' tel que $M \subsetneq M'$.
- M est un couplage **parfait** si tout sommet de G appartient à une arête de M .

Question

Quelle(s) implication(s) a-t-on entre couplage maximum et couplage maximal ?

Exercice

- 1 Le couplage ci-dessous est-il parfait ?
- 2 Quels sont les sommets couverts par ce couplage ? Et ceux libres ?
- 3 Le graphe ci-dessous admet-il un couplage parfait ?



On va s'intéresser au problème suivant :

Problème : Couplage maximum

Entrée : Graphe G non orienté, non pondéré.

Sortie : Un couplage maximum de G .

Chemin augmentant

Soit M un couplage d'un graphe G .

Définition

- Un chemin est **élémentaire** s'il ne passe pas deux fois par le même sommet.
- Un chemin élémentaire de G est **M -alternant** si ses arêtes sont alternativement dans M et dans $E \setminus M$.
- Un chemin de G est **M -augmentant** s'il est M -alternant et si ses extrémités sont libres pour M .

Chemin augmentant


Soit M un couplage d'un graphe G .

Définition

- Un chemin est **élémentaire** s'il ne passe pas deux fois par le même sommet.
- Un chemin élémentaire de G est **M -alternant** si ses arêtes sont alternativement dans M et dans $E \setminus M$.
- Un chemin de G est **M -augmentant** s'il est M -alternant et si ses extrémités sont libres pour M .

Question

Donner un exemple de chemin augmentant pour le couplage ci-dessous.



Définition (différence symétrique)

Si A et B sont des ensembles, $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

Chemin augmentant

Définition (différence symétrique)

Si A et B sont des ensembles, $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

Un chemin est vu comme un ensemble d'arêtes.

Théorème

Soit M un couplage de G et P un chemin M -augmentant dans G .
Alors $M \Delta P$ est un couplage de G .

Chemin augmentant

Définition (différence symétrique)


Si A et B sont des ensembles, $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

Un chemin est vu comme un ensemble d'arêtes.

Théorème

Soit M un couplage de G et P un chemin M -augmentant dans G . Alors $M \Delta P$ est un couplage de G .

Exemple : Dessiner $M \Delta P$ pour le couplage ci-dessous et le chemin $P = 3 - 0 - 1 - 4$.



Soit M un couplage d'un graphe G .

Théorème

M est un couplage maximum de G



Il n'existe pas de chemin M -augmentant dans G

Soit M un couplage d'un graphe G .

Théorème

M est un couplage maximum de G



Il n'existe pas de chemin M -augmentant dans G

Preuve :

\implies Soit M un couplage maximum.

Supposons qu'il existe un chemin M -augmentant P .

Alors $M \Delta P$ est un couplage de G et $|M \Delta P| > |M|$: absurde.

Théorème

M est un couplage maximum de G



Il n'existe pas de chemin M -augmentant dans G

Preuve :

\Leftarrow Supposons qu'il existe un couplage M^* vérifiant $|M^*| > |M|$.

Théorème

M est un couplage maximum de G



Il n'existe pas de chemin M -augmentant dans G

Preuve :

\Leftarrow Supposons qu'il existe un couplage M^* vérifiant $|M^*| > |M|$.
Considérons $G^* = (V, M \Delta M^*)$. Alors :

- 1 Les degrés des sommets de G^* sont au plus 2,

Théorème

M est un couplage maximum de G



Il n'existe pas de chemin M -augmentant dans G

Preuve :

\Leftarrow Supposons qu'il existe un couplage M^* vérifiant $|M^*| > |M|$.
Considérons $G^* = (V, M \Delta M^*)$. Alors :

- 1 Les degrés des sommets de G^* sont au plus 2, donc G^* est composé de cycles et de chemins uniquement.

Théorème

M est un couplage maximum de G



Il n'existe pas de chemin M -augmentant dans G

Preuve :

\Leftarrow Supposons qu'il existe un couplage M^* vérifiant $|M^*| > |M|$.
Considérons $G^* = (V, M \Delta M^*)$. Alors :

- 1 Les degrés des sommets de G^* sont au plus 2, donc G^* est composé de cycles et de chemins uniquement.
- 2 Chacun de ces cycles et chemins alternent entre des arêtes de M et des arêtes de M^* .

Théorème

M est un couplage maximum de G



Il n'existe pas de chemin M -augmentant dans G

Preuve :

\Leftarrow Supposons qu'il existe un couplage M^* vérifiant $|M^*| > |M|$.
Considérons $G^* = (V, M \Delta M^*)$. Alors :

- 1 Les degrés des sommets de G^* sont au plus 2, donc G^* est composé de cycles et de chemins uniquement.
- 2 Chacun de ces cycles et chemins alternent entre des arêtes de M et des arêtes de M^* .
- 3 Comme $|M^*| > |M|$, un de ces chemins contient plus d'arêtes de M^* que de M

Théorème

M est un couplage maximum de G



Il n'existe pas de chemin M -augmentant dans G


Preuve :

\Leftarrow Supposons qu'il existe un couplage M^* vérifiant $|M^*| > |M|$.
Considérons $G^* = (V, M \Delta M^*)$. Alors :

- 1 Les degrés des sommets de G^* sont au plus 2, donc G^* est composé de cycles et de chemins uniquement.
- 2 Chacun de ces cycles et chemins alternent entre des arêtes de M et des arêtes de M^* .
- 3 Comme $|M^*| > |M|$, un de ces chemins contient plus d'arêtes de M^* que de M : c'est un chemin M^* -augmentant.

Chemin augmentant

Illustration de la preuve précédente :



Un couplage M et un couplage maximum M^*

Chemin augmentant

Couplage maximum par chemin augmentant

Entrée : Graphe $G = (V, E)$

Sortie : Couplage maximum M de G

$M \leftarrow \emptyset$

Tant que il existe un chemin M -augmentant P dans G :

$M \leftarrow M \Delta P$

Chemin augmentant

Couplage maximum par chemin augmentant

Entrée : Graphe $G = (V, E)$

Sortie : Couplage maximum M de G

$M \leftarrow \emptyset$

Tant que il existe un chemin M -augmentant P dans G :

$M \leftarrow M \Delta P$

Question

Comment trouver un chemin M -augmentant ?

- Dans un graphe quelconque, avec le **Blossom algorithm** (très compliqué et HP).
- Plus facilement dans un graphe **biparti**.

Définition

Un graphe $G = (V, E)$ est **biparti** s'il existe une partition $V = A \sqcup B$ telle que toute arête de E a une extrémité dans A et une extrémité dans B .


Graphe biparti

Définition

Un graphe $G = (V, E)$ est **biparti** s'il existe une partition $V = A \sqcup B$ telle que toute arête de E a une extrémité dans A et une extrémité dans B .

Question

Montrer que le graphe ci-dessous est biparti, en donnant une partition de ses sommets.



Graphe biparti

Définition équivalente :

Définition

On appelle **k -coloration** de G une fonction $c : V \longrightarrow \{1, 2, \dots, k\}$ telle que pour tout arc $(u, v) \in E$, on a $c(u) \neq c(v)$.

Lemme

G admet une 2-coloration



G est biparti

Graphe biparti

Exercice

Écrire une fonction `est_biparti` : `int list array -> bool` pour déterminer si un graphe est biparti, en complexité linéaire.

Graphe biparti

Exercice

Écrire une fonction `est_biparti` : `int list array -> bool` pour déterminer si un graphe est biparti, en complexité linéaire.

Exercice

Modifier la fonction précédente pour renvoyer un 2-coloriage.

Pour trouver un chemin M -augmentant dans un graphe biparti G :

- 1 Partir d'un sommet libre.
- 2 Se déplacer en alternant entre des arêtes de M et des arêtes de $G \setminus M$, sans revenir sur un sommet visité (DFS).
- 3 Si on arrive à un sommet libre, alors on a trouvé un chemin M -augmentant.


Pour trouver un chemin M -augmentant dans un graphe biparti G :

- 1 Partir d'un sommet libre.
- 2 Se déplacer en alternant entre des arêtes de M et des arêtes de $G \setminus M$, sans revenir sur un sommet visité (DFS).
- 3 Si on arrive à un sommet libre, alors on a trouvé un chemin M -augmentant.

Question

Pourquoi cet algorithme ne fonctionne pas sur un graphe général (non biparti) ?

Graphe biparti



On peut aussi construire un graphe $\overrightarrow{G_M}$ pour simplifier la recherche d'un chemin M -augmentant.

Graphe biparti

On peut aussi construire un graphe $\overrightarrow{G_M}$ pour simplifier la recherche d'un chemin M -augmentant.

Soit $G = (V, E)$ un graphe biparti, avec $V = A \sqcup B$, et M un couplage de G .


On définit un graphe orienté $\overrightarrow{G_M} = (V_M, \overrightarrow{E_M})$ où :

- $V_M = V \cup \{s, t\}$, où s et t sont deux nouveaux sommets.
- $\overrightarrow{E_M} = \{(s, u) \mid u \in A \text{ et } u \text{ est libre}\} \cup \{(v, t) \mid v \in B \text{ et } v \text{ est libre}\} \cup \{(u, v) \mid \{u, v\} \in E \setminus M\} \cup \{(v, u) \mid \{u, v\} \in M\}$.

Autrement dit, $\overrightarrow{G_M}$ est construit à partir de G de la façon suivante :

- On ajoute deux nouveaux sommets s et t .
- On mets des arcs depuis s vers chaque sommet libre de A .
- On mets des arcs depuis chaque sommet libre de B vers t .
- On oriente les arcs de M de B vers A .
- On oriente les arcs de $E \setminus M$ de A vers B .

Graphe biparti



Théorème

\vec{P} est un chemin de s à t dans $\overrightarrow{G_M}$

\iff

$P \cap E$ est un chemin M -augmentant dans G
(où \vec{P} est obtenu à partir de P en enlevant les orientations)

Théorème

\vec{P} est un chemin de s à t dans $\overrightarrow{G_M}$

\iff

$P \cap E$ est un chemin M -augmentant dans G
(où \vec{P} est obtenu à partir de P en enlevant les orientations)

Il suffit donc de trouver un chemin de s à t dans $\overrightarrow{G_M}$ pour trouver un chemin M -augmentant dans G .

Théorème

\vec{P} est un chemin de s à t dans $\overrightarrow{G_M}$

\iff

$P \cap E$ est un chemin M -augmentant dans G
(où \vec{P} est obtenu à partir de P en enlevant les orientations)

Il suffit donc de trouver un chemin de s à t dans $\overrightarrow{G_M}$ pour trouver un chemin M -augmentant dans G .

Complexité :

Théorème

\vec{P} est un chemin de s à t dans $\overrightarrow{G_M}$

\iff

$P \cap E$ est un chemin M -augmentant dans G
(où \vec{P} est obtenu à partir de P en enlevant les orientations)

Il suffit donc de trouver un chemin de s à t dans $\overrightarrow{G_M}$ pour trouver un chemin M -augmentant dans G .

Complexité :

- 1 Construction de $\overrightarrow{G_M}$: $O(|V| + |E|)$.
- 2 Recherche d'un chemin de s à t dans $\overrightarrow{G_M}$: $O(|V| + |E|)$ (DFS ou BFS).

Total : $O(|V| + |E|)$.

Graphe biparti

Couplage maximum par chemin augmentant

Entrée : Graphe $G = (V, E)$

Sortie : Couplage maximum M de G

$M \leftarrow \emptyset$

Tant que il existe un chemin M -augmentant P dans G :

$M \leftarrow M \Delta P$

Complexité :

Il y a au plus $|E|$ d'itération du « Tant que », car on ajoute une arête au couplage à chaque fois.


Sur un graphe biparti, on obtient alors une complexité

$O(|E|(|V| + |E|))$ ($= \boxed{O(|V||E|)}$ si G est supposé connexe).

Graphe biparti

Question

Appliquer l'algorithme précédent au graphe ci-dessous.



Exercice (TP pendant les vacances)

Écrire une fonction `couplage_max` telle que, si g est un graphe biparti représenté par liste d'adjacence et a, b partitionne les sommets de g , alors `couplage_max g a b` renvoie un couplage maximal de g .