

Nombres réels et complexes

Rationnels et irrationnels

Exercice 1 [02093] [Correction]

Montrer que $\sqrt{2}$ n'est pas un nombre rationnel

Exercice 2 [02095] [Correction]

Soit $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ telle que

$$\forall x, y \in \mathbb{Q}, f(x+y) = f(x) + f(y).$$

- On suppose f constante égale C quelle est la valeur de C ?
On revient au cas général.
- Calculer $f(0)$.
- Montrer que $\forall x \in \mathbb{Q}, f(-x) = -f(x)$.
- Établir que $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{Q}, f(nx) = nf(x)$ et généraliser cette propriété à $n \in \mathbb{Z}$.
- On pose $a = f(1)$. Montrer que $\forall x \in \mathbb{Q}, f(x) = ax$.

Exercice 3 [02472] [Correction]

Montrer que

$$\left(\frac{2}{3} + \frac{41}{81}\sqrt{\frac{5}{3}}\right)^{1/3} + \left(\frac{2}{3} - \frac{41}{81}\sqrt{\frac{5}{3}}\right)^{1/3}$$

est un rationnel. On conseille d'effectuer les calculs par ordinateur.

Exercice 4 [03668] [Correction]

(Irrationalité de e^r pour $r \in \mathbb{Q}^*$)

- Pour $a, b \in \mathbb{N}^*$, montrer que la fonction polynomiale

$$P_n(x) = \frac{1}{n!}x^n(bx-a)^n$$

et ses dérivées successives prennent en $x = 0$ des valeurs entières.

- Établir la même propriété en $x = a/b$

- On pose $r = a/b$ et pour $n \in \mathbb{N}^*$

$$I_n = \int_0^r P_n(t)e^t dt.$$

Montrer que $I_n \rightarrow 0$.

- En supposant $e^r = p/q$ avec $p, q \in \mathbb{N}^*$, montrer que $qI_n \in \mathbb{Z}$. Conclure.

Exercice 5 [04972] [Correction]

Montrer que $\sqrt{2} + \sqrt[3]{3}$ est un nombre irrationnel.

Les nombres réels

Exercice 6 [02099] [Correction]

Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application telle que :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x+y) = f(x) + f(y);$$

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(xy) = f(x)f(y);$$

$$\exists x \in \mathbb{R}, f(x) \neq 0.$$

- Calculer $f(0)$, $f(1)$ et $f(-1)$.
- Déterminer $f(x)$ pour $x \in \mathbb{Z}$ puis pour $x \in \mathbb{Q}$.
- Démontrer que $\forall x \geq 0, f(x) \geq 0$. En déduire que f est croissante.
- Conclure que $f = \text{Id}_{\mathbb{R}}$.

Exercice 7 [03404] [Correction]

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$. On suppose

$$\sum_{k=1}^n x_k = \sum_{k=1}^n x_k^2 = n.$$

Montrer que pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, $x_k = 1$.

Inégalités

Exercice 8 [03643] [Correction]

Soient $x, y \in [0; 1]$. Montrer

$$x^2 + y^2 - xy \leq 1.$$

Exercice 9 [03224] [\[Correction\]](#)

Montrer

$$\forall u, v \geq 0, 1 + \sqrt{uv} \leq \sqrt{1+u}\sqrt{1+v}.$$

Exercice 10 [01733] [\[Correction\]](#)Déterminer tous les couples $(\alpha, \beta) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$ pour lesquels il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall x, y > 0, x^\alpha y^\beta \leq M(x+y).$$

Exercice 11 [03640] [\[Correction\]](#)Soient (x_1, \dots, x_n) et (y_1, \dots, y_n) deux suites réelles monotones. Comparer

$$\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k\right) \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n y_k\right) \text{ et } \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k y_k.$$

Exercice 12 [04017] [\[Correction\]](#)

Montrer que

$$\forall x, y \in [0; 1], \min\{xy, (1-x)(1-y)\} \leq \frac{1}{4}.$$

Partie entière

Exercice 13 [02102] [\[Correction\]](#)

Montrer

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \lfloor x \rfloor + \lfloor x+y \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq \lfloor 2x \rfloor + \lfloor 2y \rfloor.$$

Exercice 14 [02104] [\[Correction\]](#)

Montrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=0}^{n-1} \left\lfloor x + \frac{k}{n} \right\rfloor = \lfloor nx \rfloor.$$

Exercice 15 [02105] [\[Correction\]](#)Soit $a \leq b \in \mathbb{R}$. Établir

$$\text{Card}([a; b] \cap \mathbb{Z}) = \lfloor b \rfloor + \lfloor 1-a \rfloor.$$

Exercice 16 [02106] [\[Correction\]](#)Soit $n \in \mathbb{N}^*$.(a) Montrer qu'il existe $(a_n, b_n) \in \mathbb{N}^{*2}$ tel que

$$(2 + \sqrt{3})^n = a_n + b_n \sqrt{3} \text{ et } 3b_n^2 = a_n^2 - 1.$$

(b) Montrer que la partie entière de $(2 + \sqrt{3})^n$ est un entier impair.

Les nombres complexes

Exercice 17 [02029] [\[Correction\]](#)Calculer pour $\theta \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$,

$$C_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(k\theta) \text{ et } S_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \sin(k\theta).$$

Exercice 18 [03107] [\[Correction\]](#)Soit B une partie bornée non vide de \mathbb{C} .On suppose que si $z \in B$ alors $1-z+z^2 \in B$ et $1+z+z^2 \in B$.Déterminer B .**Exercice 19** [03651] [\[Correction\]](#)Soient a, b, z trois complexes de module 1 deux à deux distincts. Démontrer

$$\frac{b}{a} \left(\frac{z-a}{z-b} \right)^2 \in \mathbb{R}_+^*.$$

Le plan complexe

Exercice 20 [02027] [\[Correction\]](#)(a) Déterminer le lieu des points M d'affixe z qui sont alignés avec I d'affixe i et M' d'affixe iz .(b) Déterminer de plus le lieu des points M' correspondant.**Exercice 21** [03040] [\[Correction\]](#)Quelle est l'image du cercle unité par l'application $z \mapsto \frac{1}{1-z}$?

Exercice 22 [02050] [\[Correction\]](#)

Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tels que

$$z + \bar{z} = |z|.$$

Exercice 23 [03880] [\[Correction\]](#)

Soient a, b, c des réels strictement positifs.

À quelle condition existe-t-il des complexes t, u, v de somme nulle vérifiant

$$t\bar{t} = a^2, u\bar{u} = b^2 \text{ et } v\bar{v} = c^2.$$

Module et argument

Exercice 24 [02030] [\[Correction\]](#)

Déterminer module et argument de

$$z = \sqrt{2 + \sqrt{2}} + i\sqrt{2 - \sqrt{2}}.$$

Exercice 25 [02031] [\[Correction\]](#)

Soient $z \in \mathbb{C}^*$ et $z' \in \mathbb{C}$. Montrer

$$|z + z'| = |z| + |z'| \iff \exists \lambda \in \mathbb{R}_+, z' = \lambda z.$$

Exercice 26 [02032] [\[Correction\]](#)

Établir :

$$\forall z, z' \in \mathbb{C}, |z| + |z'| \leq |z + z'| + |z - z'|.$$

Interprétation géométrique et précision du cas d'égalité?

Exercice 27 [00055] [\[Correction\]](#)

Soit $a \in \mathbb{C}$ tel que $|a| < 1$.

Déterminer l'ensemble des complexes z tels que

$$\left| \frac{z - a}{1 - \bar{a}z} \right| \leq 1.$$

Exercice 28 [03642] [\[Correction\]](#)

(a) Vérifier

$$\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}, |z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 = 2|z_1|^2 + 2|z_2|^2.$$

(b) On suppose $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ tels que $|z_1| \leq 1$ et $|z_2| \leq 1$. Montrer qu'il existe $\varepsilon = 1$ ou -1 tel que

$$|z_1 + \varepsilon z_2| \leq \sqrt{2}.$$

Exercice 29 [03249] [\[Correction\]](#)

Soit $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ définie par

$$f(z) = \frac{z + |z|}{2}.$$

Déterminer les valeurs prises par f .

Exercice 30 [02052] [\[Correction\]](#)

Résoudre l'équation $|z + 1| = |z| + 1$ d'inconnue $z \in \mathbb{C}$.

Racines de l'unité

Exercice 31 [02037] [\[Correction\]](#)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note U_n l'ensemble des racines n -ème de l'unité.

Calculer

$$\sum_{z \in U_n} |z - 1|.$$

Exercice 32 [03353] [\[Correction\]](#)

Soient $n \geq 3$, $\omega_1, \dots, \omega_n$ les racines n -ième de l'unité avec $\omega_n = 1$.

(a) Calculer pour $p \in \mathbb{Z}$,

$$S_p = \sum_{i=1}^n \omega_i^p.$$

(b) Calculer

$$T = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{1 - \omega_i}.$$

Exercice 33 [02038] [\[Correction\]](#)

Soit ω une racine n ème de l'unité différente de 1. On pose

$$S = \sum_{k=0}^{n-1} (k+1)\omega^k.$$

En calculant $(1-\omega)S$, déterminer la valeur de S .

Exercice 34 [02039] [\[Correction\]](#)

Simplifier :

$$(a) \ j(j+1) \qquad (b) \ \frac{j}{j^2+1} \qquad (c) \ \frac{j+1}{j-1}$$

Exercice 35 [02040] [\[Correction\]](#)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Résoudre l'équation

$$(z+1)^n = (z-1)^n.$$

Combien y a-t-il de solutions ?

Exercice 36 [02043] [\[Correction\]](#)

Soit $\omega = e^{i\frac{2\pi}{7}}$. Calculer les nombres :

$$A = \omega + \omega^2 + \omega^4 \text{ et } B = \omega^3 + \omega^5 + \omega^6.$$

Exercice 37 [02044] [\[Correction\]](#)

Soient $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ et $\omega = \exp(2i\pi/n)$.

(a) Établir que pour tout $z \in \mathbb{C}$, $z \neq 1$,

$$\prod_{k=1}^{n-1} (z - \omega^k) = \sum_{\ell=0}^{n-1} z^\ell.$$

(b) Justifier que l'égalité reste valable pour $z = 1$.

(c) En déduire l'égalité

$$\prod_{k=1}^{n-1} \sin \frac{k\pi}{n} = \frac{n}{2^{n-1}}.$$

Exercice 38 [02531] [\[Correction\]](#)

Montrer que

$$\sin\left(\frac{\pi}{5}\right) = \sqrt{\frac{5-\sqrt{5}}{8}}.$$

Équations algébriques

Exercice 39 [02045] [\[Correction\]](#)

Pour quels $a \in \mathbb{R}$ l'équation $x^3 + 2x^2 + 2ax - a^2 = 0$ possède $x = 1$ pour solution ? Quelles sont alors les autres solutions de l'équation ?

Exercice 40 [02046] [\[Correction\]](#)

Résoudre dans \mathbb{C} , les équations :

$$(a) \ z^2 - 2iz - 1 + 2i = 0$$

$$(b) \ z^4 - (5 - 14i)z^2 - 2(12 + 5i) = 0.$$

Exercice 41 [02047] [\[Correction\]](#)

(a) Déterminer les racines carrées complexes de $5 - 12i$.

(b) Résoudre l'équation $z^3 - (1 + 2i)z^2 + 3(1 + i)z - 10(1 + i) = 0$ en commençant par observer l'existence d'une solution imaginaire pure.

(c) Quelles particularités a le triangle dont les sommets ont pour affixe les solutions de l'équation précédente ?

Exercice 42 [02048] [\[Correction\]](#)

Résoudre dans \mathbb{C} le système

$$\begin{cases} x + y = 1 + i \\ xy = 2 - i. \end{cases}$$

Exponentielle complexe

Exercice 43 [02051] [\[Correction\]](#)

Soit $Z \in \mathbb{C}^*$. Résoudre l'équation $e^z = Z$ d'inconnue $z \in \mathbb{C}$.

Exponentielles imaginaires

Exercice 44 [02034] [\[Correction\]](#)

Simplifier $\frac{e^{i\theta}-1}{e^{i\theta}+1}$ pour $\theta \in]-\pi; \pi[$.

Exercice 45 [02035] [\[Correction\]](#)

Déterminer module et argument de $e^{i\theta} + e^{i\theta'}$ pour $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$.

Corrections

Exercice 1 : [énoncé]

Par l'absurde supposons $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$.

On peut alors écrire $\sqrt{2} = p/q$ avec $p, q \in \mathbb{N}^*$ et, quitte à simplifier, p et q non tous les deux pairs.

On a alors $2q^2 = p^2$.

p est alors nécessairement pair car p^2 est pair. Cela permet d'écrire $p = 2k$ avec $k \in \mathbb{N}$ puis $q^2 = 2k^2$.

Mais alors q est pair. Par suite p et q sont tous les deux pairs.

Absurde.

Exercice 2 : [énoncé]

- (a) La relation $f(x+y) = f(x) + f(y)$ avec f constante égale à C donne $C = C + C$ d'où $C = 0$.
- (b) Pour $x = y = 0$, la relation $f(x+y) = f(x) + f(y)$ implique $f(0) = 0$.
- (c) Pour $y = -x$, la relation $f(x+y) = f(x) + f(y)$ donne $0 = f(-x) + f(x)$ d'où $f(-x) = -f(x)$.
- (d) Par récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{Q}, f(nx) = nf(x).$$

Pour $n \in \mathbb{Z}^-$, $n = -p$ avec $p \in \mathbb{N}$ et

$$f(nx) = f(-px) = -f(px) = -pf(x) = nf(x).$$

- (e) On peut écrire $x = p/q$ avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$.

$$f(x) = f(p \times \frac{1}{q}) = pf(\frac{1}{q})$$

or

$$a = f(1) = f(q \times \frac{1}{q}) = qf(\frac{1}{q})$$

donc

$$f(\frac{1}{q}) = \frac{a}{q}$$

puis

$$f(x) = \frac{ap}{q} = ax.$$

Exercice 3 : [énoncé]

On définit le nombre x étudié

$$x := (2/3 + 41/81 \sqrt{5/3})^{1/3} + (2/3 - 41/81 \sqrt{5/3})^{1/3};$$

Attention à définir les racines cubiques par des exposants $1/3$ avec parenthèses.

On peut commencer par estimer la valeur cherchée

`evalf(x);`

Nous allons chercher à éliminer les racines cubiques. Pour cela on calcule x^3

`expand(x^3);`

Dans l'expression obtenue, on peut faire apparaître x par factorisation du terme

$$\left(\frac{2}{3} + \frac{41}{243}\sqrt{15}\right)^{1/3} \left(\frac{2}{3} - \frac{41}{243}\sqrt{15}\right)^{1/3}.$$

Simplifions ce terme

`simplify((2/3+41/243*sqrt(15))^(1/3)*`
`(2/3-41/243*sqrt(15))^(1/3), assume=positive);`

On obtient

$$\frac{1}{81}(486 + 123\sqrt{15})^{1/3}(486 - 123\sqrt{15})^{1/3}.$$

Développons selon $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$

$$(486^2 - 123^2 \cdot 15)^{1/3};$$

donne 9261. Enfin

`ifactor(9261);`

permet de conclure que

$$\left(\frac{2}{3} + \frac{41}{243}\sqrt{15}\right)^{1/3} \left(\frac{2}{3} - \frac{41}{243}\sqrt{15}\right)^{1/3} = \frac{7}{27}.$$

Ainsi x est solution de l'équation

$$x^3 = \frac{4}{3} + \frac{7}{9}x.$$

En factorisant le polynôme sous-jacent

`factor(x^3-7/9*x-4/3);`

on obtient

$$(3x-4)(3x^2+4x+3) = 0.$$

Puisque $3x^2 + 4x + 3 > 0$, on peut conclure

$$x = 4/3.$$

Exercice 4 : [énoncé]

(a) 0 est racine de multiplicité n de P_n donc

$$\forall m < n, P_n^{(m)}(0) = 0.$$

Le polynôme P_n est de degré $2n$ donc $P_n^{(m)} = 0$ pour tout $m > 2n$ et ainsi

$$\forall m > 2n, P_n^{(m)}(0) = 0.$$

Reste à traiter le cas $n \leq m \leq 2n$. En développant par la formule du binôme

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{n!} \binom{n}{k} (-a)^{n-k} b^k x^{n+k}.$$

Puisque $P_n^{(m)}(0)$ est donné par la dérivation du terme x^m , on obtient

$$P_n^{(m)}(0) = \frac{1}{n!} \binom{n}{m-n} (-a)^{2n-m} b^{m-n} (n+m)! \in \mathbb{Z}.$$

(b) On remarque

$$\forall x \in \mathbb{R}, P_n(a/b - x) = P_n(x)$$

donc

$$\forall m \in \mathbb{N}, P_n^{(m)}(a/b) = (-1)^m P_n^{(m)}(0) \in \mathbb{Z}.$$

(c) On a

$$|I_n - 0| = \frac{1}{n!} \left| \int_0^r t^n (bt - a)^n e^t dt \right| \leq \frac{1}{n!} r^{n+1} (br + a)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

(d) Par intégration par parties

$$I_n = \left[P_n(t) e^t \right]_0^r - \int_0^r P_n'(t) e^t dt$$

et en répétant l'opération

$$I_n = \left[\sum_{m=0}^{2n} (-1)^m P_n^{(m)}(t) e^t \right]_0^r.$$

On en déduit

$$qI_n = \sum_{m=0}^{2n} (-1)^m (P_n^{(m)}(r)p - P_n^{(m)}(0)q) \in \mathbb{Z}.$$

Or sur $[0; r]$ la fonction $t \mapsto P_n(t)e^t$ est continue, positive sans être nulle et $0 < r$ donc $I_n > 0$.

Ainsi $qI_n \rightarrow 0$, $qI_n > 0$ et $qI_n \in \mathbb{Z}$: c'est absurde.

Notons qu'on en déduit immédiatement l'irrationalité de $\ln r$ pour $r \in \mathbb{Q}^{+*} \setminus \{1\}$.

Exercice 5 : [énoncé]

On exprime $x = \sqrt{2} + \sqrt[3]{3}$ comme solution d'une équation « simple ». En développant¹ le premier membre de l'équation $(x - \sqrt{2})^3 = 3$, on obtient

$$x^3 - 3\sqrt{2}x^2 + 6x - 2\sqrt{2} = 3.$$

En réordonnant les membres de cette équation, on écrit

$$(3x^2 + 2)\sqrt{2} = x^3 + 6x - 3 \quad \text{puis} \quad \sqrt{2} = \frac{x^3 + 6x - 3}{3x^2 + 2}.$$

Par opérations dans \mathbb{Q} , si x est un nombre rationnel, $\sqrt{2}$ est aussi un nombre rationnel. C'est absurde.

Exercice 6 : [énoncé]

(a) $f(0) = f(0+0) = f(0) + f(0)$ donc $f(0) = 0$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f(1.x) = f(1)f(x).$$

Comme f est non nulle, on a $f(1) = 1$.

$$f(1) + f(-1) = f(0) = 0 \text{ donc } f(-1) = -1.$$

(b) Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$: $f(n) = n$.

De plus

$$f(-n) = f((-1) \times n) = f(-1) \times f(n) = -f(n) = -n$$

donc

$$\forall x \in \mathbb{Z}, f(x) = x.$$

Pour $x \in \mathbb{Q}$, $x = \frac{p}{q}$ avec $p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^*$,

$$f(x) = f(p \times \frac{1}{q}) = f(p) \times f(\frac{1}{q}).$$

Or $f(p) = p$ et

$$1 = f(1) = f(q \times \frac{1}{q}) = f(q) \times f(\frac{1}{q}) = q \times f(\frac{1}{q})$$

donc $f(\frac{1}{q}) = \frac{1}{q}$. Par suite $f(x) = x$.

1. On emploie la formule $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$.

(c)

$$\forall x \geq 0, f(x) = f(\sqrt{x}\sqrt{x}) = (f(\sqrt{x}))^2 \geq 0.$$

Pour $x, y \in \mathbb{R}$, si $x \leq y$ alors

$$f(y) = f(x + y - x) = f(x) + f(y - x) \geq f(x).$$

Ainsi f est croissante.

(d) Pour $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \leq x < \frac{\lfloor nx \rfloor + 1}{n}.$$

Comme f est croissante :

$$f\left(\frac{\lfloor nx \rfloor}{n}\right) \leq f(x) < f\left(\frac{\lfloor nx \rfloor + 1}{n}\right)$$

puis

$$\frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \leq f(x) < \frac{\lfloor nx \rfloor + 1}{n}.$$

À la limite, quand $n \rightarrow +\infty$, on obtient $x \leq f(x) \leq x$ i.e. $f(x) = x$.

Finalement, $f = \text{Id}_{\mathbb{R}}$.

Exercice 7 : [énoncé]

On a

$$\sum_{k=1}^n (x_k - 1)^2 = \sum_{k=1}^n x_k^2 - 2 \sum_{k=1}^n x_k + \sum_{k=1}^n 1 = 0$$

et puisqu'une somme de quantités positives n'est nulle que si chaque quantité est nulle, on obtient

$$\forall 1 \leq k \leq n, x_k = 1.$$

Exercice 8 : [énoncé]

Sachant $x^2 \leq x$ et $y^2 \leq y$, on a

$$x^2 + y^2 - xy - 1 \leq x + y - xy - 1 = (x - 1)(1 - y) \leq 0.$$

Exercice 9 : [énoncé]

Compte tenu de la positivité des membres, le problème revient à établir

$$(1 + \sqrt{uv})^2 \leq (1 + u)(1 + v)$$

soit encore

$$2\sqrt{uv} \leq u + v$$

ce qui découle de la propriété

$$(\sqrt{u} - \sqrt{v})^2 \geq 0.$$

Exercice 10 : [énoncé]

Soit (α, β) solution. Considérons

$$f(x, y) = \frac{x^\alpha y^\beta}{x + y}$$

sur $(\mathbb{R}_+^*)^2$.

On a

$$f(x, x) = \frac{x^{\alpha+\beta}}{2x}$$

f bornée implique $\alpha + \beta = 1$.

Inversement, supposons $\alpha + \beta = 1$.

Si $y \geq x$ alors

$$0 \leq f(x, y) = \frac{x^\alpha y^{1-\alpha}}{x + y} \leq \frac{y}{x + y} \left(\frac{x}{y}\right)^\alpha \leq 1.$$

Si $x \geq y$ alors idem.

Exercice 11 : [énoncé]

Étudions la différence

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k y_k - \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k \right) \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n y_k \right) = \frac{1}{n^2} \left(\sum_{k=1}^n n x_k y_k - \sum_{k=1}^n \sum_{\ell=1}^n x_k y_\ell \right)$$

ce qui donne encore

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k y_k - \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k \right) \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n y_k \right) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \sum_{\ell=1}^n (x_k y_k - x_k y_\ell).$$

Or

$$\sum_{k=1}^n \sum_{\ell=1}^n (x_k y_k - x_k y_\ell) = \sum_{k=1}^n \sum_{\ell=1}^n x_k (y_k - y_\ell) = \sum_{1 \leq \ell < k \leq n} x_k (y_k - y_\ell) + \sum_{1 \leq k < \ell \leq n} x_k (y_k - y_\ell)$$

car lorsque $k = \ell$ le terme $x_k(y_k - y_\ell)$ est nul.

Par changement d'indice, on peut réécrire la dernière somme

$$\sum_{1 \leq k < \ell \leq n} x_k (y_k - y_\ell) = \sum_{1 \leq \ell < k \leq n} x_\ell (y_\ell - y_k)$$

et alors

$$\sum_{k=1}^n \sum_{\ell=1}^n (x_k y_k - x_k y_\ell) = \sum_{1 \leq \ell < k \leq n} (x_k - x_\ell)(y_k - y_\ell).$$

Les termes sommés sont alors tous de même signe, à savoir positif si les suites $(x_i)_{1 \leq i \leq n}$ et $(y_i)_{1 \leq i \leq n}$ ont même monotonie et négatifs si ces deux suites sont de monotonies contraires.

Au final, si les deux suites ont même monotonie alors

$$\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k \right) \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n y_k \right) \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k y_k$$

et si les deux suites sont de monotonies contraires alors

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k y_k \leq \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k \right) \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n y_k \right).$$

Exercice 12 : [énoncé](#)

Commençons par résoudre le min. On a

$$xy \leq (1-x)(1-y) \iff x+y \leq 1.$$

Cas $x+y \leq 1$:

$$\min\{xy, (1-x)(1-y)\} = xy \leq x(1-x) \leq \frac{1}{4}.$$

Cas $x+y > 1$:

$$\min\{xy, (1-x)(1-y)\} = (1-x)(1-y) < (1-x)x \leq 1/4.$$

Exercice 13 : [énoncé](#)

Si $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1/2$ et $\lfloor y \rfloor \leq y < \lfloor y \rfloor + 1/2$ alors

$$\begin{aligned} \lfloor x+y \rfloor &= \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor, \\ \lfloor 2x \rfloor &= 2 \lfloor x \rfloor \text{ et} \\ \lfloor 2y \rfloor &= 2 \lfloor y \rfloor \end{aligned}$$

puis relation voulue.

Si $\lfloor x \rfloor + 1/2 \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$ et $\lfloor y \rfloor \leq y < \lfloor y \rfloor + 1/2$ alors

$$\begin{aligned} \lfloor x+y \rfloor &\leq \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 1, \\ \lfloor 2x \rfloor &= 2 \lfloor x \rfloor + 1 \text{ et} \\ \lfloor 2y \rfloor &= 2 \lfloor y \rfloor \end{aligned}$$

puis la relation voulue.

Si $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1/2$ et $\lfloor y \rfloor + 1/2 \leq y < \lfloor y \rfloor + 1$: c'est analogue.

Si $\lfloor x \rfloor + 1/2 \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$ et $\lfloor y \rfloor + 1/2 \leq y < \lfloor y \rfloor + 1$ alors

$$\begin{aligned} \lfloor x+y \rfloor &\leq \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 2, \\ \lfloor 2x \rfloor &= 2 \lfloor x \rfloor + 1 \text{ et} \\ \lfloor 2y \rfloor &= 2 \lfloor y \rfloor + 1 \end{aligned}$$

puis la relation voulue.

Dans tous les cas la relation proposée est vérifiée.

Exercice 14 : [énoncé](#)

Posons $m = \lfloor nx \rfloor$ et réalisons la division euclidienne de m par n : $m = nq + r$ avec $0 \leq r \leq n-1$.

On a $nq + r \leq nx < nq + r + 1$ donc pour tout $k \in \{0, \dots, n-1\}$:

$$q + \frac{k+r}{n} \leq x + \frac{k}{n} < q + \frac{k+r+1}{n}.$$

Si $k+r < n$ alors $\left\lfloor x + \frac{k}{n} \right\rfloor = q$ et si $k+r \geq n$ alors $\left\lfloor x + \frac{k}{n} \right\rfloor = q+1$.

Par suite

$$\sum_{k=0}^{n-1} \left\lfloor x + \frac{k}{n} \right\rfloor = \sum_{k=0}^{n-r-1} \left\lfloor x + \frac{k}{n} \right\rfloor + \sum_{k=n-r}^{n-1} \left\lfloor x + \frac{k}{n} \right\rfloor = nq + r = m = \lfloor nx \rfloor.$$

Exercice 15 : [\[énoncé\]](#)

Si $a \notin \mathbb{Z}$ alors $[a; b] \cap \mathbb{Z} = \{[a] + 1, [a] + 2, \dots, [b]\}$ donc

$$\text{Card}([a; b] \cap \mathbb{Z}) = [b] - [a].$$

Or

$$[1 - a] = 1 + [-a] = -[a]$$

car $a \notin \mathbb{Z}$ donc

$$\text{Card}([a; b] \cap \mathbb{Z}) = [b] + [1 - a].$$

Si $a \in \mathbb{Z}$ alors $[a; b] \cap \mathbb{Z} = \{a, a + 1, \dots, [b]\}$ donc

$$\text{Card}([a; b] \cap \mathbb{Z}) = [b] - a + 1 = [b] + [1 - a]$$

car $1 - a \in \mathbb{Z}$.

Exercice 16 : [\[énoncé\]](#)

(a) Par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$.

Pour $n = 1$, $a_1 = 2$ et $b_1 = 1$ conviennent.

Supposons la propriété établie au rang $n \geq 1$.

$$(2 + \sqrt{3})^{n+1} = (2 + \sqrt{3})(a_n + b_n\sqrt{3}) = a_{n+1} + b_{n+1}\sqrt{3}$$

avec $a_{n+1} = 2a_n + 3b_n$ et $b_{n+1} = a_n + 2b_n$ de sorte que

$$3b_{n+1}^2 - a_{n+1}^2 = -a_n^2 + 3b_n^2 = -1.$$

Récurrence établie.

(b) $a_n - 1 \leq b_n\sqrt{3} < a_n$ donc $2a_n - 1 \leq (2 + \sqrt{3})^n < 2a_n$ donc

$$[(2 + \sqrt{3})^n] = 2a_n - 1.$$

C'est un entier impair.

Exercice 17 : [\[énoncé\]](#)

C_n et S_n sont les parties réelles et imaginaires de

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} e^{ik\theta} = (1 + e^{i\theta})^n = 2^n e^{i\frac{n\theta}{2}} \cos^n \frac{\theta}{2}.$$

Ainsi

$$C_n = 2^n \cos \frac{n\theta}{2} \cos^n \frac{\theta}{2} \text{ et } S_n = 2^n \sin \frac{n\theta}{2} \cos^n \frac{\theta}{2}.$$

Exercice 18 : [\[énoncé\]](#)

On observe que $B = \{i, -i\}$ est solution. Montrons qu'il n'y en a pas d'autres...

Posons $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ et $g: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ définies par

$$f(z) = 1 - z + z^2 \text{ et } g(z) = 1 + z + z^2.$$

On remarque

$$|f(z) - i| = |z + i| |z - (1 + i)|, |f(z) + i| = |z - i| |z - (1 - i)|.$$

$$|g(z) - i| = |z - i| |z + 1 + i| \text{ et } |g(z) + i| = |z + i| |z + 1 - i|.$$

Soient $a \in B$ et $(z_n)_{n \geq 0}$ la suite d'éléments de B définie par $z_0 = a$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$z_{n+1} = \begin{cases} f(z_n) & \text{si } \text{Re}(z_n) \leq 0 \\ g(z_n) & \text{si } \text{Re}(z_n) > 0. \end{cases}$$

Posons enfin

$$u_n = |z_n^2 + 1| = |z_n - i| |z_n + i|.$$

Si $\text{Re}(z_n) \leq 0$ alors

$$u_{n+1} = |f(z_n) - i| |f(z_n) + i| = u_n |z_n - (1 + i)| |z_n - (1 - i)|.$$

Selon le signe de la partie imaginaire de z_n , l'un au moins des deux modules $|z_n - (1 + i)|$ et $|z_n - (1 - i)|$ est supérieur à $\sqrt{2}$ alors que l'autre est supérieur à 1. Ainsi

$$u_{n+1} \geq \sqrt{2} u_n.$$

Si $\text{Re}(z_n) > 0$, on obtient le même résultat.

On en déduit que si $u_0 \neq 0$ alors la suite (u_n) n'est pas bornée. Or la partie B est bornée donc $u_0 = 0$ puis $a = \pm i$. Ainsi $B \subset \{i, -i\}$.

Sachant $B \neq \emptyset$ et sachant que l'appartenance de i entraîne celle de $-i$ et inversement, on peut conclure

$$B = \{i, -i\}.$$

Exercice 19 : [\[énoncé\]](#)

Rappelons que si u est un complexe de module alors $1/u = \bar{u}$.

On a alors

$$(z - a)^2 = (z - a) \left(\frac{1}{\bar{z}} - \frac{1}{\bar{a}} \right) = \frac{(z - a)(\bar{a} - \bar{z})}{\bar{a}\bar{z}} = -a \frac{|z - a|^2}{\bar{z}}$$

donc

$$\frac{b}{a} \left(\frac{z - a}{z - b} \right)^2 = \frac{|z - a|^2}{|z - b|^2} \in \mathbb{R}_+^*.$$

Exercice 20 : [énoncé](a) $M = I$ est solution.

Pour $M \neq I$, I, M, M' sont alignés si, et seulement si, il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\overrightarrow{IM'} = \lambda \overrightarrow{IM}$ i.e. $\frac{iz-i}{z-i} \in \mathbb{R}$.

Posons $x = \operatorname{Re}(z)$ et $y = \operatorname{Im}(z)$.

$$\operatorname{Im}\left(\frac{iz-i}{z-i}\right) = 0 \iff x(x-1) + y(y-1) = 0 \iff \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}.$$

Finalement le lieu des points M solutions est le cercle de centre $\Omega \begin{vmatrix} 1/2 \\ 1/2 \end{vmatrix}$ et de rayon $1/\sqrt{2}$.

(b) Le point M' est l'image de M par la rotation de centre O et d'angle $\pi/2$.

Le lieu des points M' est donc le cercle de centre $\Omega' \begin{vmatrix} -1/2 \\ 1/2 \end{vmatrix}$ et de rayon $1/\sqrt{2}$.

Exercice 21 : [énoncé]

Soit z un complexe du cercle unité avec $z \neq 1$. Il existe $\theta \in]0; 2\pi[$ tel que $z = e^{i\theta}$.

On a alors

$$\frac{1}{1-z} = \frac{1}{1-e^{i\theta}} = e^{-i\theta/2} \frac{i}{2\sin\theta/2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}i \cot \frac{\theta}{2}.$$

Quand θ parcourt $]0; 2\pi[$ (ce qui revient à faire parcourir à z le cercle unité), l'expression $\cot(\theta/2)$ prend toutes les valeurs de \mathbb{R} . L'image du cercle unité est la droite d'équation $x = 1/2$.

Exercice 22 : [énoncé]

Soit $M(z)$ solution avec $z = a + ib$ et $a, b \in \mathbb{R}$.

On a $2a = \sqrt{a^2 + b^2}$ donc $a \geq 0$ et $b = \pm\sqrt{3}a$.

Ainsi M se situe sur les demi-droites d'origine O dirigée par les vecteurs

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix}.$$

Inversement : ok.

Exercice 23 : [énoncé]

En multipliant les trois complexes t, u, v par $e^{i\theta}$, on peut former un nouveau triplet solution à partir d'un premier. Sans perte de généralité, on peut donc supposer $t \in \mathbb{R}_+$ auquel cas $t = a$.

En écrivant $u = x + iy$ et $v = x' + iy'$ avec $x, x', y, y' \in \mathbb{R}$, la condition $t + u + v = 0$ donne

$$\begin{cases} x' = -(a+x) \\ y' = -y \end{cases}$$

et les deux conditions $u\bar{u} = b^2$ et $v\bar{v} = c^2$ équivalent alors au système

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = b^2 \\ (x+a)^2 + y^2 = c^2. \end{cases}$$

Ce système possède une solution si, et seulement si, le cercle de centre O et de rayon b coupe le cercle de centre $\Omega(-a, 0)$ et de rayon c . Ces deux cercles se coupent si, et seulement si,

$$|b - c| \leq a \leq b + c.$$

On peut alors conclure que le triplet (t, u, v) existe si, et seulement si, chacun des paramètres a, b, c est inférieur à la somme des deux autres.

Exercice 24 : [énoncé]

$|z|^2 = 2 + \sqrt{2} + 2 - \sqrt{2} = 4$ donc $|z| = 2$.

Posons θ un argument de z qu'on peut choisir dans $[0; \pi/2]$ car $\operatorname{Re}(z), \operatorname{Im}(z) \geq 0$.

On a $\cos\theta = \frac{1}{2}\sqrt{2 + \sqrt{2}}$ donc

$$\cos(2\theta) = 2\cos^2\theta - 1 = \frac{1}{2}(2 + \sqrt{2}) - 1 = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

avec $2\theta \in [0; \pi]$ donc $2\theta = \pi/4$ puis $\theta = \pi/8$.

Exercice 25 : [énoncé]

(\Leftarrow) ok

(\Rightarrow) Si $|z + z'| = |z| + |z'|$ alors, en divisant par $|z|$: $|1 + x| = 1 + |x|$ avec $x = z'/z \in \mathbb{C}$.

Écrivons $x = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

$$|1 + x|^2 = (a+1)^2 + b^2 = 1 + a^2 + b^2 + 2a$$

et

$$(1 + |x|)^2 = (1 + \sqrt{a^2 + b^2})^2 = 1 + a^2 + b^2 + 2\sqrt{a^2 + b^2}$$

$|1 + x| = 1 + |x|$ donne alors $a = \sqrt{a^2 + b^2}$ d'où $b = 0$ et $a \geq 0$.

Par suite $x \in \mathbb{R}_+$ et on conclut.

Exercice 26 : [énoncé]

On a

$$|z| + |z'| = \frac{1}{2} |(z - z') + (z + z')| + \frac{1}{2} |(z' - z) + (z' + z)| \leq |z + z'| + |z - z'|.$$

Interprétation : Dans un parallélogramme la somme des longueurs de deux côtés est inférieure à la somme des longueurs des diagonales.

Il y a égalité si, et seulement si, : $z - z' = 0$ (i.e. $z = z'$) ou $\frac{z+z'}{z-z'} \in \mathbb{R}_+$ et $\frac{z+z'}{z'-z} \in \mathbb{R}_+$ ce qui se résume à $z' = -z$.

Exercice 27 : [énoncé]

Pour que la quantité soit définie il est nécessaire que $z \neq 1/\bar{a}$.

Si tel est le cas

$$\left| \frac{z-a}{1-\bar{a}z} \right| \leq 1 \iff |z-a|^2 \leq |1-\bar{a}z|^2.$$

Sachant $|x+y|^2 = |x|^2 + 2\operatorname{Re}(\bar{x}y) + |y|^2$, on obtient

$$\left| \frac{z-a}{1-\bar{a}z} \right| \leq 1 \iff (|a|^2 - 1)(|z|^2 - 1) \geq 0.$$

L'ensemble recherché est l'ensemble des complexes de module inférieur à 1.

Exercice 28 : [énoncé]

(a) En développant

$$|z_1 + z_2|^2 = (z_1 + z_2)(\bar{z}_1 + \bar{z}_2) = |z_1|^2 + z_1\bar{z}_2 + \bar{z}_1z_2 + |z_2|^2$$

et la relation écrite est alors immédiate.

(b) On a

$$|z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 \leq 4$$

donc parmi les quantités $|z_1 + z_2|$ et $|z_1 - z_2|$, l'une au moins est de carré inférieur à 2.

Exercice 29 : [énoncé]

Soit $z \in \mathbb{C}$.

Si $z \in \mathbb{R}_-$ alors $f(z) = 0$.

Sinon, on peut écrire $z = re^{i\theta}$ avec $r > 0$ et $\theta \in]-\pi; \pi[$ et alors

$$f(z) = r \frac{1 + e^{i\theta}}{2} = r \cos \frac{\theta}{2} e^{i\theta/2}.$$

Puisque $\cos(\theta/2) \geq 0$

$$|f(z)| = r \cos \frac{\theta}{2} \text{ et } \arg f(z) = \frac{\theta}{2}$$

donc

$$f(z) \in \{Z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re} Z > 0\}.$$

Inversement, soit $Z \in \mathbb{C}$ tel que $\operatorname{Re} Z > 0$.

On peut écrire $Z = Re^{i\alpha}$ avec $R > 0$ et $\alpha \in]-\pi/2; \pi/2[$. Pour

$$z = \frac{R}{\cos \alpha} e^{2i\alpha}$$

les calculs qui précèdent donnent

$$f(z) = Re^{i\alpha} = Z.$$

Finalement, les valeurs prises par f sont les complexes de parties réelles strictement positives ainsi que le complexe nul.

Exercice 30 : [énoncé]

$|z+1|^2 = |z|^2 + 2\operatorname{Re}(z) + 1$ et $(|z|+1)^2 = |z|^2 + 2|z| + 1$ donc
 $|z+1| = |z|+1 \iff \operatorname{Re}(z) = |z| \iff z \in \mathbb{R}_+.$

Exercice 31 : [énoncé]

Notons $\omega_k = e^{\frac{2ik\pi}{n}}$ avec $k \in \mathbb{Z}$. Par factorisation d'exponentielle équilibrée

$$|\omega_k - 1| = 2 \left| \sin \frac{k\pi}{n} \right|.$$

Alors

$$\begin{aligned} \sum_{z \in U_n} |z - 1| &= \sum_{k=0}^{n-1} 2 \sin \frac{k\pi}{n} = 2 \operatorname{Im} \left(\sum_{k=0}^{n-1} e^{i \frac{k\pi}{n}} \right) \\ &= 4 \operatorname{Im} \left(\frac{1}{1 - e^{i\pi/n}} \right) = 2 \frac{\cos \frac{\pi}{2n}}{\sin \frac{\pi}{2n}} = 2 \cot \frac{\pi}{2n}. \end{aligned}$$

Exercice 32 : [énoncé]

Quitte à réindexer, on peut supposer

$$\forall k \in \{1, \dots, n\}, \omega_k = e^{2ik\pi/n} = \omega^k \text{ avec } \omega = e^{2i\pi/n}.$$

(a) Si n ne divise pas p alors, puisque $\omega^p \neq 1$

$$S_p = \sum_{k=1}^n \omega^{kp} = \omega^p \frac{1 - \omega^{np}}{1 - \omega^p} = 0.$$

Si n divise p alors

$$S_p = \sum_{k=1}^n \omega^{kp} = \sum_{k=1}^n 1 = n.$$

(b) Pour $1 \leq k \leq n-1$, on a

$$\frac{1}{1 - \omega_k} = -e^{-ik\pi/n} \frac{1}{2i \sin \frac{k\pi}{n}} = \frac{i}{2} \cot \frac{k\pi}{n} + \frac{1}{2}.$$

Puisque

$$\sum_{k=1}^{n-1} \cot \frac{k\pi}{n} = \sum_{\ell=n-k}^{n-1} \cot \left(\pi - \frac{\ell\pi}{n} \right) = \sum_{\ell=1}^{n-1} -\cot \left(\frac{\ell\pi}{n} \right)$$

on a

$$\sum_{k=1}^{n-1} \cot \frac{k\pi}{n} = 0$$

puis

$$T = \frac{(n-1)}{2}.$$

On peut aussi lier le calcul au précédent en écrivant

$$\frac{1}{1 - \omega_i} = \sum_{p=0}^{n-1} \omega_i^p + \frac{\omega_i^n}{1 - \omega_i}.$$

On peut aussi retrouver cette relation en considérant que T est la somme des racines d'un polynôme bien construit

$$P^n = (X-1)^n - X^n = -nX^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2}X^{n-2} + \dots$$

Exercice 33 : [énoncé]

On a

$$(1 - \omega)S = \sum_{k=0}^{n-1} (k+1)\omega^k - \sum_{k=1}^n k\omega^k = \sum_{k=0}^{n-1} \omega^k - n\omega^n = -n$$

donc

$$S = \frac{n}{\omega - 1}.$$

Exercice 34 : [énoncé]

(a)

$$j(j+1) = j^2 + j = -1.$$

(b)

$$\frac{j}{j^2+1} = \frac{j}{-j} = -1.$$

(c)

$$\frac{j+1}{j-1} = \frac{(j+1)\overline{(j-1)}}{(j-1)\overline{(j-1)}} = \frac{(j+1)(j^2-1)}{(j-1)(j^2-1)} = \frac{j^3+j^2-j-1}{j^3-j^2-j+1} = \frac{-1-2j}{3}.$$

Exercice 35 : [énoncé]

Notons $\omega_k = e^{\frac{2ik\pi}{n}}$ avec $k \in \mathbb{Z}$ les racines n ème de l'unité.

Si z est solution alors nécessairement $z \neq 1$ et $\left(\frac{z+1}{z-1}\right)^n = 1$ donc il existe $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ tel que

$$\frac{z+1}{z-1} = \omega_k$$

ce qui donne

$$(\omega_k - 1)z = \omega_k + 1.$$

Si $k=0$ alors ce la donne $0=2$ donc nécessairement $k \in \{1, \dots, n-1\}$ et $\omega_k \neq 1$.

Par suite

$$z = \frac{\omega_k + 1}{\omega_k - 1} = \frac{2 \cos \frac{k\pi}{n}}{2i \sin \frac{k\pi}{n}} = -i \cot \frac{k\pi}{n}.$$

Inversement, en remontant le calcul : ok

Finalement

$$\mathcal{S} = \left\{ -i \cot \frac{k\pi}{n} \mid k \in \{1, \dots, n-1\} \right\}.$$

Puisque la fonction \cot est injective sur $]0; \pi[$, il y a exactement $n-1$ solutions.

Exercice 36 : [énoncé]

On a

$$1 + A + B = 0, AB = 2 \text{ et } \operatorname{Im}(A) > 0$$

donc

$$A = \overline{B} = \frac{-1 + i\sqrt{7}}{2}.$$

Exercice 37 : [énoncé]

(a) Puisque les racines de l'équation $z^n - 1$ sont $1, \omega, \dots, \omega^{n-1}$, on a

$$z^n - 1 = (z - 1) \prod_{k=1}^{n-1} (z - \omega^k).$$

Or on a aussi $z^n - 1 = (z - 1)(1 + z + \dots + z^{n-1})$ d'où l'égalité proposée pour $z \neq 1$.

- (b) Les fonctions $x \mapsto \prod_{k=1}^{n-1} (x - \omega^k)$ et $x \mapsto \sum_{\ell=0}^{n-1} x^\ell$ sont définies et continues sur \mathbb{R} et coïncident sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, elles coïncident donc aussi en 1 par passage à la limite.
- (c) Pour $z = 1$, l'égalité du a) donne $\prod_{k=1}^{n-1} (1 - \omega^k) = n$. Or par factorisation de l'exponentielle équilibrée,

$$1 - \omega^k = -e^{\frac{ik\pi}{n}} 2i \sin \frac{k\pi}{n}$$

et

$$\prod_{k=1}^{n-1} e^{\frac{ik\pi}{n}} = e^{i\frac{\pi}{n} \sum_{k=1}^{n-1} k} = i^{n-1}$$

donc

$$\prod_{k=1}^{n-1} (1 - \omega^k) = 2^{n-1} \prod_{k=1}^{n-1} \sin \frac{k\pi}{n}$$

puis la relation proposée.

Exercice 38 : [énoncé]

Puisque la somme des racines 5-ième de l'unité, en considérant la partie réelle, on obtient

$$1 + 2 \cos \frac{2\pi}{5} + 2 \cos \frac{4\pi}{5} = 0.$$

Sachant $\cos 2a = 2 \cos^2 a - 1$, on obtient que $\cos(2\pi/5)$ est solution positive de l'équation

$$4r^2 + 2r - 1 = 0$$

et donc

$$\cos \frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5} - 1}{4}.$$

Or $\cos 2a = 1 - 2 \sin^2 a$ donc

$$1 - 2 \sin^2 \frac{\pi}{5} = \frac{\sqrt{5} - 1}{4}$$

puis

$$\sin^2 \frac{\pi}{5} = \frac{5 - \sqrt{5}}{8}$$

et enfin la formule proposée puisque $\sin(\pi/5) \geq 0$.

Exercice 39 : [énoncé]

$x = 1$ est solution de l'équation si, et seulement si, $a^2 - 2a - 3 = 0$ ce qui donne $a = -1$ ou $a = 3$.

Lorsque $a = -1$, les solutions de l'équation sont $1, \frac{-3+\sqrt{5}}{2}, -\frac{3+\sqrt{5}}{2}$.

Lorsque $a = 3$, les solutions de l'équation sont $1, \frac{-3+i3\sqrt{3}}{2}, -\frac{3+i3\sqrt{3}}{2}$.

Exercice 40 : [énoncé]

(a) $\mathcal{S} = \{1, -1 + 2i\}$,

(b) $\mathcal{S} = \{-1 + i, -3 + 2i, 1 - i, 3 - 2i\}$.

Exercice 41 : [énoncé]

(a) $\pm(3 - 2i)$

(b) $a = -2i, b = -1 + 3i$ et $c = 2 + i$

(c) $|c - b| = |c - a| = \sqrt{13}$ et $|b - a| = \sqrt{26}$. Le triangle est rectangle isocèle.

Exercice 42 : [énoncé]

Il s'agit d'un système somme produit, on obtient ses solutions en résolvant l'équation

$$z^2 - (1 + i)z + (2 - i) = 0.$$

On obtient l'ensemble solution

$$\mathcal{S} = \{(1 + 2i, -i), (-i, 1 + 2i)\}.$$

Exercice 43 : [\[énoncé\]](#)

Posons $\rho = |Z|$ et $\theta = \arg Z [2\pi]$.

$$\begin{aligned} e^z = Z &\iff e^{\operatorname{Re} z} e^{i \operatorname{Im} z} = |Z| e^{i\theta} \\ &\iff e^{\operatorname{Re} z} = |Z| \text{ et } e^{i \operatorname{Im} z} = e^{i\theta} \\ &\iff z = \ln \rho + i\theta + 2ik\pi \text{ avec } k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Exercice 44 : [\[énoncé\]](#)

En factorisant $e^{i\theta/2}$ au numérateur et au dénominateur

$$\frac{e^{i\theta} - 1}{e^{i\theta} + 1} = \frac{i \sin \theta/2}{\cos \theta/2} = i \tan \frac{\theta}{2}.$$

Exercice 45 : [\[énoncé\]](#)

On peut factoriser

$$e^{i\theta} + e^{i\theta'} = e^{i\frac{\theta+\theta'}{2}} (e^{i\frac{\theta-\theta'}{2}} + e^{-i\frac{\theta-\theta'}{2}}) = 2 \cos \frac{\theta - \theta'}{2} e^{i\frac{\theta+\theta'}{2}}$$

ce qui permet de préciser module et argument en discutant selon le signe de $\cos \frac{\theta-\theta'}{2}$.