

## Devoir à la maison n° 11

À rendre le 28 janvier

On note  $\mathbb{Z}[X]$  (resp.  $\mathbb{Q}[X]$ ) l'ensemble des polynômes à coefficients dans  $\mathbb{Z}$  (resp.  $\mathbb{Q}$ ).

Soit  $A \in \mathbb{Z}[X]$ , que l'on écrit  $A = a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n$ . On appelle *contenu* de  $A$  le PGCD de ses coefficients, noté  $c(A)$  :

$$c(A) = a_0 \wedge a_1 \wedge \cdots \wedge a_n.$$

La polynôme  $A$  est dit *primitif* si  $c(A) = 1$ , *i.e.* si les coefficients de  $A$  sont premiers entre eux dans leur ensemble.

Soit  $A \in \mathbb{Q}[X]$  non constant.  $A$  est dit réductible sur  $\mathbb{Q}[X]$  s'il existe deux polynômes  $B, C \in \mathbb{Q}[X]$  non constants vérifiant  $A = BC$ . Sinon,  $A$  est dit *irréductible sur*  $\mathbb{Q}[X]$ .

L'objectif de ce problème est de démontrer le critère d'irréductibilité d'Eisenstein, qui s'énonce comme suit. Soit  $A \in \mathbb{Z}[X]$  de degré  $n \in \mathbb{N}^*$ , que l'on écrit :

$$A = a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n.$$

On suppose qu'il existe un nombre premier  $p$  vérifiant :

- si  $0 \leq i \leq n-1$ ,  $p \mid a_i$  ;
- $p \nmid a_n$  ;
- $p^2 \nmid a_0$ .

Alors,  $A$  est irréductible sur  $\mathbb{Q}[X]$ .

- 1)
  - a) Un polynôme  $P \in \mathbb{Q}[X]$  irréductible sur  $\mathbb{R}[X]$  est-il aussi irréductible sur  $\mathbb{Q}[X]$  ?
  - b) Donner (en le justifiant) un polynôme de degré 2 irréductible sur  $\mathbb{Q}[X]$ , mais pas sur  $\mathbb{R}[X]$ .
- 2) Soit  $A, B \in \mathbb{Z}[X]$  non nuls, que l'on écrit sous formes développées-réduites  $A = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k$  et  $B = \sum_{k=0}^{+\infty} b_k X^k$ . On écrit aussi sous forme développée-réduite  $AB = \sum_{k \in \mathbb{N}} c_k X^k$ 
  - a) Soit  $p$  un nombre premier, on suppose que  $p$  ne divise pas tous les coefficients de  $A$ , ni tous les coefficients de  $B$ .
    - i) Montrer qu'il existe deux plus grands entiers naturels  $k$  et  $\ell$  vérifiant  $p \nmid a_k$  et  $p \nmid b_\ell$ .

- ii) Déterminer alors un entier  $i$  vérifiant  $p \nmid c_i$ .
  - b) Montrer que si  $A$  et  $B$  sont primitifs, alors  $AB$  est primitif.
  - c) Montrer qu'il existe un polynôme primitif associé à  $A$ .
  - d) Dédire des questions précédentes que  $c(AB) = c(A)c(B)$ .
- 3) Soit  $A \in \mathbb{Z}[X]$  non nul, soit  $B, C \in \mathbb{Q}[X]$  vérifiant  $A = BC$ . En utilisant les questions précédentes, construire deux polynômes  $\tilde{B}, \tilde{C} \in \mathbb{Z}[X]$  de même degrés que  $B$  et  $C$  vérifiant  $A = \tilde{B}\tilde{C}$ .
- Indication* : on pourra commencer par supposer  $A$  primitif, et considérer les PPCM des dénominateurs de coefficients de  $B$  et de  $C$ .
- 4) On montre maintenant le critère d'irréductibilité d'Eisenstein, en raisonnant par l'absurde. Soit donc un polynôme  $A$  vérifiant les hypothèses du critère (dont on reprend les notations), soit  $B, C \in \mathbb{Z}[X]$  non constants vérifiant  $A = BC$ . On écrit sous formes développées-réduites :  $B = \sum_{k=0}^{+\infty} b_k X^k$  et  $C = \sum_{k=0}^{+\infty} c_k X^k$ . Notons  $d = \deg(B)$  et  $d' = \deg(C)$ .
- a) Montrer que  $p \mid b_0$  ou (exclusif)  $p \mid c_0$ .
- On suppose dorénavant que  $p \mid b_0$  et  $p \nmid c_0$ .
- b) Montrer que  $p \nmid b_d$ .
  - c) En considérant un coefficient de  $B$  que l'on choisira judicieusement, montrer que  $p \mid c_0$  et conclure.
- 5) Montrer que pour tout  $n \geq 1$ ,  $\mathbb{Q}[X]$  contient au moins un polynôme de degré  $n$  irréductible sur  $\mathbb{Q}[X]$ .

— FIN —