

Devoir surveillé n°10
Version n°1

Durée : 3 heures, calculatrices et documents interdits

I. Un exercice vu en TD.

Soit E un espace vectoriel de dimension finie, notée n .

- 1) Soit φ un projecteur de E , peut-on trouver une base dans laquelle la matrice de φ est particulièrement simple ?
- 2) Même question pour une symétrie.

II. Racines carrées d'endomorphismes de l'espace.

On considère \mathbb{R}^3 , muni de sa structure vectorielle usuelle. On notera Id l'endomorphisme identité de \mathbb{R}^3 . On notera 0 l'endomorphisme nul de \mathbb{R}^3 .

Pour un endomorphisme $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$, on notera $f^0 = \text{Id}$ et pour tout $n \geq 1$, on définit

$$f^n = f^{n-1} \circ f = \underbrace{f \circ \cdots \circ f}_{n \text{ fois}}.$$

Pour un endomorphisme $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$, une *racine carrée* de f est un endomorphisme $r \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ vérifiant

$$r^2 = r \circ r = f.$$

On étudie dans ce problème cette notion de racine carrée sur quelques exemples. Les différentes parties de ce problème sont indépendantes.

I – Une condition nécessaire d'existence.

On considère

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$
$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -x & -y & -5z \\ -4x & +2y & -4z \\ 4x & -2y & +5z \end{pmatrix}.$$

- 1) Montrer que f est un endomorphisme de \mathbb{R}^3 .
- 2) Supposons qu'il existe une racine carrée de f , que nous noterons r . Exprimer $\det(f)$ en fonction de $\det(r)$. En déduire une condition nécessaire d'existence d'une racine carrée pour f portant sur $\det(f)$.
- 3) Calculer $\det(f)$ et en déduire une contradiction.

II – Un exemple d'existence de racine carrée.

On considère

$$g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -4y & +6z \\ 2x & +6y & -6z \\ x & +2y & -z \end{pmatrix}.$$

On considère les vecteurs de \mathbb{R}^3 :

$$u = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

- 4) Calculer pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$ la valeur de $\det(g - \lambda \text{Id})$. On mettra le résultat sous forme factorisée.
- 5) Déterminer $\text{Ker}(g - \text{Id})$. Vérifier que $u \in \text{Ker}(g - \text{Id})$.
- 6) Déterminer $\text{Ker}(g - 2\text{Id})$. Vérifier que $v, w \in \text{Ker}(g - \text{Id})$.
- 7) Montrer que (u, v, w) est une base de \mathbb{R}^3 .
- 8) Exprimer la matrice de g dans la base (u, v, w) .
- 9) En déduire l'existence d'une racine carrée r de g .
- 10) Déterminer l'expression d'une telle racine carrée de g .

III – Un troisième exemple.

On considère

$$h : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 4x & +3y & +6z \\ 4x & +y & +4z \\ -5x & -3y & -7z \end{pmatrix}.$$

On désire montrer par l'absurde que h n'admet pas de racine carrée. Supposons donc que h admette une racine carrée, que nous noterons r .

- 11) *Question préliminaire* : Soit $u, v \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ commutant (*i.e.* $u \circ v = v \circ u$), soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Montrer que $\text{Ker}(u - \lambda \text{Id})$ est stable par v .

- 12) Montrer que r et h commutent.
- 13) Calculer pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$ la valeur de $\det(h - \lambda \text{Id})$. On mettra le résultat sous forme factorisée et l'on vérifiera que l'on a bien obtenu un polynôme de degré 3 admettant trois racines distinctes $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3$.
- 14) Déterminer $\text{Ker}(h - \lambda_1 \text{Id})$, $\text{Ker}(h - \lambda_2 \text{Id})$ et $\text{Ker}(h - \lambda_3 \text{Id})$.
- 15) En déduire l'existence d'une base dans laquelle la matrice de h est diagonale.
- 16) Quelle est la forme de la matrice de r dans cette base? Conclure.

IV – Endomorphisme nilpotent.

On considère

$$\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 8x & -4y & +3z \\ 13x & -8y & +6z \\ -4x & & \end{pmatrix}$$

On désire montrer par l'absurde que φ n'admet pas de racine carrée. Supposons donc que φ admette une racine carrée, que nous noterons r .

- 17) *Question préliminaire* : Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$, supposons qu'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $u^p = 0$ (on dit que u est *nilpotent*).
 - a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\text{Im}(u^{n+1}) \subset \text{Im}(u^n)$.
 - b) Montrer que s'il existe $q \in \mathbb{N}$ vérifiant $\text{Im}(u^q) = \text{Im}(u^{q+1})$, alors pour tout $k \geq q$, on a $\text{Im}(u^k) = \text{Im}(u^q)$.
 - c) En déduire qu'il existe un plus petit entier naturel n_0 vérifiant $u^{n_0} = 0$ et que $1 \leq n_0 \leq 3$.

Cet entier n_0 est appelé *indice de nilpotence* de u .

- 18) Expliciter φ^2 et φ^3 . Que peut-on donc dire sur φ au vu de la question 17)?
- 19) En déduire une contradiction et conclure.

— FIN —