

Devoir à la maison n° 16

À rendre le 28 mars

I. Un exercice d'algèbre linéaire.

On s'intéresse pour chaque $\lambda \in \mathbb{R}^*$ à l'ensemble noté $F(\lambda)$ des endomorphismes linéaires de \mathbb{R}^3 vérifiant l'équation $f \circ f = \lambda f$:

$$F(\lambda) = \left\{ f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3) \mid f^2 = \lambda f \right\}.$$

1) Étude générale.

Soit $\lambda \in \mathbb{R}^*$ et $f \in F(\lambda)$.

- a) Montrer que $\text{Im } f = \{ u \in \mathbb{R}^3 \mid f(u) = \lambda u \}$.
- b) On veut montrer que $\text{Ker } f$ et $\text{Im } f$ sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de \mathbb{R}^3 . Soit $x \in \mathbb{R}^3$.
 - i) Analyse. On suppose que $x = u + v$, avec $u \in \text{Im } f$ et $v \in \text{Ker } f$. En calculant $f(x)$, trouver la valeur de u , et donc celle de v .
 - ii) Procéder à une phase de synthèse.
 - iii) Conclure.

2) Un exemple.

On considère l'application

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$
$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -x + y + z \\ -6x + 4y + 2z \\ 3x - y + z \end{pmatrix}.$$

- a) Montrer que f appartient à $F(\lambda)$, pour un certain λ , que l'on précisera.
- b) Déterminer une base de $\text{Ker } f$, ainsi que de $\text{Im } f$.
- c) Le vecteur $w = (7, 6, 5)$ appartient-il à $\text{Im } f$?

II. Résolution d'une équation différentielle linéaire d'ordre 3.

On souhaite résoudre l'équation différentielle

$$y''' = y'' + 5y' + 3y. \quad (\mathcal{E})$$

Pour cela, on introduit les ensembles

$$E = \{ f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f''' = f'' + 5f' + 3f \},$$

$$F = \{ f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f' = 3f \},$$

$$G = \{ f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f'' + 2f' + f = 0 \}.$$

- 1) Expliquer brièvement pourquoi E , F et G sont des \mathbb{R} -espaces vectoriels.
- 2) Soit $f \in F$, calculer f' , f'' et f''' en fonction de f . En déduire que $f \in E$.
Ainsi, F est un sous-espace vectoriel de E .
- 3) Soit $f \in G$, calculer f''' en fonction de f'' , f' et f . En déduire que $f \in E$.
Ainsi, G est un sous-espace vectoriel de E .
- 4) Montrer que F et G sont en somme directe.
- 5) On désire maintenant montrer que $E = F \oplus G$.
 - a) Soit $f \in E$, supposons qu'il existe $f_1 \in F$ et $f_2 \in G$ tels que $f = f_1 + f_2$.
Expliciter f' en fonction de f_1 et f_2' , puis f'' en fonction de f_1 et f_2'' .
En déduire f_1 puis f_2 , en fonction de f .
 - b) Conclure.
- 6) Donner une famille génératrice de F et une famille génératrice de G .
- 7) En déduire une famille génératrice de E . Exhiber alors toutes les solutions de l'équation différentielle (\mathcal{E}) .

— FIN —