

Devoir surveillé n°9
Version n°1

Durée : 3 heures, calculatrices et documents interdits

I. Étude d'une suite double récurrente.

Soient $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles, vérifiant la relation de récurrence linéaire suivante :

$$\begin{cases} x_{n+1} &= -9x_n - 18y_n \\ y_{n+1} &= 6x_n + 12y_n \end{cases}$$

avec $x_0 = -137$ et $y_0 = 18$. On se propose dans ce problème de déterminer les termes généraux de ces deux suites.

On note \mathcal{C} la base canonique de \mathbb{R}^2 et l'on identifie \mathbb{R}^2 à $\mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$.

- 1) Montrer qu'il existe une matrice $A \in M_2(\mathbb{R})$ telle que la relation de récurrence linéaire ci-dessus soit équivalente à la relation $U_{n+1} = AU_n$, où $U_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$.
- 2) Établir une expression de U_n en fonction de A , de U_0 et de n .
- 3) Déterminer le noyau de A , et en donner une base \mathcal{B}_1 . Calculer le rang de A .
- 4) Montrer que l'ensemble des vecteurs $X \in \mathbb{R}^2$ tels que $AX = 3X$ est un sous-espace vectoriel de \mathbb{R}^2 . Quelle est sa dimension ? En donner une base, que l'on notera \mathcal{B}_2 .
- 5) Montrer que la concaténation $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \uplus \mathcal{B}_2$ est une base de \mathbb{R}^2 .
- 6) Soit $P = \text{Mat}_{\mathcal{C}}(\mathcal{B})$. Montrer que P est inversible et montrer (si possible, sans calcul) que le produit $P^{-1}AP$ est une matrice diagonale D .
- 7) Exprimer, pour chaque $n \in \mathbb{N}$, A^n en fonction de P , D et de n . En déduire une expression de A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- 8) Donner les termes généraux x_n et y_n .

II. Étude d'une suite de tirages.

Dans tout le problème, a et b désignent des entiers naturels tous deux non nuls et l'on note $N = a + b$.

On considère une urne contenant initialement a boules blanches et b boules noires, dans laquelle on effectue des tirages successifs, au « hasard » et « avec remise » d'une boule, en procédant de la façon suivante :

- lorsque la boule tirée est blanche, elle est remise dans l'urne avant de procéder au tirage suivant,
- lorsque la boule tirée est noire, elle n'est pas remise dans l'urne mais remplacée dans l'urne par une boule blanche et l'on procède au tirage suivant.

Partie I

Soit (Ω, P) un espace probabilisé fini modélisant cette expérience et $Y : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ la variable aléatoire égale au nombre de tirages nécessaire à l'obtention d'une première boule blanche.

- 1) Préciser soigneusement l'ensemble des valeurs prises par la variable Y .
- 2) Pour tout entier k compris entre 1 et $b + 1$, calculer la valeur de la probabilité $P(Y = k)$.
- 3) Vérifier que

$$P(Y = b + 1) = \frac{b!}{N^b}$$

et que, pour tout entier k compris entre 1 et b , la formule suivante est vraie :

$$P(Y = k) = \frac{b!}{(b - (k - 1))!N^{k-1}} - \frac{b!}{(b - k)!N^k} .$$

- 4) Soit M un entier naturel non nul et a_0, a_1, \dots, a_M une famille de réels. Établir que

$$\sum_{k=1}^M k(a_{k-1} - a_k) = \left(\sum_{k=0}^{M-1} a_k \right) - M a_M .$$

- 5) En déduire que $E[Y] = \sum_{k=0}^b \frac{b!}{(b - k)!N^k}$.

Partie II

Dans cette partie, on note :

- pour tout entier $n \geq 1$, q_n la probabilité de l'événement, noté N_n : « la n^e boule tirée est noire »,
- pour tout entier $n \geq 0$, X_n le nombre aléatoire de boules noires obtenues au cours des n premiers tirages (par convention, $X_0 = 0$),
- pour tout entier $n \geq 0$ et $k \geq 0$, $p_{n,k}$ la probabilité de l'événement : « au cours des n premiers tirages, on a obtenu exactement k boules noires ».

- 6) Soit $n \in \mathbb{N}$, calculer $p_{n,0}$ puis $p_{n,n}$. Que vaut la somme $\sum_{k=0}^n p_{n,k}$?

- 7) Démontrer la formule suivante, valable pour tous les entiers naturels n et k non nuls :

$$N \cdot p_{n,k} = (a + k)p_{n-1,k} + (b + 1 - k)p_{n-1,k-1} . \quad (\mathbf{F})$$

8) Calcul de l'espérance de X_n .

- a)** À l'aide de la formule **(F)** obtenue dans la question **7)**, démontrer la formule pour $n \geq 1$:

$$NE[X_n] = \sum_{k=0}^{n-1} [b + k(N-1)] p_{n-1,k} ,$$

puis justifier que

$$E[X_n] = \left(1 - \frac{1}{N}\right) E[X_{n-1}] + \frac{b}{N} .$$

- b)** En utilisant la dernière formule établie à la question **8)a)**, prouver que, pour tout entier naturel n , on a

$$E[X_n] = b \left[1 - \left(1 - \frac{1}{N}\right)^n\right] .$$

9) Calcul de q_n .

- a)** En utilisant une formule des probabilités totales, établir la formule suivante valable pour tout entier naturel n :

$$N \cdot q_{n+1} = \sum_{k=0}^n (b-k) p_{n,k} .$$

- b)** Pour tout entier naturel n , exprimer alors q_{n+1} en fonction de $E[X_n]$ et en déduire l'expression de q_{n+1} en fonction de n, b, N .

10) Calcul de la variance de X_n . On introduit la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ définie pour tout entier naturel n par :

$$u_n = E[X_n(X_n - 1)] .$$

- a)** À l'aide de la formule **(F)** obtenue dans la question **7)**, montrer que l'on a :

$$N \cdot u_n = \sum_{k=1}^{n-1} [k(k-1)(a+b-2) + 2(b-1)k] p_{n-1,k} .$$

- b)** En déduire que la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ satisfait à la relation de récurrence suivante :

$$\forall n \geq 1, u_n = \left(1 - \frac{2}{N}\right) u_{n-1} + \frac{2b(b-1)}{N} \left[1 - \left(1 - \frac{1}{N}\right)^{n-1}\right] .$$

- c)** À l'aide d'une récurrence, démontrer que la formule suivante est valable pour tout entier naturel n :

$$u_n = b(b-1) \left[1 + \left(1 - \frac{2}{N}\right)^n - 2 \left(1 - \frac{1}{N}\right)^n\right] .$$

- d)** Donner alors la valeur de $\text{Var}(X_n)$ puis préciser sa limite lorsque n tend vers $+\infty$.

— FIN —