

Devoir à la maison n° 06

À rendre le 10 novembre

On considère l'équation différentielle

$$y'' + \frac{2y'}{\operatorname{th}(x)} + y = 0. \quad (\mathcal{E})$$

- 1) *Question préliminaire.* Justifier que $\frac{\operatorname{sh}(x)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$.
- 2) Sur quel ensemble E peut-on chercher à résoudre (\mathcal{E}) ? Écrire cet ensemble comme une union d'intervalles ouverts.
- 3) Soit $y : E \rightarrow \mathbb{R}$ une solution de l'équation (\mathcal{E}) . On pose alors

$$\begin{aligned} z : E &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto y'(x) + \frac{y(x)}{\operatorname{th}(x)} \end{aligned}.$$

- a) Montrer que z est solution de l'équation différentielle linéaire :

$$z' + \frac{z}{\operatorname{th}(x)} = 0. \quad (\mathcal{F})$$

- b) Résoudre l'équation (\mathcal{F}) sur \mathbb{R}_+^* .
c) Résoudre l'équation (\mathcal{F}) sur \mathbb{R}_-^* .

Indication : on essaiera de chercher un argument rigoureux évitant de dupliquer les arguments donnés pour résoudre la question précédente.

- d) En déduire qu'il existe $a, b, a', b' \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout $x \in E$,

$$y(x) = \begin{cases} \frac{ax + b}{\operatorname{sh}(x)} & \text{si } x > 0 \\ \frac{a'x + b'}{\operatorname{sh}(x)} & \text{si } x < 0 \end{cases}.$$

- e) Réciproquement, montrer que toutes les fonctions de cette forme sont bien solution de (\mathcal{E}) .
- 4) Parmi les solutions de (\mathcal{E}) , lesquelles admettent-elles une limite finie en 0? Le cas échéant, laquelle?

— FIN —