

KSN — III FK — zadanie 2.1

Rozwiązanie UARL metodami bezpośrednimi (2)

Wyobraźmy sobie, że mamy dane N punktów (x_i, y_i) dla $i = 1, \dots, N$, przez które należy poprowadzić wielomian interpolacyjny $w(x)$ tj. wielomian stopnia $N - 1$ o tej własności, że $w(x_i) = y_i$.

Do rozwiązania tego problemu można podejść na kilka sposobów. Można się np. pokusić o znalezienie współczynników c_i wielomianu interpolacyjnego

$$w(x) = \sum_{i=0}^{N-1} c_i x^i.$$

Współczynniki te dane są układem N liniowych równań algebraicznych o N niewiadomych,

$$\begin{cases} c_0 + c_1 x_1 + c_2 x_1^2 + \dots + c_{N-2} x_1^{N-2} + c_{N-1} x_1^{N-1} = y_1 \\ c_0 + c_1 x_2 + c_2 x_2^2 + \dots + c_{N-2} x_2^{N-2} + c_{N-1} x_2^{N-1} = y_2 \\ \vdots \\ c_0 + c_1 x_N + c_2 x_N^2 + \dots + c_{N-2} x_N^{N-2} + c_{N-1} x_N^{N-1} = y_N \end{cases},$$

który można przedstawić w postaci macierzowej $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ jako:

$$\begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^{N-2} & x_1^{N-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^{N-2} & x_2^{N-1} \\ \vdots & & & & & \vdots \\ 1 & x_N & x_N^2 & \dots & x_N^{N-2} & x_N^{N-1} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{N-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_N \end{pmatrix}. \quad (1)$$

Macierz \mathbf{A} o powyższej postaci nazywana jest macierzą *Vandermonde'a*.

Układ równań (1) proszę rozwiązać poprzez rozkład LU.

Na wspólnym wykresie proszę nanieść zarówno węzły interpolacyjne i jak i wartości wielomianu na przedziale $[x_1; x_N]$. Wartości wielomianu proszę wyznaczać schematem *Hornera*

$$w(x) = \sum_{i=0}^{N-1} c_i x^i = \left(\dots ((c_{N-1}x + c_{N-2})x + c_{N-3})x + \dots + c_1 \right)x + c_0$$

co dla wielomianu wyższego rzędu można zgrabnie implementować jako

```
w=c(N-1)
DO i=N-2,0,-1
  w=w*x+c(i)
ENDDO
```

Krzysztof Malarz, Kraków, 29 października 2003