

# Minimalizacja wartości funkcji metodą interpolacji kwadratowej Powella

Tomasz Chwiej

15 maja 2018

## 1 Wstęp

W metodzie interpolacji Powella korzystamy z lokalnego przybliżenia funkcji wielomianem drugiego stopnia (wykład). Jeśli znamy położenie trzech punktów:  $\{x_1, x_2, x_3\}$  i wartości funkcji w tych punktach  $\{f(x_1), f(x_2), f(x_3)\}$ , to przy założeniu że ciąg wartości funkcji jest malejący możemy wyznaczyć przybliżone położenie minimum:

$$x_m = \frac{x_1 + x_2}{2} - \frac{F[x_1, x_2]}{2F[x_1, x_2, x_3]} \quad (1)$$

gdzie:

$$F[x_1, x_2] = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \quad (2)$$

jest ilorazem różnicowym pierwszego rzędu, a

$$F[x_1, x_2, x_3] = \frac{\frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} - \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}}{x_3 - x_1} \quad (3)$$

jest ilorazem różnicowym drugiego rzędu. Wykorzystamy tę zależność do znalezienia minimum/maksimum wartości funkcji.

## 2 Zadania do wykonania

1. Zaprogramować metodę interpolacji Powella do znalezienia minimum wartości funkcji.
2. Dla funkcji

$$f_1(x) = \ln(x^5 + 3x^2 + x + 9) \quad (4)$$

- Sporządzić wykres funkcji w zakresie  $x \in [-1.5, 1]$
- Przyjąć jako punkty startowe:  $x_1 = -0.5$ ,  $x_2 = x_1 + h$ ,  $x_3 = x_2 + h$ ,  $h = 0.01$  i znaleźć kolejne 10 przybliżeń położenia minimum. W każdej iteracji do pliku proszę zapisać:  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_m$ ,  $F[x_1, x_2]$ ,  $F[x_1, x_2, x_3]$
- Powtórzyć rachunki z poprzedniego podpunktu dla:  $x_1 = -0.9$ ,  $x_2 = x_1 + h$ ,  $x_3 = x_2 + h$ ,  $h = 0.01$ . Dane zapisać do pliku.

3. Dla funkcji

$$f_2(x) = x^6 \quad (5)$$

Przyjąć jako punkty startowe:  $x_1 = 1.5$ ,  $x_2 = x_1 + h$ ,  $x_3 = x_2 + h$ ,  $h = 0.01$  i znaleźć kolejne 100 przybliżeń położenia minimum. W każdej iteracji do pliku proszę zapisać jak poprzednio:  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_m$ ,  $F[x_1, x_2]$ ,  $F[x_1, x_2, x_3]$

4. W sprawozdaniu proszę

- **Nie zamieszczać tabel z danymi**
- Sporządzić rysunki przedstawiające położenia kolejnych przybliżeń w funkcji iteracji dla trzech rozważanych przypadków
- Dla każdego rozważanego przypadku proszę sporządzić rysunek pokazujący zmiany ilorazu 1 i 2 rzędu w funkcji iteracji
- Uzasadnić: dlaczego dla funkcji  $f_1(x)$  dla drugiego zestawu punktów startowych znajdujemy maksimum a nie minimum (analiza wartości ilorazów)?
- Wyjaśnić: dlaczego dla funkcji  $f_2(x)$  metoda jest wolnozbieżna? oraz Jaki warunek stopu jest najodpowiedniejszy?
- O istnieniu minimum bądź maksimum w danym punkcie rozstrzyga wartość drugiej pochodnej. Czy dla funkcji  $f_2(x)$  też tak jest?