

# Inferencia Estadística

## Tarea 2 27/08/2018

1. Una pareja decide tener hijos hasta el nacimiento de la primera niña. Calcule la probabilidad de que tengan más de 4 hijos. Suponga que las probabilidades de tener niño o niña son iguales. ¿Cuál es el tamaño esperado de la familia?
2. Cuando una máquina no se ajusta adecuadamente tiene una probabilidad 0.15 de producir un artículo defectuoso. Diariamente, la máquina trabaja hasta que se producen 3 artículos defectuosos. Se detiene la máquina y se revisa para ajustarla. ¿Cuál es la probabilidad de que una máquina mal ajustada produzca 5 o más artículos antes de que sea detenida? ¿Cuál es el número promedio de artículos que la máquina producirá antes de ser detenida?
3. Los empleados de una compañía de aislantes son sometidos a pruebas para detectar residuos de asbesto en sus pulmones. Se le ha pedido a la compañía que envíe a tres empleados cuyas pruebas resulten positivas, a un centro médico para realizarles más análisis. Si se sospecha que el 40 % de los empleados tienen residuos de asbesto en sus pulmones, encuentre la probabilidad de que deban ser analizados 10 trabajadores para poder encontrar a 3 con resultado positivo.
4. Para el siguiente ejercicio es necesario usar R.
  - a) Considere una moneda desequilibrada que tiene probabilidad  $p$  de obtener águila. Usando el comando `sample`, escriba una función que simule  $N$  veces lanzamientos de esta moneda hasta obtener un águila. La función deberá recibir como parámetros a la probabilidad  $p$  de obtener águila y al número  $N$  de veces que se repite el experimento; y tendrá que regresar un vector de longitud  $N$  que contenga el número de lanzamientos hasta obtener un águila en cada uno de los  $N$  experimentos.
  - b) Usando la función anterior simule  $N = 10^4$  veces una variable aleatoria  $\text{Geom}(p)$  para  $p = 0.5, 0.1, 0.01$ . Grafique las frecuencias normalizadas en color azul. Sobre esta última figura empalme en rojo la gráfica de la función de masa correspondiente. ¿Qué observa?
  - c) Repita el inciso anterior para  $N = 10^6$ . Además calcule el promedio y la desviación estándar de las simulaciones que realizó ¿Qué observa?
5. Usando las ideas del inciso anterior escriba una función en R que simule  $N$  veces los lanzamientos de moneda hasta obtener  $r$  águilas. La función deberá recibir como parámetros a la probabilidad  $p$  de obtener águila, al número  $r$  de águilas a observar antes de detener el experimento y al número  $N$  de veces que se repite el experimento; y tendrá que regresar un vector de longitud  $N$  que contenga el número de lanzamientos hasta obtener las  $r$  águilas en cada uno de los  $N$  experimentos. Grafique las frecuencias normalizadas de los experimentos para  $N = 10^6$ ,  $p = 0.2, 0.1$  y  $r = 2, 7$  y compárelos contra la función de masa de la distribución más adecuada para modelar este tipo de experimentos.

6. Considera  $X$  una v.a. con función de distribución  $F$  y función de densidad  $f$ , y sea  $A$  un intervalo de la línea real  $\mathbb{R}$ . Definimos la función indicadora  $1_A(x)$ :

$$1_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Sea  $Y = 1_A(X)$ . Encuentre una expresión para la distribución acumulada de  $Y$ .

7. Entre las más famosas de todas las lluvias de meteoros están las Perseidas, que ocurren cada año a principios de agosto. En algunas áreas, la frecuencia de Perseidas visibles promedian seis por cada cuarto de hora. El modelo de probabilidad que describe a  $Y$ , el número de meteoros que una persona ve en un cuarto de hora, tiene la función de probabilidad



$$f_Y(y) = \frac{e^{-6} 6^y}{y!} \quad y = 0, 1, \dots$$


Encuentre la probabilidad de que una persona vea en un cuarto de hora determinado al menos la mitad de los meteoros que esperaría ver.

8. Las calificaciones de un estudiante de primer semestre en un examen de química se describen por la densidad de probabilidad

$$f_y(y) = 6y(1 - y) \quad 0 \leq y \leq 1.$$

donde  $y$  representa la proporción de preguntas que el estudiante contesta correctamente. Cualquier calificación menor a 0.4 es reprobatoria. Responda lo siguiente:

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante repruebe?
  - b) Si 6 estudiantes toman el examen, ¿cuál es la probabilidad de exactamente 2 reprueben?
9. Escriba una función en R que simule una  oximación al proceso Poisson a partir de las 5 hipótesis que usamos en clase para construir tal proceso. Usando esta función, simule tres trayectorias de un proceso Poisson  $\lambda = 2$  sobre el intervalo  $[0, 10]$  y gráfíquelas. Además simule  $10^4$  veces un proceso de Poisson  $N$  con  $\lambda = 1/2$  y hasta el tiempo  $t = 1$ . Haga un histograma de  $N(1)$   su simulación anterior y compare contra la distribución de Poisson correspondiente.

*Hint: Considere el intervalo  $[0, T]$  y un número real positivo  $dt$  que sea mucho más pequeño que la longitud de  $[0, T]$  y que divida dicha longitud, digamos  $T/dt = 1000$ . Divida el intervalo  $[0, T]$  en intervalitos de longitud  $dt$  que tengan la forma  $[k \cdot dt, (k+1) \cdot dt)$ ,  $k = 0, 1, 2, \dots, T/dt$ . Para cada uno de estos intervalitos simule una v.a. Bernoulli( $2 \cdot dt + 10^6$ )  guarde su resultado en un vector del tamaño adecuado.*

**Entrega: 11/09/2018.**