2/mod/quiz/attempt.php?attempt=3592&cmid=16132&page=8

Haritalar Çevir

OYS Türkçe (tr)

Kalan süre 1:38:24

Soru 9

Henüz cevaplanmadı

10,00 üzerinden işaretlenmiş

Soruyu işaretle

If $f(x) = \sqrt{x}$ for $x \in [9, 36]$, find the value of $c \in (9, 36)$ which satisfies the mean value theorem.

Note: Round to two decimal places.

Türkçe: $x \in [9, 36]$ için $f(x) = \sqrt{x}$ olsun. Ortalama değer teoremini sağlayan $c \in (9, 36)$ sayısını bulun.

Not: İki ondalık basamağa yuvarlayın.

- 0,06
- 2,25
- 0,56
- 0,75
- 0,07
- 1,00
- 0,67
- 1,50
- 1,00
- 20,25

1 2 3 10

Uygulamayı bitir

/quiz/attempt.php?attempt=3592&cmid=16132&page=3

aritalar Çevir

Türkçe (tr)

Rektörlüğe Bağlı Bölümler / MAT101 - Matematik I (1

Kontrol paneli / Derslerim / Rektörlüğe Bağlı Bölümler / MAT101 - Matematik I (1) / Ara Sınavı / Ara Sınav

Kalan süre 1:39:07

Soru 4

Henüz cevaplanmadı

10,00 üzerinden işaretlenmiş

Soruyu işaretle

For $B = -\lim_{x\to 0^+} \frac{x^x-1}{6\sin x}$ which one is B?

Türkçe: $B = -\lim_{x\to 0^+} \frac{x^x-1}{6\sin x}$ olmak üzere B aşağıdakilerden hangisidir?

- -1,00
- INF
- 6,00
- 0,50
- 8,00

Sınav gezintisi

1 2 3 4

10

Uygulamayı bitir ...

"Gen

Önceki sayfa

Sonraki sayfa

/UE2/mod/quiz/attempt.php?attempt=3592&cmid=16132&page=9

be Haritalar Çevir

TU-OYS Türkçe (tr)

Kalan süre 1:38:16

Soru **10**

Henüz cevaplanmadı

10,00 üzerinden işaretlenmiş

Soruyu işaretle

Suppose $\ln(A^3) = \lim_{x \to \frac{\pi}{2}^-} \left(\frac{\ln(\tan x)}{\cot 2x}\right) - 1$. Find the value M for which $A = e^M$.

Türkçe: $\ln(A^3) = \lim_{x \to \frac{\pi}{2}^-} \left(\frac{\ln(\tan x)}{\cot 2x}\right) - 1$ olsun. $A = e^M$ olmak üzere M değerini bulunuz.

- -1,50
- 1,00
- 6,00
- -0,33
- -0,67

Önceki sayfa

Uygulamayı bitir ...

Sınav gezi

1 2

10

Uygulamay

E2/mod/quiz/attempt.php?attempt=3592&cmid=16132&page=7

Haritalar Çevir

J-OYS Türkçe (tr)

Kalan süre 1:38:31

Soru 8

Henüz cevaplanmadı

10,00 üzerinden işaretlenmiş

Soruyu işaretle


A point is moving on the graph of $y^3 = x^2$. When the point is at $(-64, 16)$, its y coordinate is decreasing by 2 units per second. How fast is the x coordinate changing at that point?


Türkçe: Bir nokta $y^3 = x^2$ grafiğinin üzerinde hareket etsin. Hareket eden nokta $(-64, 16)$ noktasına geldiğinde, noktanın y koordinatı saniyede iki birim azalırken x koordinatının değim hızı nedir?

- 12
- 16
- -8
- 20
- 2
- 4
- -20
- -4

1 2 3 10

Uygulamayı biti


edu.tr/UE2/mod/quiz/attempt.php?attempt=3592&cmid=16132&page=1
YouTube
Hantalar
Çevir
GTU-OYS
Türkçe (tr)
Kalan süre 1:39:21
Soru 2
Henüz cevaplanmadı
10,00 üzerinden işaretlenmiş
Soruyu işaretle
Suppose $f(x)$ is the function such that for $x > 0$ we have $f(x) = (e^x - 1)\ln(x)$ and for $x < 0$ we have $f(x) = |x|\cos x$. Which one(s) holds for $f(x)$ if $f(0) = 0$?
Türkçe: $f(x)$, $x > 0$ için $f(x) = (e^x - 1)\ln(x)$ ve $x < 0$ için $f(x) = |x|\cos x$ şeklinde tanımlanan bir fonksiyon olsun. $f(0) = 0$ ise $f(x)$ için aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
Lütfen bir ya da daha fazlasını seçin:
f(x) is continuous on the set of real numbers. (f(x) bütün reel sayılar kümesi üzerinde süreklidir.)
f(x) is right continuous at x=0 but not left continuous there. (f(x), x=0 da sağ sürekli fakat sol sürekli değildir.)
f(x) has no limit as x approaches zero. (f(x), 0 noktasında limiti yoktur.)
f(x) is not continuous at x=0. (f(x), x=0 da sürekli değildir.)
f(x) is continuous at x=1 (f(x), x=1 de süreklidir.)
1
2
3
4
10
Uygulamayı bitir ...
Önceki sayfa
Sonraki sayfa


/UE2/mod/quiz/attempt.php?attempt=3592&cmid=16132&page=2
be Haritalar Çevir
TU-OYS Türkçe (tr)
Rektörlüğe Bağlı Bölümler / MAT101 - Matematik I (1)
Kontrol paneli / Derslerim / Rektörlüğe Bağlı Bölümler / MAT101 - Matematik I (1) / Ara Sınavı / Ara Sınav
Kalan süre 1:39:13
Soru 3
Henüz cevaplanmadı
10,00 üzerinden işaretlenmiş
Soruyu işaretle
Calculate the following limit:
$\lim_{x\to 0}(4x)^4 \sin(\frac{11\pi}{x^4})$.
Türkçe: $\lim_{x\to 0}(4x)^4 \sin(\frac{11\pi}{x^4})$ limitini hesaplayınız.
0,00
4,00
-11,00
-4,00
11,00
Sınav gezintisi
1 2 3 4
10
Uygulamayı bitir ...
Önceki sayfa
Sonraki sayfa

/UE2/mod/quiz/attempt.php?attempt=3592&cmid=16132&page=4

be Haritalar Çevir

TU-OYS Türkçe (tr)

Soru 5

Henüz cevaplanmadı

10,00 üzerinden işaretlenmiş

Soruyu işaretle

Kalan süre 1:38:57

Let $f'(x) = e^{x^2}$ and $g(x) = f(\sqrt{x})$. Let L denote the slope of the tangent line to the graph of the function $h(x) = g(15x + 3)$ at $x = 0$. Calculate $\frac{2\sqrt{3}L}{e^3}$.

Türkçe: $f'(x) = e^{x^2}$ ve $g(x) = f(\sqrt{x})$ olsun. $h(x) = g(15x + 3)$ fonksiyonunun grafiğine $x = 0$ da teğet olan doğrunun eğimi L, olsun. Bu durumda $\frac{2\sqrt{3}L}{e^3}$ değerini bulunuz.

- 5,00
- 17,00
- 15,00
- 25,00
- 12,00

1 2 3 10

Uygulamayı bitir

Önceki sayfa

Sonraki sayfa

Duyurular

Geçiş yap...

.tr/UE2/mod/quiz/attempt.php?attempt=3592&cmid=16132&page=5

Tube Haritalar Çevir

GTU-OYS Türkçe (tr)

Soru 6

Henüz cevaplanmadı

10,00 üzerinden işaretlenmiş

Soruyu işaretle

Kalan süre 1:38:49

Find y' at the point $(2, 2)$ where $x\sin(x^2 - y^2) + 1 = x^2 - 3$.

Türkçe: $x\sin(x^2 - y^2) + 1 = x^2 - 3$ olmak üzere $(2, 2)$ noktasında y' değerini hesaplayınız.

- 0,00
- 1,00
- 3,00
- 1,50
- 0,00
- 0,50
- 5,00
- 1,50

1 2 3

10

Uygulamayı bi

Önceki sayfa

Sonraki sayfa

Duyurular

Geçiş yap...

Kalan süre 1:38:41

Soru 7

Henüz cevaplanmadı

10,00 üzerinden işaretlenmiş

Soruyu işaretle

Let $f(x) = x^2 - 8x + 5$ with domain $0 < x < 4$.

Calculate $(f^{-1})'(-2)$.

Note: Round to two decimal places.

Türkçe: $f(x) = x^2 - 8x + 5, \quad 0 < x < 4$ olsun.

$(f^{-1})'(-2)$ değerini hesaplayın

Not: İki ondalık basamağa yuvarlayın.

.

- -0,17
- -0,25
- -0,08
- -0,08
- -0,14
- -0,11
- -0,10
- -0,09
- -0,20
- -0,12

1 2 3

10

Uygulamayı bi

Soru 1
Henüz cevaplanmadı
10,00 üzerinden işaretlenmiş
Soruyu işaretle

Kalan süre 1:39:35

Find the equation of the straight line tangent to the curve $xe^y - 9y - 9x = -9ln5$ at the point $(0, ln5)$.

Note: Round to two decimal places.

Türkçe: $xe^y - 9y - 9x = -9ln5$ eğrisine $(0, ln5)$ noktasında teğet olan doğru denklemini bulunuz.

Not: İki ondalık basamağa yuvarlayın.

- y=-0,15x+ln5
- y=-0,09x+ln9
- y=-0,36x+ln9+5
- y=-x+1+ln5
- y=9x+ln9
- y=x+ln9
- y=-5x+ln9+5
- y=-0,44x+ln5

1 2 10

Uygulamay

Sonraki sayfa